


1. 1891
L. surages
en m
10 Van yam
20 De gorten


Sh

Lousanne. p. 8.

Mijet.




De Jure.



Kenneth K. Mackenzie
October 1934

Gorter, David de



Flora III provinciarum
Belgii

PLANTARUM
BELGII CONFOEDERATI
INDIGENARUM
SPICILEGIUM.

27
66

PLANTARUM
RECOLL. CONCORDANTI
INDIGORUM
SPECIFICARUM

PLANTARUM
BELGII CONFOEDERATI
INDIGENARUM
SPICILEGIUM,

Quo DAV. GORTERI viri cl. Flora VII. Pro-
vinciarum locupletatur,

A U C T O R E

STEPHANO JOANNE VAN GEUNS,
MED. ET PHILOS. CAND.

~~~~~  
*Nemo reprehensus qui e segete ad spicilegium reli-  
quit stipulam.*

C A T O de re rust. L. I.

~~~~~  
H A R D E R V I C I
APUD JOANNEM VAN KASTEEL, 1788.



+QK
298
64
c. 3

PLANTARUM

DE BELGII CONTORENTAT

INDIGENARUM

SPICILEGIUM

6058

Quo Dae Gertel van de Elm en Pro
vinctum locupletant

Auctore

STEPHANO JOHANNES VANGEUN

Med. et Natur. Cand.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ILLUSTRISSIMO

ET

GENEROSISSIMO.

D O M I N O.

GUILIELMO HENRICO

B A R O N I

DE ROUWENOORT.

TOPARCHÆ. IN. UILENPAS. ORDI-
NIS. TEUTONICI EQUITL CO-
ADJUTORI. ET. DIERÆ. MAGIS-
TRO. ORDINI EQUESTRI CO-

MITATUS. ZUTPHANIÆ. AD-
SCRIPTO. INTRA. ET. EXTRA.
ZUTPHANIAM PRÆTORI. COL-
LEGII PRÆPOTENTIUM. DE-
PUTATORUM. COMITATUS. OR-
DINUM. PRAESIDI. AD. RES.
RHENI. INFERIORIS. ET. YSA-
LÆ. CURANDAS. DELEGATO.
CIVITATIS. DOTECHEMENSIS.
CONSULI SOCIETATIS. SCIEN-
TIARUM. BATAVO-HARLEMEN-
SIS. DIRECTORI. Cet. Cet. Cet.

DEDICATIO.

Septimus & tricesimus volvitur annus, ex quo **TU, VIR ILLUSTRIS-
SIME!** me haud diu ante in Academia Har-
derovicena creatum Botanices Professore
invitasti in **Hortum TUUM UILEN-
PASSIANUM.** Vidi tunc eum, et
deinceps multoties vidi, sed semper summo
cum oblectamento, summaque admiratione;
in eo enim tanquam in cultissimo Paradiso,
quicquid eximii habet vel hic, vel alter
orbis, uno intuitu contemplari licet. Nec
parcis adhuc sumtibus aut industriæ, rario-
res Plantas ex omni terrarum angulo con-
quirendi; easdemque ita excolis Ipse, ut
in tanto fastigio vix æmulum reperi-
as. Excepisti insuper me per tam longam annorum
seriem singulari semper benevolentia & ami-
citia. Quin et me, dum in Russicis terris
degebam, commercio litterario honorare
non intermisisti. Hæ mihi causæ sunt,
**VIR ILLUSTRIS-
SIME!** quare
hunc laboris mei Botanici fructum, cui &

D E D I C A T I O.

TU Ipse non parum contribuisti, TUO
Nomini inscribere ausus sim, hoc solo titu-
lo, ut exstet, & post fata perennet, ob-
servantiæ, debiti honoris, reverentiæ &
animi mei in TE grati, monumentum
publium. TU vero, MÆCENAS
OPTIME! accipias quæso hoc munu-
sculum hilari & benigno vultu; TUque,
ut adhuc diu in salutem Patriæ sospes &
incolumis vivas, opto.

ILLUSTRISSIMI TUI
NOMINIS

Zutphaniae

III Novembris

cultor humillimus

1781.

D. de GORTER.

P A T R I

A M A N T I S S I M O

MATTHIAE VAN GEUNS,

MEDICINÆ DOCTORI, EJUSQUE IN ACADEMIA
GELRO-ZUTPHANICA PROFESSORI PRIMARIO,
PRAXEOS AUTEM ATQUE OBSTETRICIÆ, NEC
NON BOTANICES AC CHEMIÆ ORDINARIO,
REIPUBLICÆ GELRO-ZUTPHANICÆ AR-
CHIATRO, PLURIBUS DENIQUE ERU-
DITORUM SOCIETATIBUS VARIO
NOMINE ADSCRIPTO,

VITÆ SUÆ AC STUDIORUM DUCI
FIDELISSIMO,

PRÆCEPTORI OPTIMO,

HOC OPUSCULUM;
ANIMO PIO AC GRATO

A U C T O R
D I C A T.

PRÆFATIO.

Septem fere anni effluxere , e quo plantarum patriæ nostræ indigenarum indicem illum in lucem emisit David de Gorter , vir cl. , quem *Floram VII Provinciæ Belgii foederati indigenam* vocavit. Qui liber , natus ex alio quatuordecim annis ante hunc edito , titulo *Floræ Belgicæ* , ejusque *Appendice & Supplementis* , curâ ultima cl. Gorteri , accedente etiam ope plurium in patria Botanophilorum , perfectior sic & castigatior prodiit.

Utraque autem hæc Flora vel ideo plenior esse credenda est in recensione stirpium Gelricarum , maxime vero earum , quæ circa Hardervicum vegetant ; tum quod Gorterus ipse in hac regione

& urbe præcipue vixerit, rei herbariæ operam dederit, eamque, ipso etiam Linnæo duce, excursionibus botanicis perfecerit, maxime quando docendi etiam munus dein accessisset; cuius quidem diligentiae testis est particularis hujus regionis plantarum notitia, quam A. 1745., titulo *Floræ Gelro-Zutphanicæ*, edidit, & *Appendice* A. 1757. auxit: tum quoque quod revera Hardervicenus ager Floræ indigenæ divitiis adeo spectabilis sit, ut magis locupletem harum naturæ opum thesaurum in alio hujus regionis, & vel Belgicæ universæ, loco vix reperiri posse, censeamus.

Itaque quum ultimum edita illa, de qua dicere incepti, Gorteri Flora eo fere tempore prodierit, quo ipse inter Medicinæ tirocinia, fideli Patris mei ductu atque instigatione, ad botanica quoque studia animum appuli, eademque, usu horti nostri Academici, egregie instructi, lubens excolui, his naturæ deliciis captus, non alio duce magis idoneo, quam

Gorteri hoc libro, uti me posse credidi, ad investigandas, etiam ipso natali in solo, plantas sponte apud nos crescentes.

Eo autem tempore suspicari vix poteram, vel in agro nostro Harderviceno deprehensurum me esse stirpes, quæ acutos illos Gorteri, ne dicam Linnæi, oculos fugissent; quamvis viri diligentissimi modestia spem talem, maxime quo ad cryptogamicas plantas, semel iterumque aluerit (*). Contigit tamen brevi, ut in unam alteramque plantam incurrerem, in Flora illa vii Provinciarum non notatam; qua quidem observatione excitato, plurimum detegendi desiderium continuo augebatur.

Neque juvenilem hunc impetum successus retudit. Crescebat enim indies repertarum stirpium, quibus Gorteri catalogus suppleri posset, numerus, ita ut, quum ad centenarium jam hic accessisset, animum facile subierit cogitatio,

(*) Vid. *Flor. Galro-Zutph. præf.* pag. penult., item *Flor. Belg. præf.* pag. xiv., & *Flor. vii. Prov. præf.* pag. ii.

stirpium harum novarum notitiam aliquam in lucem aliquando edendi, & Floram imprimis Gelro-Zutphanicam amplificandi plena stirpium omnium, quibus agrum Hardervicenum natura instruxit, recensione. Solus enim hic ager auctarium illud Floræ mihi hætenus suggererat, ipsiusque divitias, modo laudatas, tantas porro deprehendi, ut plantarum circa hanc urbem crescentium numerus mihi pedetentim ultra 800 auctus fuerit, atque inter has vel 250 occurrerint, quarum nullam in Flora Gelro-Zutphanica, ejusve Appendice, (quibus tantum stirpes 580 vere indigenæ continentur), mentionem fecerat cel. Gorter.

Tam eximiam ergo Floræ fecunditatem, qua dulcis nostra musarum sedes, Hardervicum, ad suum imprimis agrum botanophilos allicit, ecquis plena dignam non putaverit enarratione!

Hanc autem dum deinceps forte paraturi sumus, nunc id prius agendum duximus, ut spicilegio hoc illas tantum of-

ferremus plantas, quæ a Gortero, inter plantas septem patriæ universæ regionum indigenas, non fuisse commemoratæ. Quo titulo igitur nunc 150 recensemus plantarum species, quibus Gorteri illa ultima Flora ditetur & suppleatur.

Scilicet, post primas illas meas in agro Harderviceno excursiones botanicas, in aliis quoque pluribus, & Gelriæ & aliarum provinciarum, locis, plantas indigenas dein investigandi, ultraque etiam a Gortero omittas reperiundi, occasio non defuit.

Neque defuisse aliena ad hanc messem alteram subsidia; quo loco mihi imprimis laudandus est cl. Frid. Ehrhart, Botanicus regius Hannoveranus, oculatissimus plantarum, præcipue minorum & obscurarum, scrutator (*), idemque indo-

(*) Testari hoc possunt tum bene multæ, quas detexit, novæ plantarum species, a Linnaeo fil. & Hedwigio operibus suis insertæ, tum varia ipsius viri cl. opuscula, inter quæ *Phytopinacem Luneburgensem*, & *Colletanea ad Historiam naturalem* (Beiträge zur naturkunde), quorum jam tria volumina prodierunt, sufficiat nominasse.

lis ingenuæ candore, ac morum vitæque simplicitate venerabilis. Hic enim vir eximius, quando, aliquot abhinc annis, iter suum botanicum pedestre ad quasdam etiam Belgii regiones extendisset, hortumque nostrum & nostras oras diligenter visiteret, in Patris mei amicitiam venit, mihiq[ue] adeo ducem se & comitem facilis dedit, quocum agros nostros et suburbia perquireret. Quo factum est, ut et primus ille meus botanices amor ultra exarserit, et ipse, quod gratus commemoro, ad examen cryptogamicarum aliarumque cognitu difficiliorum plantarum, in quibus Gorteri opera plurimum deficit, aptior evaserim. Ehrhartus igitur, quum, in ipso hoc itinere, plures a Gortero omissas plantas in Belgio invenisset, brevem earum enumerationem dein in *Promptuario Hannoverano* dedit (*), nostratibus tamen vix notam. Hanc itaque opusculo nostro inseruimus, prouti laudata a nobis Ehrhar-

(*) *Hannoverisches Magazin* 1783, 12 - 18 Stück.

ti auctoritas, plantas illas, quae ab ipso repertae sunt, indicat.

Secutus fui in hoc libello ordinem atque rationem Florae Gorterianae, ut ipsi messi spicilegium eo melius accommodarem. Plantas igitur meas disposui ad methodum Linnæi, & hujus viri summi characteres específicos, subinde tamen ad naturae observationem mutatos, singulis adscripsi ex ultima, quam ill. Murray curavit, *Systematis Vegetabilium* editione. Plura quidem variorum auctorum synonyma Linnæano nomini & characteri, Gorteri exemplo, addere, facile profecto fuisset: sed ratum habui his libelli molem non augere. Dum enim tironibus talia synonyma majorem fere parere confusionem solent, quam veram illustrationem, rei herbariae periti hæc facili opera, si tanti rem faciant, ex *Systemate Plantarum* Linnæi a Cl. Reichard edito, quod omnium teritur manibus, eruere poterunt. Illis vero stirpibus, quas recentissimorum auctorum industria ab eo tempore detexit vel extricavit, præ-

fixo asterisci signo distinctis, nomina imposui & characteres auctorum illorum, qui primi illas Linnæana methodo definiverunt; atque his folis, quum in *Systemate Plantarum* non reperiantur, selecta quoque aliorum botanicorum synonyma addenda esse duxi. Quia denique una etiam alteraque plantæ species hic a nobis posita sit, quas frustra tum apud Linnæum, tum apud alios auctores botanicos quaesivimus, has ipsi definire pro virili debuimus.

Quod superest, quæ huic opusculo defunt suppleat ætas, & si quæ dicta sunt juveniliter, pro indole accipiantur (*).

Dab. Hardervici, Id. Sept.

MDCCLXXXVIII.

(*) Quintilianus *Inst. Orat. L. XII.*

* * *

* *

*

PLANTARUM
BELGII CONFOEDERATI
INDIGENARUM
SPICILEGIUM.

EX CLASSE II

DIANDRIA.

MONOGYN. A.

- I. **V**ERONICA floribus solitariis, foliis digi-*verna.*
tato partitis, pedunculis calyce brevioribus.
Linn. Syst. vegetab. gen. 25. spec. 36.

*Op zaailanden aan de Zandsteeg en elders
by Harderwyk.*

EX CLASSE III

T R I A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

- fuscus.* 2. *SCHOENUS* culmo (subtriquetro) folioso, spiculis subfasciculatis, foliis filiformibus canaliculatis. *Syst. veg.* 65. 5.

By Hengelo en Venbrug in Overysfel (Ehrhart).

Op veenachtige lage heide-velden by Harderwyk.

Distincta omnino videtur species a sequente, quacum tamen conjunxit Hudsonus. Bene illam nuperius descripsit Roth in *Beiträge zur Botanik II th. f.* 125.

- albus.* 3. *SCHOENUS* culmo subtriquetro folioso, floribus fasciculatis, foliis setaceis. *Syst. veg.* 65. 13.

Tusfchen Zwol en de kleine Haar, en tusfchen Hardenberg en Venbrug in Overysfel (Ehrhart).

Op dezelfde gronden en plaatsfen, als de voorgaande; niet zeldzaam op de lage heidevelden van de Veluwe.

D I G Y N I A.

- Canarien-* 4. *PHALARIS* panicula subovata spiciformi, glumis carinatis. *Syst. veg.* 74. 1.

Langs de wegen, aan mesthopen, en op de Stadswallen van Arnhem, Harderwyk, Naarden en andere plaatsen.

Hæc utique Floræ indigenæ inferenda est, nisi velimus etiam *Ilicem Aquifolium*, *Linum usitatissimum*, *Galanthum nivalem*, *Prunum domesticam*, ipsum *Erigeron canadense*, similesque stirpes, exoticas quondam, nunc vero civitatis jure donatas, excludere.

5. *PANICUM* spica tereti, involucellis unifloris viride, fasciculato pilosis, seminibus nervosis. *Syst. veg.* 76. 5.

By Heemize (Ehrhart).

Op zandige bouwlanden by Harderwyk, Putten, en Naarden.

Anne hæc eadem planta ac n. 34. *Floræ Gelro-Zutphanicæ* p. 12 & 243? Sic suadet synonymon C. Bauhini, sed quare igitur postea in suis scriptis eam omiserit Gorterius, non perspicio.

Involucella non biflora. Neque calyx trivalvis.

6. *AIRA* foliis setaceis, vaginis angulatis, floribus subspicatis, flosculis basi aristatis. *Syst. veg.* 81. 12.

By Hengelo (Ehrhart).

Veel by Harderwyk op droge zandige plaatsen.

Arista dorsalis contorta! Adeoque *Avenæ* species.

- *7. *POA* panicula diffusa, spiculis multifloris limbaribus, culmo basi subrepente, spicula-

rum glumis obtusissimis. *Pollich hist. plantarum in Palatinatu Electorali sponte nascentium tom. I. p. 89.*

Aan het zee-strand van de Zuider-zee by Nykerk, Harderwyk en Elburg.

Sit ne hoc gramen mera varietas Airæ aquaticæ, an vero distincta species ad Poæ genus referenda, uti Pollichius d. 1. & Ehrhartus (*Beiträge zur Naturk. 1 band. s. 68.*) volunt, nondum certo constat. Mihi quidem, qui non semel in eodem Airæ aquaticæ, procul a mari crescentis, specimine, spiculas vidi & bifloras, & tri-, quadri-, quinque-, imo sex-floras, prior sententia probabilior videtur.

Poa maritima Rainvillii, quam cl. de Gorter (*Flor. vii. prov. n. 87.*) describit, multis modis, non tamen omnibus, cum nostra planta congruit. Doleo hujus specimen, quod dubium solvere posset, non superesse in horto sicco Gorteriano, cujus copiam Academiæ huic nuper fecit cl. viri vidua.

- rubra.* 8. *FESTUCA* panicula secunda scabra, spiculis aristatis, flosculo ultimo mutico, culmo femitereti. *Syst. veg. 88. 3.*

Op droge zandige plaatsen langs de wegen by Harderwyk.

- maritimum.* *9. *HORDEUM* flosculis lateralibus (masculis &) spuriiis aristatis, involucris (omnibus) scabris. *Oeder in explic. tab. 630 suæ*

Floræ Danicæ, Roth Beiträge zur Botanik II th. f. 97.

Gramen spicatum secalinum maritimum minus. *Tournef. Inst. rei herb. t. I. p. 518*,
Scheuchzer Agrostogr. p. 18. n. 4.

Gramen secalinum palustre & maritimum. *Rai Catal. plant. Angl. p. 152.*, *Synops. method. stirp. Britann. p. 242.*, *Hist. plant. vol. II. p. 1258.*

Veel op de hooilanden aan het zee-strand
 tuschen Harderwyk en Nykerk.

„Invenitur mense Majo & Junio in maritimis
 Belgii”, *Scheuchzer l. c.*

Recte jam *Raius l. l.* dixit, differre ab *Hordeo spurio*, i. e. *murino*, quod culmus sit procerior & gracilior, aristæ breviores. Idem confirmant icon præclara *Oederi*, & distinctionis notæ a *Rothio d. l.* exhibitæ; antherarum tamen quod ille delineat, hic describit, discrimen, nullum observare potui. Neque omnes flosculi laterales spurii & inanes sunt, uti iidem volunt, sed illi tantum qui superiorem spicæ partem tenent.

Non commemoratur a *Linnaeo*, uti recte dixerunt ill. *Hallerus in Append. I. ad Scheuchz. Agrostogr. p. 4.*, & *Rothius d. l.* Quam enim huc pertinere contendit *Ehrhartus (Beitr. zur Naturkunde III b. f. 155.)*, varietas β *Hordei murini* *Linn.*, referenda est ad *Hordeum secalinum Schreberi*.

*10. HORDEUM flosculis lateralibus masculis secal-
 (& spuriiis) aristatis, involucris seta-
 m.

ceis scabris. *Schreber spicileg. Floræ Lips.*
p. 148.

Hordeum murinum β. *Linn. Fl. Suec. ed. 2.*
n. 113., *Spec. plant. t. 1. p. 126.*

Gramen spicatum secalinum minus. Tour-
nef. d. 1., Scheuchz. Agrostogr. p. 17.
n. 3., *Vaillant. Botan. Paris. p. 83. tab.*
17. f. 6.

Hordeum spicis distichis, folliculo brevi,
glumis calycinis aristatis. Haller Hist. stirp.
Helv. n. 1538.

An Hordeum murinum microstachyon Ehr-
harti? Conf. Hannov. Magaz. 1780.
14 stück.

Op Doreweerd in Gelderland.

Simillimum præcedenti gramen; neque specie ab
eo differre, mihi, cui utriusque plantæ plurima
specimina colligere & conferre licuit, videtur.
Separat tamen Scheuchzerus, quem Hallerus (l.
c. & Append. ad Scheuchz. Agrost. p. 4.) sequitur.
Hic vero non conspexisse videtur Hordeum mari-
timum; ille sæpissime, specierum nomine, varie-
tates describit.

T R I G Y N I A.

umbella- II. *HOLOSTEUM floribus umbellatis. Syst. veg.*
tum. 104. 4.

Niet zeldzaam in 't voorjaar op zandige
bouwlanden by Harderwyk.

In nostris speciminibus vidimus stamina 3 vel 5.

nec 4, stylos semper 3, petala inaequaliter tridentata, pedunculos 6-12. Alium harum partium numerum & figuram observarunt Loeßling, Linnaeus, Heister, Pollich, Leers, alii.

EX CLASSE IV

T E T R A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

12. GALIUM foliis senis obovatis obtusis, caule *scaxatile*, ramosissimo procumbente *Syst. veg.* 125. 8.

Aan droge wallen by Harderwyk (Ehrhart).

D I G Y N I A.

13. CUSCUTA floribus sessilibus quinquesidis, *Epithy-*
bracteis obvallatis. *Syst. veg.* 179. 2. *num.*

Vry gemeen op de heide-velden van de Veluwe, Gooiland, Utrecht en Friesland, om de heide-struiken geslingerd, of over dezelve uitgespreid.

Gorterus noster hanc non distinxisse videtur a vulgari *C. europaea*. Conf. loca natalia hujus, quae describit *Flora VII. prov. n.* 153. Meesius itidem utramque confudit; vid. *Flor. Fris. n.* 71.

Flores pentandri.

22 PLANTARUM INDIGENARUM

TETRAGYNIA.

- grami-
neum.* 14. POTAMOGETON foliis lineari-lanceolatis
alternis sessilibus stipulâ angustioribus. *Syst.*
veg. 174. 10.

*Tusfchen Hardenberg en Venbrug, en by
Heemze (Ehrhart).*

- marinum.* 15. POTAMOGETON foliis linearibus alternis
distinctis inferne vaginantibus. *Syst. veg.*
174. 11.

Te Harderwyk in de Stadsgraft by de Zee.

EX CLASSE V

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

- Belladon-
na.* 16. ATROPA caule herbaceo, foliis ovatis inte-
gris. *Syst. veg.* 249. 2.

Raram cæterum hanc, quod minime dolemus, ne-
que antea in Belgio repertam, stirpem, in tractu
tamen Oldamptino Provinciæ Groninganae non
deesse, singulari casu detectum fuit. Conf. cl. S.
J. Brugmans *Dissert. de plantis inutil. & vene-
natis pratorum* p. 30.

DIGYNIA.

- Amarel-
la.* 17. GENTIANA corollis quinquefidis hypocræ-

teriformibus , fauce barbatis. *Syst. veg.*
322. 33.

*In de duinen by Scheveningen en 's Graven-
hage (Ehrhart).*

18. GENTIANA corollis quadrifidis imberbi-*filiformis.*
bus , caule dichotomo filiformi. *Syst. veg.*
322. 38.

*Op lage heide-gronden op de Veluwe , onder
andere kleine planten , als Scirpus seta-
ceus , Linum Radiola , Blasia , Anthoce-
ros en diergelyken , als by Harderwyk aan
't eind van de hoge Sydel en Zandsteeg ,
en by Vanenburg.*

*Tusfchen Poppen en Hengelo , en tusfchen
Zwolle en de kleine Haar (Ehrhart).*

Flores femper tetrandri monogyni.

19. SIUM foliis pinnatis , umbellis axillaribus pe-*angustifo-*
dunculatis , involucro univerfali pinnati-*lium.*
fido. *Syst. veg.* 348. 2.

*In verfcheide floten en beeken by Harderwyk ,
als aan het eind van de hooge Sydel , in
Tonfel en aan de Nykerker weg.*

Est *Sium nodiflorum* a Gortero in Flora vii. Prov.
recensitum ; quod non tantum ex loco natali , ibi
commemorato , diu fufpicatus fueram , fed quod
ex ipfo viri cl. horto ficco manifeflum eft , ubi ,
nomine Sii nodiflori , *Sium angustifolium* afferva-
tur . Non rarus eft inter Botanicos hic error ,

quum etiam Hallerus (*Hist. stirp. Helv. n. 778*), Weigelius (*Observ. botan. p. 26.*), Retzius (*Observ. botan. fasc. I. p. 16.*), & Oederus (*Flor. Dan. tab. 247.*) Sium nostrum angustifolium vocent nodiflorum.

graveo-
lens.

20. ANETHUM fructibus compressis. *Syst. veg.* 364. 1.

By Zutphen (de Gorter *Flora Zutphanica* p. 21.).

An vere indigena?

EX CLASSE VI

H E X A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

multiflo-
ra.

21. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis multifloris. *Syst. veg.* 425. 7.

By Harderwyk op schaduwachtige plaatsen in de boschen.

By Heemze (Ehrhart). By Overveen in de duinen (Loosjes *Flora Harlemica* n. 82., quem tamen locum Gorterus, assignat C. Polygonato.)

Attenta partium & attributorum in loco natali inspectio omnino comprobare videtur, hanc specie non distinctam esse a Convallaria Polygonato. Eadem antea Linnæo stetit sententia. Varie-

„ tates, ” inquit, „ hæc satis manifestæ & evidentes sunt; specie tamen non distinctas esse, docuit attenta inspectio partium & attributorum in loco natali. Distinguat itaque eas, qui velit; ego convictus sum, quod specie distingui non debeant, licet pedunculi in aliis uniflori, in aliis multiflori sint. ” Vid: *Hort. Clissort. p. 125.* Miror igitur, deinde sententiam mutasse virum ill.

- *22. *JUNCUS* annuus, culmo ramoso paniculato, floribus solitariis sessilibus, petalis ovato oblongis, capsula subglobosa. *Linm. fil. Supplem. plantar. p. 208.*

Juncus foliatus minor, floribus per ramos sparsis. *Vaillant. Botan. Paris. p. 109. tab. 20. f. 1.*

By Delden en Hengelo (Ehrhart).

Novam hanc speciem primus descripsit, & cl. Linnæo suppeditavit Ehrhartus. Mirari autem hac occasione subit, ill. Murraium novæ suæ Systematis vegetabilium editioni, neque hanc inferuisse plantam, neque plurimas alias, quas a cl. Ehrhart, sibi indicatas, Supplemento plantarum inferere nullus dubitaverat Linnæus filius.

- *23. *JUNCUS* culmo nudo filiformi, foliis setaceis erectis, capitulis terminali laterali-*tenellus.* que subfoliosis.

Op vogtige plaatsen op de heide-velden by Harderwyk.

Diverſa a Linnæanis Junci ſpeciebus. Proxime autem ad noſtram accedunt :

Juncus caule brachiato, foliis ſetaceis, floribus ſciculatis ad ramos ſeſilibus. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n. 1320.* Sed culmus noſtræ ſimplex eſt, non brachiatus.

Juncus (*capitatus*) foliis ſetaceis, capitulis terminali alariſque ſubſoſiſ; petaliſ acutiſ integri, pericarpio æqualibuſ. *Weigel Obſerv. botan. p. 28.* — Sed non ſemper adeſt capitulum alare, magiſque accedit ad Juncum ſquarroſum quam ad buſonium; neque icon *tab. 2. f. 5.* noſtræ fatiſ reſpondet.

Juncus (*ericetorum*) culmo nudo filiformi, foliis linearibuſ canaliculatiſ, capitulo ſubrotundo ſeſili terminali triphylo. *Pollich hiſt. plant. palat. n. 350.* Sed noſtra non ſemper unicum habet capitulum terminale, neque occurrit in pratiſ ſiccis ſabuloſiſ.

nemoroſuſ. *24. JUNCUS foliis planiſ pilofiſ, floribuſ ſciculatiſ. *Pollich d. l. n. 350.*

Juncus planifoliuſ umbellatuſ, petaliſ æqualibuſ. *Haller hiſt. ſtirp. Helv. t. II. n. 1327.*

Gramen hiriſutum anguſtifoſium majuſ. *C. Bauh. Pin. p. 7, Scheuchz. Agroſtogr. p. 318.*

In het Puttenſche en Spulder boſch op de Veluwe.

Siſne hæc vere diſtincta ſpecies, an vero varietas Junci pilofi, dubitaverim.

T R I G Y N I A .

*25 RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis linearibus obtusis integerrimis graniferis, verticillis remotis, ramis patentibus, foliis inferioribus cordato lanceolatis. *Nemolapathum.* *Linn. fil. Suppl. Plant. p. 212.*

Rumex (glomeratus) floribus hermaphroditis, ad alas foliorum conglomeratis, foliis lanceolatis integerrimis. *Boehmer Flor. Lips. p. 240. n. 576. & Schreber conspect. floræ Lips.*

Rumex conglomeratus. *Leers Flor. Herbörn. n. 275. & Murray prodr. design. stirp. Götting. p. 52.* Nullam tamen vir ill. ejus mentionem facit in *Syst. vegetab.*

An Lapathum Hydrolapathum? *Scopoli flor. Carniol. n. 442.*

Rumex crispus *β. Pollich l. c. n. 356.*

Rumex acutus *β. de Gorter flora VII. prov. n. 323.*

Lapathum petiolis latefcentibus, foliis longe lanceolatis, floribus verticillatis verrucosis. *Hall. l. c. n. 1590.*

Lapathum minimum. *C. Bauh. pin. p. 115.*

Lapathum acutum minimum. *J. Bauh. hist. t. II. p. 985.*

Op verscheide plaatsen aan de kanten van slooten, als by Harderwyk, en aan de kant van trekvaarten in Holland.

By Hengelo (Ehrhart).

P O L Y G Y N I A.

- natans.* 26. ALISMA foliis ovatis obtusis, pedunculis foliariis. *Syst. veg.* 460. 5.

In slooten by Delden en Hengelo (Ehrhart).

EX CLASSE VIII

O C T A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

- multiflora.* 27. ERICA antheris muticis exsertis, corollis cylindricis, stylis exsertis, foliis quinis, floribus sparsis. *Syst. veg.* 484. 71.

By Harderwyk (Linnaeus Flora Belgica, in Amoen. Acad. vol. VI. p. 52.).

T R I G Y N I A.

- lumetorum.* 28. POLYGONUM foliis cordatis, caule volubili laevi, floribus carinato alatis. *Syst. veg.* 495. 30.

Vry gemeen in Gelderland aan de heggen der tuinen, en tusſchen het hakhout.

Op ſommige plaatſen in Overyſſel (Ehrhart).

Huc pertinet Convolvulum nigrum *Dodon. pempt.* p. 396. quod ſynonymon Gorterus refert ad Polygonum Convolvulum, a quo noſtram ſpeciem

non satis distinxisse v. cl., patet insuper ex loco natali, quem P. Convolvulo tribuit „in heggen:” atqui in sepibus hæc non crescit,

EX CLASSE X

D E C A N D R I A.

D I G Y N I A.

29. CHRYSOSPLENIUM foliis oppositis. *Syst. oppositifolium.*
Veg. 558. 2.

Habitat in Belgio (Linnaeus *Syst. plant. t. II.*
p. 308.).

30. DIANTHUS floribus solitariis, squamis ca-*deltoides.*
lycinis lanceolatis binis, corollis crenatis.
Syst. veg. 565. 10.

By Zwol (Ehrhart).

T R I G Y N I A.

- *31. STELLARIA foliis lanceolatis, petalis bi-*aquatica.*
partitis, calycem longitudine æquantibus.
Pollich d. l. n. 422.

Alfne foliis lanceolatis, petalis bipartitis, peti-
olis unifloris. *Haller Hely. n.* 885.

An Alfne folio gramineo angustiore, palustris.
Dillen. Append. p. 69., quæ Linnaeo varietas est
Stellaris gramineæ? Est autem S. *aquatica* vere
ab hac distincta species.

Aan het eind van de hoge Sypel, aan de Weibeek, en elders op vogtige plaatsen by Harderwyk.

Tusschen Hardenberg en Venbrug in Overysel (Ehrhart).

P E N T A G Y N I A.

- reflexum.* 32. SEDUM foliis subulatis sparsis basi solutis, inferioribus recurvatis. *Syst. veg.* 579. 11.

Aan den voet der bergen langs den Rhyn by de Doreweerd, en op de wallen en fortificatien van Naarden.

Varius petalorum & staminum numerus, styli & capsulae plerumque 6-9, evidenti sunt argumento, separationem generum Sedi & Sempervivi esse mere artificialem, imo ne quidem in systemate plantarum artificiali bene procedere.

- aquaticum.* 33. CERASTIUM foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis. *Syst. veg.* 585. 13.

By Zandvoort, Muiden, Muiderberg, aan de Helder en op Texel.

Conf. de Gorter *Flor. Belg. n.* 376, ubi hanc plantam recenset; omisit autem iterum in *Flora VII. Prov.*, motus quibusdam, manu Chirurgi Alcmariensis Timmer scriptis, animadversionibus, quae tamen parvi ponderis esse videntur (Conf. *Flor. VII. Prov. Plant. dub. n.* 1076.); & quidquid de-

mun de illis fit, tum ipse Ao. 1784. aan de Helder, tum Ao. 1782. cl. Ehrhart by Muiden genuinum Ceraſtium aquaticum Linn. invenimus.

34. SPERGULA foliis verticillatis, floribus pen- pentan-
tandris. *Syſt. veg.* 586. 2. dra.

*Hier en daar by Harderwyk en Haarlem.
In Vriesland onder de gemeene Spurrie (Mee-
ſe).*

EX CLASSE XI

D O D E C A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

35. ASARUM foliis reniformibus obtuſis binis. *europaeum.*
Syſt. veg. 589. 1.

Boerhaavius indigenam eſſe ſignificavit. *Ind.
alt. plant. hort. L. B. T. II. p. 95.*

„Crefcit in umbroſis opacis ſepibus, praefer-
tim corylaceis, in variis locis Hollandiae”,
Linnaeus *Hort. Clifſort. p. 178.*; vid. & *Flo-
ram Belg. in Amoen. Acad. t. VI. p. 52.*

T R I G Y N I A.

- *36. EUPHORBIA umbella multifida dichotoma, *campe-
involucellis ſubcordatis, petalis integris, ſtris.*
foliis lineari lanceolatis ſubimbricatis acu-
tis glaucis.

*Zeer veel aan den Ysfeldyk by Campen,
Deventer, Zutphen en Voorst.*

Proxime ad nostram accedunt, neque tamen in omnibus conveniunt:

Euphorbia Esula Pollichii, t. II. n. 460.

Euphorbia Paralias Scopoli, Flor. Carniol. n. 581.

Euphorbia Cajogala Ehrharti, Hannov. Magaz. 1783. 14 Stück, Beiträge II. b. f. 102.

Tithymalus foliis linearibus aristatis imbricatis, stipulis umbellaribus ovato lanceolatis, floralibus cordatis. Hall. hist. stirp. Helv. n. 1055., quod Synon. ad Euph. Paralias refertur in Syst. Plant.

Est fere intermedia species inter Euphorbiam Esuliam & Paralias, ab utraque tamen probe distinguenda. Crescunt jam per plures annos haec tres species in horto nostro Academico, neque una in alteram, satione aliquoties a me instituta, transit.

EX CLASSE XII

I C O S A N D R I A.

D I G Y N I A.

monogyna.

- *37. *CRATÆGUS* foliis subtrifidis acutis, floribus monogynis. *Jacquin Flor. Austr. vol. III. t. 292. f. 2. Syst. veg. 622. 10.*

Op dezelfde plaatsen, als de gemeene Haagdoorn (Cratægus Oxyacantha); gemeen by Harderwyk.

Pro nova specie descripsit JACQUINUS. Pace tamen viri ill. , non differre videtur a C. Oxyacantha, nisi numero styliorum; sed ut in plurimis hujus classis arboribus numerum hunc variare, res est notissima, sic quoque plura vidi specimina C. Oxyacanthæ floribus trigynis. Anne igitur hæc etiam ad distinctam speciem erunt referenda? Sed & vidi in eadem arbore sæpius flores alios monogynos, alios digynos, adeoque, juxta Jacquinum, duas has species in eadem stirpe conjunctas.

P O L Y G Y N I A.

38. ROSA germinibus globosis petiolisque aculeatis, aculeis recurvis, foliis subtus rubiginosis. *Syst. veg.* 631. 2.

Aan zee-kant by Harderwyk, op Doréweerd, langs de weg tusfchen Nymegen en Arnhem, by Velzen, en elders by Haarlem.

Rosam Eglanteriam cum nostra confudisse videtur cl. de Gorter (*Flor. vii. prov. n. 428.*). Idem alii botanici plurimi fecerunt.

39. FRAGARIA caule decumbente, (seminibus receptaculo exsucco affixis). *Syst. veg.* 633. 3.

By Harderwyk in het Ribbenboschje.

Demonstrat hæc planta, arte, non naturâ, distincta esse Fragariæ & Potentillæ genera;

EX CLASSE XIII

P O L Y A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

- dubium.* 40. PAPAVER capsulis oblongis glabris, caule multifloro, fetis appressis, foliis pinnatifidis incis. *Syst. veg.* 648. 6.

Op zandige bouwlanden en wegen by Arnhem, Harderwyk, Haarlem, Naarden, Noorddorp, Groningen, en andere plaatsen.

EX CLASSE XIV

D I D Y N A M I A.

G Y M N O S P E R M I A.

- virgata.* 41. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis serratis subsessilibus pubescentibus, staminibus corolla longioribus. *Syst. veg.* 713. 7.

Habitat in Hollandia (Linnæus *Syst. plant.* t. III. p. 43.).

* * *

* *

*

EX CLASSE XV

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

42. MYAGRUM filiculis lentiformibus orbicula-paniculatis punctato rugosis. *Syst. veg.* 796. 8. *tum.*

In de koorlanden by Emaus buiten Harderwyk.

SILIQUOSA.

43. ISATIS foliis radicalibus crenatis, caulinis tinctoria. sagittatis, filiculis oblongis. *Syst. veg.* 824. 1. *Weede Belg.*

In Holland, vooral op de duinen (van Berkey Verhand. van de Holl. Maatsch. viii d. bl. 116.). In Noord-Holland (van Hazen Verh. v. d. Holl. Maatsch. xix d. i. st. bl. 271.). Op de bouwlanden van Vriesland (Brugmans Orat. de plant. indig. accurat. not. max. commend. p. 36.).

44. CRAMBE foliis cauleque glabris. *Syst. veg. maritima.* 825. I.

Op het uiterste der stranden van Holland (Dentan Verhand. van de Holl. Maatsch. xix d. 3 st. bl. 31.).

EX CLASSE XVII

D I A D E L P H I A.

O C T A N D R I A.

- amara.* 45. POLYGALA floribus cristatis racemosis, caulibus erectiusculis, foliis radicalibus obovatis majoribus. *Syst. veg.* 851. 5.

*Op schrale gras-landen en lage heide-velden;
by Harderwyk op de Gagel-kampen, en
by Hartskâmp op de Veluwe.*

Equidem conjungendam iterum putaverim cum Polygala vulgari; vidi enim plura specimina inter utramque quasi speciem media; & Polygalæ vulgaris in horto cultæ folia radicalia latiora sunt, ita ut vix ab amara dignoscantur.

D E C A N D R I A.

- spinosa.* *46. ONONIS floribus racemosis solitariis, foliis ternatis solitariisque, ramis spinosis. *Murray Syst. veg.* 862. 2.

Anonis spinosa flore purpureo. *C. Bauh. Pin.* p. 389.

Anonis. *Dodon. Pempt.* p. 743.

Ononis arvensis α, β . *Gorter Flor.* VII. prov. n. 596.

*Veel langs de wegen, dyken en bouwlanden,
en op schrale weilanden.*

A Gortero nostro, ut olim a Linnæo, refertur ad

Ononidem arvensem ; a qua tamen specie hanc differre , plurimi hodie , & inter hos Murraius quoque ; contendunt ; num recte ? dubitare liceat.

47. PISUM petiolis supra planiusculis , caule angulato , stipulis sagittatis , pedunculis multifloris. *Syst. vég. 870. 13.* *maritimum.*

Crescit in littoribus Belgii (Linnæus *Hort. Cliffort. p. 369.*).

48. LATHYRUS pedunculis multifloris , cirrhis polyphyllis , stipulis lanceolatis. *Syst. vég. 872. 20.* *palustris.*

In de Ooster-mehen by Harderwyk.

49. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis , vexillis deflexis persistentibus , caulibus procumbentibus. *Syst. vég. 896. 43.* *procumbens.*
Rys-klaver Hardervicenis.

Langs het zee-strand by Harderwyk en Doorn-spyk.

50. TRIFOLIUM spicis subimbricatis , vexillis deflexis persistentibus , calycibus pedicellatis ; caulibus procumbentibus. *Syst. vég. 896. 44.* *filiforme.*

By Elburg, Bysfelt en Oldebroek op de Veluwe.

Simile admodum præcedenti, quocum recte, quantum video, junxit ill. Hallerus (*Hist. stirp. Helv.* n. 364.), qui cæterum augere magis amat, quam imminuere specierum numerum.

EX CLASSE XVIII

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

- montanum.* 51. *HYPERICUM* floribus trigynis, calycibus ferrato glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis glabris. *Syst. veg.* 902. 29.

Op de bergen langs den Rhyn, op Doreweerd.

- pulchrum.* 52. *HYPERICUM* floribus trigynis, calycibus ferrato glandulosis, caule tereti, foliis amplexicaulibus cordatis glabris. *Syst. veg.* 902. 35.

In de boschen van Doreweerd en Staverden op de Veluwe.

EX CLASSE XIX

SYNGENESESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

- hirtum.* 53. *LEONTODON* calyce toto erecto, foliis dentatis hirtis, fetis simplicissimis. *Syst. veg.* 912. 2.

Langs de wegen en op de gras-landen aan zee-kant by Harderwyk.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

54. *INULA* foliis amplexicaulibus ovatis rugosis *Helenium*, subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. *Syst. veg.* 956. 1.

Op vogtige plaatsen by Amelo.

Crescit in pratis succulentis & humidioribus per Belgium (Linnæus *Hort. Cliffort.*

p. 407., *Syst. plant. vol. III. p.* 824.).

Indigenam stirpem esse, etiam Boerhaavius significavit (*Ind. alt. horti Lugdb. tom. I. p.* 94. *n.* 1.).

55. *CHRYSANTHEMUM* foliis pinnatis multi-inodorum, fidis, caule ramoso diffuso. *Syst. veg.* 966. 10.

By Harderwyk, Elburg en Nykerk aan de wegen, vooral aan zee-kant.

EX CLASSE XX

G Y N A N D R I A.

D I A N D R I A.

56. *OPHRYS* bulbis aggregatis oblongis, caule *spiralis*, subfoliofo, floribus spirali secundis, nectarii labio indiviso crenulato. *Syst. veg.* 1011. 3.

By Hengelo in Overysfel (Ehrhart).

EX CLASSE XXI

M O N O E C I A.

T R I A N D R I A.

Sylvatica. *57. CAREX spicis pendulis, mascula erecta, femineis filiformibus pedunculo brevioribus, capsulis acutis distantibus. *Hudson. Flor. Angl. p. 353. n. 22.*

Carex vesicaria β . *Syst. plant. t. IV. p. 114.*, ubi synonyma enumerantur.

Op de Gagel-kampen by's Heeren-loo, niet verre van Harderwyk.

Jure hanc a Carice vesicaria distinguunt hodie botanici tantum non omnes.

S Y N G E N E S I A.

dioica. *58. BRYONIA foliis palmatis utrimque calloso scabris, floribus dioicis. *Jacquin Flor. Austr. vol. II. p. 59, Syst. veg. 1093. 2.*
Bryonia alba. *Pollich Palat. n. 915, Leers Herborn. n. 744, Hudson Flor. Angl. ed. 2. p. 337.*

Bryonia foliis palmatis utrimque calloso scabris. *Haller. Helv. n. 547.*

Bryonia aspera s. alba baccis rubris. *C. Bauh. Pin. p. 297.*

Vitis alba sive Bryonia. *J. Bauh. Hist. v. II. p. 243.*

Bryonia alba. *Dodon. Pempt. p. 399.*

Multis in Belgio locis reperitur (Dodonæus l. c.).

*Aan de heggen der tuinen en langs de wegen op schaduwachtige plaatsen by Har-
derwyk.*

Ad hanc speciem plura synonyma & loca natalia pertinent, a Gortero relata ad Bryoniam albam, a qua nostram non satis distinxit vir cl. In *Flora* enim vii. *prov. n.* 801., dicit suam plantam monoicam esse, & baccas nigras ferre; excitat autem eodem loco *Floram Gelro-Zutph. n.* 536, ubi expresse dicit, dioicam esse.

En autem genuina Bryoniæ albæ synonyma, quæ Gorterianis substitui queant:

Bryonia alba. *Scopoli Fl. Carn. n.* 1200.

Bryonia nigra. *Dodon Pempt. p.* 395.

Bryonia alba baccis nigris. *C. Bauh. Pin. p.* 297.

Vitis f. Bryonia nigris baccis. *J. Bauh. Hist. vol. 2. p.* 146.

EX CLASSE XXII

D I O N E A

D I A N D R I A

59. SALIX foliis ferratis glabris, floribus trian-
dris. *Syst. veg.* 1098. 2.

By Hengelo (Ehrhart).

60. SALIX foliis integerrimis utrinque villosis aurita,
obovatis appendiculatis. *Syst. veg.* 1098. 22.

By Hengelo (Ehrhart).

- incubacea.* 61. SALIX foliis integerrimis lanceolatis subtus villosis nitidis, stipulis ovatis acutis. *Syst. veg.* 1098. 26.

By Oldebroek *op de Veluwe* (Ehrhart).

- repens.* 62. SALIX foliis integerrimis lanceolatis utrinque nudiusculis, caule repente. *Syst. veg.* 1098. 27.

Aan het eind van de hoge Syfel, en elders op zandige vogtige plaatsen by Harderwyk.

EX CLASSE XXIV

CRYPTOGAMIA.

M U S C I.

- subulatum.* 63. PHASCUM (caulescens), foliis (lineari-) setaceis patulis. *Syst. veg.* 1189. 3.

Op de bouwlanden in het voorjaar by Harderwyk.

Neque ipsa planta acaulis, neque capsula sessilis est.
— In unico furculo non ramofo binas semel vidi capsulas.

- muticum.* *64. PHASCUM acaule, foliis ovatis muticis concavis conniventibus. *Schreber de Phasco.*

obss. p. 8. tab. I. fig. 11, 12. Spicileg. flor. Lips. p. 72. n. 779. Weber Spicil. flor. Götting. p. 126. n. 195.

Phascum acaulon β. *Linn. Syst. pl. v. IV. p. 450, Hudson Fl. Angl. p. 396, Weis Pl. cryptogam. floræ Götting. p. 267.*

Dillen. Hist. musc. xxxii. 12.

By het vorige, en by het Phascum acaulon.

Linnæus pro varietate habuit sui Phasci acauli, Distinxerunt vero Dillenium secuti, Schreberus, Weberus, Hedwigius. Hactenus Linnæi magis placeret sententia; quod enim Ph. muticum sit acaule, cuspidatum vero (i. e. acaulon Linn.) caulescat, non sufficere videtur ut distinguantur; sæpe enim eodem modo specimina occurrunt Phasci subulati vere acaulia, quæ tamen nemo ad distinctam speciem retulerit. Sed ipse cl. Schreberus agnoscit: „Phascum subulatum & cuspidatum, pro varietate soli natalis, magnitudinis & habitu admodum variare, ita ut sæpe pius novas species mentiantur”. Vid. *Obss.*

cit. p. 9.

*65. *PHASCUM caulescens*, foliis oblongis piliferis erectis. *Schreb. de Phasco p. 8. tab. I. f. 6. 7., Spicileg. p. 74. n. 11029.*

Op eenige muren te Nykerk op de Veluwe.

Hæc a reliquis omnino distincta videtur species.

*66. *BUXBAUMIA aphylla*, pedunculo elonga-*aphylla.*
to. Syst. veg. 1188. I.

44 PLANTARUM INDIGENARUM

Primum legi rariorem hunc muscum Aprili
1786, in het Puttensche bosch op de Veluwe.

urnige-
rum.

67. POLYTRICHUM caule ramosissimo, pedun-
culis axillaribus. *Syst. veg.* 1192. 4.

By Elmerink niet verre van Deventer (Ehr-
hart).

- fontanum. 68. MNIMUM (caule ramoso, capsulis subrotundis
obliquis). *Syst. veg.* 1193. 4.

By Harderwyk aan de oorsprong van de hoge
Sypel, en by Arnhem aan het begin van
kleine beekjes.

Pedunculi radicales perichætio manifesto squamoso,
(quod etiam Dillenius *Hist. musc. tab.* XLIV.
f. 2. d. e. f. delineat), cincti sunt. Raro caulis
vere simplex cernitur, neque in omnibus genicu-
lis inflexus.

- palustre. 69. MNIMUM caule dichotomo, foliis subulatis.
Syst. veg. 1193. 5.

Tuschen Heemze en de kleine Haar in Overys-
sel (Ehrhart).

annoti-
num.

70. MNIMUM foliis ovatis acuminatis pellucidis,
pedunculis subradicalibus, antheris nutanti-
bus. *Syst. veg.* 1193. 10.

By Harderwyk aan den kant van slooten, en
op vogtige plaatsen in de boschen,

71. MNIMUM calyptra villosa. *Syst. veg.* 1193. 16. *polytrichoides.*

α. capsulis subrotundis, foliis integerrimis.

In het Puttensche bosch.

In de boschen by het Loo (Ehrhart).

β. capsulis subcylindricis, foliis serrulatis.

In de boschen by het Loo (Ehrhart).

Merito has varietates Linnæanas plurimi hodie specie distinguunt, & Polytrichi generi utramque inferunt.

72. HYPNUM furculis vagis erectiusculis, foliis secundis recurvatis. *Syst. veg.* 1195. 11. *rugosum.*

Habitat in Hollandia (Linnæus *Syst. plant.* t. IV. p. 485).

73. HYPNUM furculis subproliferis plano pinna-
tis, cuspidatis, pedunculis aggregatis. *Syst. veg.* 1195. 18. *delicatissimum.*

In de boschen by het Loo (Ehrhart).

74. HYPNUM furculis vagis teretibus, foliis
ovatis acutis patulis. *Syst. veg.* 1195. 35. *curtipendulum.*

By de voorgaande (Ehrhart).

75. HYPNUM furculis vagis ramosissimis, ramis
filiformibus, antheris obliquis. *Syst. veg.* 1195. 37. *filiforme.*

Boerhaavius indigenam esse notavit (*Ind. alt. horti Lugd. B. p. 22. n. 42.*).

- muticum.* *76. HYPNUM (*compressum*) furculis plano pinatis, ramulis simplicibus proliferisque, pedunculis bipollices adæquantibus. *Necker Deliciæ Gallobelg. sylv. t. II. p. 477.*
 Hypnum cuspidatum β . inerme. *Weis Plant. cryptog. fl. Götting. p. 253.*, *Weber Spicil. fl. Gött. p. 59.*
 Hypnum purum β . *Pollich. Plant. Palat. t. III. n. 1044.*
 Hypnum (*compressum*) furculo erecto ramoso, ramis basi setiferis planis recurvisculis stipite triplo brevioribus. *Neck. Method. p. 159.*
 Hypnum (*compressum*) ramis apice attenuatis, foliis ovato lanceolatis, setis elongatis, capsulis inclinatis, operculo conico. *Schreb. Spicil. p. 96.*
 Hypnum ramis teretibus, foliis ovato lanceolatis, setis prælongis, capsula crassa, operculo conico. *Haller Helv. n. 1742.*
 Hypnum cupressiforme tenuius & compressius. *Dillen. Musc. XL. 47.*
 Muscus erectus, foliis angustis, caulibus appressis. *Vaillant Bot. Paris. p. 139. tab. 29. f. 10. (opt.)*

By Harderwyk in de Zandsteeg, het Klaver-bosch en elders.

Indigena etiam dicta planta a Boerhaavio. (*d. l. p. 20. n. 10.*)

Nomen triviale *compressi* minus convenit, quum

fic facile cum H. compresso Linnaeano confundatur.

*77. *HYPNUM* furculis ramosissimis, ramis teretibus subulatis, capsulis erectis. *Necker Delic. p. 475.*

Hypnum (*myurum*) furculo multifloro, superne præprimis ramoso, ramis recurvis rigidiusculis, foliis ovatis acuminatis, capsulis lanceolatis erectis. *Pollich Palat. n. 1054.*

Hypnum myosuroides γ. *crassius. Weber Spicil. p. 94.*

Hypnum foliis ovato lanceolatis, ramis teretibus compressis. *Haller Hely. n. 1754.*

Hypnum myosuroides *crassius*, capsulis erectis *Dillen. Musc. xli. 50.*

Muscus denticulatus minor nostras sericeus, capitulis *Adianthi. Vaill. Bot. tab. 28. f. 4.*

Aan de bomen op het Loo, en aan zee-kant tusfchen Harderwyk en Doornfpyk (Ehrhart).

Distinguunt Dillenius, Hallerus, Pollichius, Neckerus. Huic tamen aliter dein visum est, dixitque varietatem speciei affinem *Hypni myosuroidis*. Vid. *Method. musc. p. 183.*

*78. *HYPNUM* furculis vagis procumbentibus, *lutescens.* foliis ovatis lanceolatis subulatis striatis, capsulis obliquis. *Hudson Flor. Angl. p. 421., Schreber Spicil. p. 98.*

Hypnum (*ramosum*) furculis ramisque sparsis, foliis ovatis obtusis, antheris subcernuis. *Neck. Delic. p. 484.*

Hypnum sericeum β . *prælongum. Weis Cryptog. p. 255.*

Hypnum litigiosum β . *ramosum. Neck. Method. p. 180.*

Hypnum myosuroides δ . *prælongum. Weber Spicil. p. 94.*

Hypnum caulibus teretibus, foliis pilo terminatis, capsulis obliquis aristatis. *Haller Hely. n. 1753.*

Hypnum sericeum, furculis longioribus & rectoribus, capsulis incurvis. *Dillen. Musc. XLII. 60.*

By de voorgaande (Ehrhart).

Aan de bomen in de Haarlemmer Hout.

nitens.

*79. HYPNUM ramis brevissimis, foliis lanceolatis subulatis nitentibus. *Linn. fil. Meth. musc. p. 34., Syst. veg. 1195. 50.*

Hypnum (*trichodes*) ramis erectiusculis approximatis apice setiferis. *Necker Delic. p. 483.*

Hypnum (*trichodes*) furculo erecto, ramis approximatis, seta terminatis, foliis lanceolatis striatis, capitulis erectis. *Necker Meth. p. 161.*

Hypnum (*nitens*) furculis erectis, ramulis brevissimis, foliis lanceolatis appressis striatis, perichætiis longissimis, capsulis obliquis. *Schreber Spicil. p. 92., Weber Spicil. p. 86.*

Hypnum ramis compressis, foliis pilo aristatis nitentibus, capsulis erectis, operculis conicis. Haller Helv. n. 1784.

Hypnum palustre trichoides, ramulis crebris luteo & rufo virentibus glabris. Dillen. Musc. xxxix. 37.

Aan de zee-kant tusfchen Harderwyk en Doornfpyk (Ehrhart).

A L G Æ.

80. *JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pin-natis (bafi & medio floriferis), foliolis planis nudis (ovatis). Syst. veg. 1196. 3.*

Op vogtige befchaduwde plaatsfen, onder andere mosfen, in het Puttensfche bosfch op de Veluwe.

81. *JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pin-natis lanceolatis, apice floriferis, foliolis integerrimis. Syst. veg. 1195. 5.*

Aan de Vecht by Heemze (Ehrhart).

82. *JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pin-natis, apice floriferis; foliolis bidentatis. Syst. veg. 1196. 6.*

By de voorgaande (Ehrhart).

By Harderwyk aan de wallen der wegen, aan het eind van de hoge Syfel, op het Heerepad, en elders.

- bicuspidata.* 83. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis, medio floriferis, foliolis bidentatis. *Syst. veg.* 1196. 7.

By de vorigen (Ehrhart).

Huc pertinere videtur *Hall. Hist. stirp. Helv. n.* 1865.

- quinquedentata.* 84. JUNGERMANNIA frondibus pinnatis ramosis, apice floriferis, foliolis quinquedentatis *Syst. veg.* 1196. 8.

By de vorigen (Ehrhart).

In het Puttensche bosch, aan de wortels van boomen.

Cl. Necker recte ad hanc speciem retulit synonym. *Halleri Helv. n.* 1866, invito tamen Webero; Hallerus enim, nec male, ut videtur, Jungermanniam quinquedentatam & trilobatam conjunxit.

- undulata.* 85. JUNGERMANNIA frondibus supra bipinnatis, apice floriferis, foliolis subrotundis integerrimis undulatis. *Syst. veg.* 1196. 9.

By de vorigen (Ehrhart).

- nemorosa.* 86. JUNGERMANNIA frondibus supra bipinnatis, apice floriferis, foliolis ciliatis. *Syst. veg.* 1196. 18.

Op de heide, en in de boschen op beschaduwde plaatsen, by Harderwyk.

Granula illa rubra, caliculo terminali quasi inclu-

ta, Webero observata, etiam mihi sæpius videre contigit.

87. JUNGERMANNIA frondibus supra bipinna-^{resupina-}
tis, foliolis crenulatis imbricatis rotundis.^{ta.}
Syst. veg. 1196. 11.

In het Elspeeter bosch op de Veluwe.

88. JUNGERMANNIA frondibus subtus bipinna-^{trilobata;}
tis, foliolis quadratis obsolete trilobis. *Syst.*
veg. 1196. 13

*In het Puttensche bosch; en aan het Heere-
pad by Harderwyk.*

- *89. JUNGERMANNIA furculis erectiusculis con-^{pulcherri-}
fertis, foliis ovatis imbricatis subbifidis ci-^{ma.}
liatis. *Linn. fil. Method. musc. p.* 35.;
Syst. veg. 1196. 23.

Jungermannia pulcherrima. Weber Spicil. p.
150., Dickson Fascic. plantar. cryptog.
Brittann. p. 7.

Jungermannia (ciliaris) furculis repentibus,
foliolis duplicato imbricatis, inferne auri-
culatis ciliatis? Linn. Flor. Suec. n. 1044.,
Spec. plant. t. II. p. 1601., Pollich Palat.
n. 1073., Leers Flor. Herb. n. 907.

Jungermannia (ciliaris) furculis repentibus
pinnatis impubibus, foliis bifidis punctatis
ciliatis, stipulis nullis, amphigastriis bifidis
ciliatis, perisphæriis punctatis nudis. Ehr-
hart Hann. mag. d. l., & Beitr. z. na-
turk. II th. f. 149.

Lichenastrum scorpioides pulchrum villosum. Dillen. Musc. LXIX. 3.

By Heemze aan de Vecht (Ehrhart).

Non confundenda cum *Jungerm. ciliari* Linn. & *Gorteri* (*Flor. vii prov. n. 932.*), quam Ehrhartus d. l., nescio quare, vocat *Jungerm. Tomentellam.*

pinguis. 90. *JUNGERMANNIA* acaulis, fronde oblonga sinuata pingui. *Syst. veg. 1196. 30.*

Op vogtige lage plaatsen van heide-velden, als aan het eind van de hoge Sybel by Harderwyk.

Blasæ affinis.

cruciata. 91. *MARCHANTIA* calyce communi quadripartito, laciniis tubulosis. *Syst. veg. 1198. 3.*

„ In Belgio, juxta fossam Lugdunensem, intra primum lapidem ab urbe (Harlemo), vidi. ” Linnæus Hort. Cliff. p. 477.

fusilla. 92. *BLASIA.* *Syst. veg. 1199. 1.*

Aan het eind van de hoge Sybel, voor aan de Elspeeter weg, aan het eind van de Zandsteeg, en op diergelyke vogtige plaatsen by Harderwyk.

crySTALLINA. 93. *RICCIA* frondibus superficie papillofis. *Syst. veg. 1200. 1.*

By Harderwyk aan het eind van de hoge
Sypel.

94. *RICCIA* frondibus glabris canaliculatis bilo- glauca.
bis obtusis. *Syst. veg.* 1200. 2.

By de voorgaande , ook op braakliggende
bouwlanden aan den Enck en de Zand-
steeg , by Harderwyk.

95. *RICCIA* frondibus obcordatis ciliatis. *Syst. natans.*
veg. 1200. 3.

In de slooten onder het kroos (Lemna)
by Elburg.

96. *ANTHOCEROS* frondibus indivisis sinuatis *punctatus.*
punctatis. *Syst. veg.* 1201. 1.

Niet zeldzaam by Harderwyk , op dezelfde
plaatsen als de *Riccia* crySTALLINA en glauca.

97. *LICHEN* leprofus viridis , margine tubercu- atrovi-
lisque atris. *Syst. veg.* 1202. 3. *rens.*

Op de steenen langs de zee - dyk by Nykerk op
de Veluwe.

98. *LICHEN* leproso farinaceus , peltis stipitatis *lyssoides.*
subglobosis. *Syst. veg.* 1202. 4.

Tuschen Zwolle en de kleine Haar (Ehrhart).

Non differre ab hac specie videtur *Lichen* fungi-

formis Scopoli, Fl. Carn. n. 1364. & Weberi, Spicil. p. 896.

pertusus. 99. LICHEN leprofus, verrucis subtesselatis laevigatis pertusis, poro uno alterove cylindrico. *Syst. veg.* 1202. 7.

Vry gemeen aan de beuke- en sommige andere bomen by Harderwyk, het Loo, Arnhem en Doreweerd.

Weigelius & Weberus hunc ad novum Sphaeriae genus retulerunt. Monuit autem jam Dillenius, hanc speciem non recte ad suum Lichenoidis genus referri, *Hist. musc.* p. 128.

atro-albus. 100. LICHEN leprofus niger, tuberculis atro alboque mixtis. *Syst. veg.* 1202. 14.

Op keisteenen op de heide by Doreweerd.

In nostris certe speciminibus color ater crustam constituit.

carpineus. 101. LICHEN leprofus cinereus, tuberculis albidis rugosis. *Syst. veg.* 1202. 19.

Aan de bomen by Harderwyk en het Loo (Ehrhart).

Ex his locis natalibus suspicor, cl. Ehrhartum hunc cum Lichene pertuso confudisse, quod etiam Neckerus fecit.

corallinus. 102. LICHEN leprofus ramosus teres fascicula-

tus fastigiatus confertissimus albus. *Syst. veg.* 1202. 20.

Op de steenen langs de zee-dyk by Nykerk (Ehrhart).

*103. LICHEN leprosus, crusta cinerea tenui, *cinereo*
tuberculis fuscis planis, adultioribus con- *fuscis.*
vexis. *Weber Spicil. p.* 188.

Lichen crusta tenuissima cinerea, scutellis
fuscis. *Haller Helv. n.* 2069.

*Aan de bomen by het Loo, en Oldebroek
op de Veluwe (Ehrhart).*

*104. LICHEN crustaceus farinaceus obscure fla- *ochroleu-*
vescens, tuberculis rubris immersis. *cus.*

Lichen (*ochroleucus*) rugosus obscure fla-
vescens, scutellis rubris planiusculis. *Nec-
ker Method. p.* 52.

Lichen (*Hamatomma*) crustaceus farina-
ceus pallescente albidus, scutellis sangui-
neis, junioribus concavis, adultioribus
convexis, margine granulato crassiuscu-
lo, crustæ coloris. *Ehrhart Hannov.
magaz. 1786. p.* 285, *Beiträge z. na-
turk. II. th. f.* 158.

Lichen (*coccineus*) crustaceus farinaceus
ex viridi sulphureus, tuberculis immersis
ruberrimis. *Dickson Fascic. plant. cry-
ptog. Brit. p.* 8. *tab. II. f.* 1.

Huc etiam pertinere omnino videtur Lichen
(*cruentus*) *Weber Spic. p.* 232. *tab. 1.*

Lichen crustaceus tartareus glaucus, scutis difformibus planis ruberrimis. *Haller Helv. n. 2050.*

Op de steenen aan de zee - dyk by Nykerk.

tartareus. 105. LICHEN crustaceus ex albo virescens, scutellis flavescens, margine albo. *Syst. veg. 1202. 25.*

By het Loo (Ehrhart).

Parellus. 106. LICHEN crustaceus albus, peltis concavis obtusis pallidis. *Syst. veg. 1202. 32.*

Op de steenen langs de zee - dyk by Nykerk (Ehrhart).

ster. *107. LICHEN crustaceus albicans, scutellis rugosis nigris. *Hudson. Flor. Angl. p. 445. Schreber Spicil. p. 132.*

Lichen (*nigricans*) crustaceus albicans, scutellis atris, margine cinereo laevi. *Necker Delic. p. 504.*

Lichen *subfuscus* a. *ater.* *Weis. Plant. cryptog. p. 49.*

Lichen crusta glauca verrucosa tenace. *Haller Helv. n. 2056?*

Lichenoides crustaceum & leprosum, scutellis nigricantibus majoribus & minoribus. *Dillen. Musc. xviii. 15.*

Op steenen en muren op verscheide plaatsen, by Harderwyk en Nykerk.

108. *LICHEN* imbricatus, foliolis obsolete mul-centrifugis
tiffidis lævibus albidis centrifugis, scutellis ^{gus.}
rufo-fuscis. *Syst. veg.* 1202. 34.

Op de steenen aan de zee-dyk by Nykerk.

109. *LICHEN* imbricatus, foliis lobatis truncatis ^{crispus.}
crenatis atroviridibus, scutellis concolori-
bus. *Syst. veg.* 1202. 40.

*Op de steenen langs de zee by Harderwyk;
op sommige muren te Leyden en Haar-
lem.*

- *110. *LICHEN* imbricatus, foliolis oblongis ob-orbiculari-
tuse multifidis, scutellis subfuscis. *Nec- ris.*
ker Delic. t. II. p. 509.

Lichen (orbicularis) fronde germinante
deformi scutellifera subrotunda, primor-
dialibus farinosis. *Necker Meth. p. 88.*

Lichen (pulverulentus) imbricatus, folio-
lis lobatis crenatis obtusis viridibus pol-
line conspersis, scutellis nigris margine
crenatis. *Schreber Spicil. p. 128., Ha-
gen Histor. Lich. p. 66. tab. II. f. 8.*

Lichen fronde cinerea profunde laciniata,
rotunde lobata, scutellis nigris. *Haller
Helv. n. 2016.*

Lichenoides glaucum orbiculare, segmen-
tis latioribus, scutellis nigris. *Dillen.
Musc. xxiv. 71.*

*Aan de wilge-bomen by Harderwyk, en in
de Haarlemmer Hout.*

Aan de bomen tusfchen Harderwyk en Doornfpyk , en tusfchen Utrecht en Amersfoort (Ehrhart).

pullus. *111. LICHEN imbricatus, foliolis nitidis lobatis, scutellis margine lævibus. *Necker Delic. t. II. p. 510.*

Lichen (*pullus*) fronde lævi scutellifera germinante distorta, primordialibus granulosis. *Necker Meth. p. 94.*

Lichen (*pullus*) imbricatus, foliolis lobatis olivaceis, scutellis integerrimis. *Schreber Spicil. p. 131.*

Lichen fronde femipinnata rotunde lobata olivacea, scutellis lævibus. *Haller Hely. n. 2013.*

Lichenoides olivaceum, scutellis lævibus. *Dillen. xxiv. 77.*

Lichen crustæ modo arboribus adcrefcens pullus. *Boerh. Ind. alt. hort. L. B. part. I. p. 16.*

Boerhaavius l. c. indigenam esse notavit.

Acetabulum. *112. LICHEN imbricatus, foliolis obtusis, scutellis folio concoloribus subtus rugosis. *Necker Delic. t. II. p. 5.*

Lichen (*Acetabulum*) fronde suborbiculata luteo virescente lævi, scutellis folio concoloribus subtus rugosis. *Necker Meth. p. 94.*

Lichenoides acetabulis cutaneis & rugosis. *Dillen. Musc. xxiv. 79.*

Lichen pulmonarius cinereus, five arboreus

e cinereo viridis. *Vaillant. Bot. Paris. tab. 21. f. 13.*

Aan de bomen tusſchen Utrecht en Amersfoort, en by Zwol (Ehrhart).

*113. LICHEN foliaceus gelatinofus subrotundus *nigrescens*, lobatus rugofus atrovirens, ſcutellis confertis rufis. *Hudson Fl. Angl. p. 450., Linn. fil. Suppl. Plant. p. 451., Syst. veg. 1202. 72.*

Lichen (*cristatus*) foliaceus gelatinofus membranaceus lobatus, ſcutellis concavis cristatis rubris. *Scopoli Flor. Carniol. n. 1410.*

Lichen (*Laduca*) gelatinofus membranaceus exasperatus convolutus atroviridis, ſcutellis rubris. *Haller. Helv. n. 2037., Weber Spicil. p. 252.*

Lichen pulmonarius membranaceus gelatinofus pullus, in ſegmenta latiora diviſus, receptaculis florum exiguis obſcure rubris numeroſiſſimis. *Michel. Gen. plant. p. 87., Meese Flor. Friſ. n. 492. †.*

Lichenoides gelatinofum membranaceum tenue nigricans. *Dillen. Muſc. xix. 20.*

Op de baſt van ypen-bomen te Hytzum in Vriesland (Meese l. c.).

Aan verſcheide bomen, vooral ypen, by Harderwyk en Elburg.

*114. LICHEN foliaceus laciniatus albus, laciniis suberecis obtuſis pilofis, ſcutellis

sessilibus. *Scopoli Flor. Carn.* ed. 1. p. 110., ed. 2. n. 1406., *Hagen Hist. Lich.* p. 80.

Lichen hispidus. *Schreber Spicil.* p. 126.

Lichen ciliaris β . *albidus.* *Weis Plant. cryptog.* p. 63., *Necker Meth.* p. 102.

Lichen fronde profunde laciniata semitubulosa ciliata. *Haller Helv.* n. 2019.

Lichenoides hispidum minus & tenerius, scutellis nigris. *Dillen. Musc.* xx. 46.

Lichen cinereus arboreus, marginibus fimbriatis. *Vaillant. Botan. Paris. tab.* 20. f. 4. a. b.

By Arnhem, Harderwyk, het Loo, Amersfoort, Haarlem, Leyden, en elders, op de bast van de sleedoorn, wilg, denne en andere bomen.

Est omnino species a *L. ciliari* distincta.

aphotus. 115. *LICHEN coriaceus repens lobatus obtusus planus,* verrucis sparsis, pelta marginali adscendente. *Syst. veg.* 1202. 76.

In het denne-bosch op Staverden op de Veluwe.

perlatus. 116. *LICHEN coriaceus repens lobatus glaber, subtus ater,* scutellis pedunculatis integris. *Syst. veg.* 1202. 82.

Aan de bast der bomen by Harderwyk, aan de weg naar Elburg.

- *117. LICHEN foliis adscendentibus multifido *foliaceus*.
 laciniatis, subtus niveis, scyphiferis, scy-
 phulis conicis brevissimis. *Hudson Flor.*
Angl. p. 457.
 Lichen qui Muscosungus terrestris minor
 crispus &c. *Morisoni. Boerh. Ind. p. 17.*
n. 18.

Boerhaavius d. l. indigenam esse significat.

118. LICHEN fruticulosus solidus, tectus folio-*paschalis*.
 lis crustaceis. *Syst. veg. 1202. 111.*

Op hoge schrale heide-velden van de Veluwe ,
by Harderwyk , Elspeet , en Putten.
Tusfchen Zwol en de kleine Haar (Ehrhart).

- *119. LICHEN fruticulosus ramosus nudus, cau-*spinosus*.
 le retrorsum aculeato, ramulis acutis tu-
 berculatisque. *Necker Delic. p. 521.,*
Hagen Hist. p. 126. tab. 2. f. 11.
 Lichen (*spinosus*) fronde tereti ramosa re-
 trorsum aculeata, ramulis acutis tubercu-
 latisque. *Necker Meth. p. 64.*
 Lichen (*spinosus*) fruticulosus tubulosus
 ramosissimus spinosus, ramulis tubercu-
 latis subdigitatis. *Oeder Enum. plant.*
flor. Dan. p. 29., Hudson Fl. Angl.
p. 459.
 Lichen fruticosus vage ramosus foliosus,
 extremis ramis palmatis fungiferis. *Hal-*
ler Helv. n. 1952.
 Coralloides sparsum, caulibus tortuosis &
 spinosis. *Dillen. Musc. xvi. 25.*

Op eenige riet-daken in Veldwyk by Harderwyk.

aculeatus. *120. LICHEN foliaceus diffusus compressus ramosissimus, ramulis furcatis spinulosis. *Schreber Spicil. p. 125., Weber Spicil. p. 207.*

Lichen fruticosus durus castaneus, furculis spinosis. *Haller. Helv. n. 1965.*

Coralloides fruticuli specie fuscum spinosum. *Dillen. Musc. xvii. 31.*

Coralloides &c. *Boerh. Ind. t. I. p. 19. n. 4.*

Op de heide by Harderwyk, en op de duinen by Haarlem.

Boerhaavius d. l. *indigenam esse significavit.*

Papillaria.

*121. LICHEN fruticulosus fistulosus aphyllus albidus, ramis paucissimis obtusis brevissimis, tuberculis terminalibus carneis. *Ehrhart Hannov. magaz. 1783. f. 218, Beiträge II. b. f. 105., Dickson. Fascic. p. 13.*

Lichen fragilis a. minimus. *Weber Spicil. p. 206.*

Lichen caule fruticoso ramoso erecto densissime caespitoso. *Hall. Helv. n. 1962.*

Coralloides minimum fragile madreporæ instar nascens. *Dillen. Musc. xvi. 28.*

Op de heide by Voorthuizen aan den weg naar Appeldoorn (Ehrhart.)

- *122. LICHEN fruticulosus ramosus tubulosus, furcatus.
ramis erectis furcatis. *Hudson Flor. p.*
458., *Oeder Enum. p. 29.*

Lichen caule fruticoso subfolioso, ramis
adscendentibus repetito bifurcatis pun-
ctiferis. *Haller Hely. n. 1954.*

Dillen. Musc. xvi. 27.

Op de heide by Harderwyk.

In Vriesland (Meese Flor. Fris. n. 502 † a.).

- *123. VALSA (*corticalis*). *Scopoli Flor. Carn. corticalis.*
n. 1416.

Lichen - Agaricus cespitosus acaulis nigri-
cans, sub-cute Anagyridis non foetidae
erumpens. *Michel. Gen. p. 105. tab. 54.*
f. 5., Meese Flor. Fris. n. 477., Gor-
ter Flor. vii prov., plant. dub. n. 1081.

Aan de stammen van zware eschen-bomen
in Vriesland (Meese l. c.).

Lichenoides tuberculosum compressum nigrum,
lignis putridis adnascens, *Dilleni*, quod huc
refert *Scopoli*, potius ad *Lycoperdon vario-*
losum Linn. pertinere videtur.

124. TREMELLA erecta plana, margine crispo lichenoi-
lacinulato. *Syst. veg. 1204. 5.* *des.*

Onder andere mosfen op de vogtige heide-
velden van de Veluwe.

Indigenam esse quoque notavit *Boerhaavius*
Ind. horri Lugdb. t. I. p. 17. n. 19.

- lanceus.* 125. *FUCUS* fronde filiformi compressa dichotoma undique utrinque tuberculata. *Syst. veg.* 1205. 20.

Aan het zee-strand by de Helder, Katwyk en Scheveningen.

- digitatus.* 126. *FUCUS* fronde palmata, foliolis ensiformibus, stirpe tereti. *Syst. veg.* 1205. 37.

Aan het zee-strand by Roptazyl in Vriesland (Meese Beschryving en afbeelding ding van eene zonderlinge zee-plant &c. gevoegd agter de Opheldering van de XIX classe van de Genera plantarum van Linnaeus).

- umbilicalls.* 127. *ULVA* plana orbicularis sessilis peltata coriacea. *Syst. veg.* 1206. 2.

Aan het zee-strand by de Helder.

- reticulata.* 828. *CONFERVA* filamentis reticulato coadunatis. *Syst. veg.* 1207. 11.

By Harderwyk in de Wei-beek, en te Velp in de graft van de Pastory.

- gelatinosa.* 129. *CONFERVA* filis ramosis moniliformibus, articulis globosis gelatinosis. *Syst. veg.* 1207. 13.

Aan houten palen in de Hierder-beek op den Esenburg by Harderwyk.

Recte asseruit cl. Weis, hanc plantam male ad genus *Conservæ* a Linnæo relatam esse. Sed neque præcedens, neque variæ species aliæ, uno eodemque *Conservæ* genere contineri commode queunt.

130. *Byssus pulverulenta cinerea rupes ope-saxatilis*,
riens. *Syst. veg.* 1208. 9.

Veel aan oude steenen en muren.

F U N G I.

131. *AGARICUS stipitatus*, pileo plano carneo *lactifluus*,
lactescente, lamellis rufis, stipite longo
carneo. *Syst. veg.* 1209. 7.

In de boschen by Harderwyk.

- *132. *AGARICUS* pileo fusco murino spadiceo *pustulatus*,
cinereo, verrucis & lamellis albis, an-
nulo magno, tubere crasso. *Scopoli Flor.*
Carn. tom. II. n. 1461.

Agaricus caulescens, pileo convexo cine-
reo, verrucis lamellisque albis, stipite
basi crassiusculo. *Linn. Flor. Suec. n.*
1236.

Amanita petiolo procero fistuloso annula-
to, pileolo plano striato verrucoso for-
dido, lamellis albis. *Haller. Helv. n.* 2397.

Agaricus &c. *Schaeffer Fung. tab.* 90.

Agaricus amplissima volva exceptus, pi-
leolo plano spadiceo verrucoso in margi-
ne striato, lamellis candidis, petiolo au-

nulato & fistuloso, radice tuberosa. *Gleditsch Fung. p. 85. c.*

Fungus pustulatus. *Sterbeek Campernoeil-
len p. 206. tab. 20. k.*

By Harderwyk en Putten in de boschen.

- luteus.* 133. *BOLETUS stipitatus*, pileo pulvinato sub-
viscido, poris rotundatis convexis flavis-
simis, stipite albo. *Syst. veg. 1210. 16.*

*Op verscheidene plaatsen in de boschen by
Harderwyk.*

- bovinus.* 134. *BOLETUS stipitatus*, pileo glabro pulvi-
nato marginato, poris compositis acutis,
porulis angulatis brevioribus. *Syst. veg.
1210. 17.*

By de voorgaande, doch menigvuldiger.

Plures hujus apud nos occurrunt varietates.

- imbricat-
um.* 135. *HYDNUM acaule arcuato rugosum tomen-
tosum.* *Syst. veg. 1112. 6.*

*Aan neergehouwene boomen te Putten op
de Veluwe.*

*In ons land groeiende gevonden (Houttuyn
Natuurk. hist. II deel xiv ft. bl. 634.)*

- pineti.* 136. *HELVELLA acaulis.* *Syst. veg. 1214. 2.*

In het bosch van Vanenburg op de Veluwe.

137. CLAVARIA clavæformis simplicissima. Syst. *pipillaria*.
veg. 1216. 1.

*Aan het eind van de hoge Sytel, en op de
agterste Stads-weide by Harderwyk.*

138. CLAVARIA clavata integerrima compressa *ephiogloss-*
obtusa. Syst. veg. 1216. 5. *soides.*

*Aan het eind van de Zandsteeg, en op an-
dere vogtige plaatsen, op de heide by
Harderwyk.*

139. LYCOPERDON parasiticum subrotundum *trunca-*
truncatum. Syst. veg. 1217. 14. *tum.*

In de boschen van het Loo (Ehrhart).



PLANTÆ DUBIÆ, QUARUM
QUE HABITATIO IN BELGIO
INCERTA VIDETUR.

fruticosa. 140. SALICORNIA caule erecto fruticoso. *Syst. veg.* 10. 2.

Inter indígenas Belgii stirpes numeratur a Linnaeo (*Flora Belgica in Amœn. acad. vol. VI. p. 44.*). Vix tamen crediderim, plantam hyemes nostras ægre ferentem, in patria nostra vere indigenam reperiri.

latifolia. 141. VERONICA racemis lateralibus, foliis cordatis rugosis dentatis, caule stricto. *Syst. veg.* 25. 30.

Op het kerk-hof te Donjum, en in moes-hoven tusſchen de vruchten, ook op akkers met bomen beplant in kweekeryen (Meeſe Flor. Friſ. n. 12.).

Videtur vir induſtrius hanc cum Veronica Chamædry confuſiſſe. Planta enim, hucdum non niſi in Helvetia, Austria & Bithynia viſa, vix adeo vulgaris in Friſia eſſe poteſt.

142. GRAMEN paniculatum alpinum latifolium, panicula miliacea ſparſa. *Scheuchzer Agroſtogr. p. 134.*
Milium confertum. Linn.

„ Cum hoc conferri meretur gramen, quod

„ mense majo copiose crescit in nemore Ha-
 „ gæ Comitum adjacente.” Scheuchzer l. c.

143. LONICERA floribus verticillatis termina- *Ccaprifolium.*
 libus sessilibus, foliis summis connato per-
 foliatis. *Syst. veg.* 233. 8.

*In Vriesland, op veele plaatsen in de Wouden
 in boschen en wildernissen (Meese Flor.
 Fris. n. 96).*

Loniceram Periclymenum intellexisse videtur
 Meefius.

144. ERICA antheris aristatis, corollis campa- *scoparia.*
 nulatis, stigmate exserto peltato, foliis ter-
 nis. *Syst. veg.* 484. 14.

Linnaeus inter stirpes Belgii nostri indigenas
 recenset (*Flora Belgica, Amœn. acad.*
l. c. p. 52). Sed videtur E. Tetralicem
 voluisse.

145. RANUNCULUS (*Philonotis*) radice fas-
 ciculata, herba pilosa, caule erecto ramo-
 so, foliis ternatis, foliolis trilobis, lobis
 crenato incis, apicibus puncto albo ter-
 minatis, pedunculis fulcatis, calyce re-
 flexo, fructu globoso, seminibus compres-
 sis acuminatis. *Ehrhart Hannov. Magaz.*
1783. f. 270.

*Aan zee-kant tuschen Harderwyk en Doorn-
 spyk (Ehrhart). Quo tamen loco ipse non*

alias Ranunculi species, præter repentem, acrem
& sceleratum inveni.

Ranunculus Sardous Crantzii, quem huc refert
Ehrhartus, alia planta esse videtur.

146. ORCHIS batavica sexta. *Clusius Rarior.*
plant. hist. p. 268.

„ Rara inventu crescit in marinis aggeri-
bus — ; interdum etiam reperitur cir-
ca Hagam Hollandiæ ” (*Clusius l. c.*).

147. CAREX spicis femineis pedunculatis laxis,
masculina erecta, fulcris petiolorum aphyll-
is spathæformibus. *Linn. Hort. Cliff. p.*
439. n. 7.

Crescit in nemoribus Belgii rarius (*Linn.*
l. c.).

Ceterach. 148. ASPLENIUM frondibus pinnatifidis, lobis
alternis confluentibus obtusis. *Syst. veg.*
1178. 9.

Indigenam significavit Boerhaavius (*Ind.*
alt. t. I. p. 25.). Vix autem verisimile, fili-
cem hanc, quæ ob frigoris impatientiam in
hybernaculis nostris affervari solet, sponte in
Belgio crescere.

149. LICHEN, qui musco-fungus lichenoides ar-
borum hybernicus scutellatus Morisoni.
Boerh. Ind. alt. t. I. p. 17. n. 20†.

Huc pertinet *Dillen. Musc. xxv. 98*, qui est *Haller. Helv. n. 2002*.

Boerhaavius d. 1. indigenam esse significat.

150. LICHEN fruticulofus solidus aphyllus subra- *Roscella*,
mosus, tuberculis alternis. *Syst. veg. 1202*.

115.

Coralloides n. 3†. *Boerh. Ind. alt. n. 3. p. 19*.

Ex insulis Archipelagi & Canariis ad usus tinctorios afferri solet. Boerhaavius d. 1. Belgii etiam indigenam esse notat; de quo tamen vehementer dubitaverim. Pluresque alias stirpes, gramina imprimis & cryptogamicas pro indigenis idem vir summus recenset, quas vix credas revera in Belgio nostro reperiri. Videtur autem Boerhaavius stirpium exoticarum notitia multo magis imbutus fuisse, quam minimarum & difficilioris indaginis indigenarum; (qua de re conferri merentur, quæ Hallerus in *præf. ad Agrostographiam Scheuchzerianam* de litterario quodam inter Boerhaavium & Scheuchzerum duello narrat); quod quidem, quum etiam hodie, post illustratas, a Scheuchzero Graminum, a Dillenio Muscorum & Algarum, familias, de multis botanicis nimis verum sit, Boerhaavio fane, eximiis his subsidiis plane destituto, & maximo in reliquis viro, quivis facile condonaverit.

* * *

* *

*

VARIETATES IN FLORA VII
 PROVINCICIARUM NON RE-
 CENSITÆ.

ERICA vulgaris, corollis albis.

Hier en daar op de heide-velden by Harderwyk.

SAPONARIA officinalis, floribus plenis.

In den Enck by Harderwyk.

ANEMONE nemorosa, flore ex purpura rubente. *Boerh. Ind. alt. t. I. p. 36. n. 2.*

In het Haagſche bosch (Boerhaave l. c.).

ANEMONE nemorosa, flore pallide purpurascente. *Boerh. l. c.*

Op dezelfde plaats (Boerhaave).

ANEMONE nemorosa, flore pallide viridescente. *Boerh. l. c.*

By de voorgaande (Boerhaave).

GLECOMA hederacea, antheris in tubo floris sessilibus.

Gemeen in het begin van het voorjaar by Harderwyk.

Talia specimina unice conspexisse videntur ill. Hallerius, quum inter characteres Glecomæ ponat: „Stamina brevissima in tubo floris latentia” (*Hist. stirp. Helv. n. 245.*); & forte Scopoli, dum antherarum

fitum cruciformem, satis cæterum manifestum, plane neget (*Flor. Carniol. t. I. n. 730.*). Tales quoque flores sefellisse Retzium videntur, dum dicat, Glecomam hederaceam primo vere plerumque destitui floribus masculinis (Vid. *Comm. Lips. de rebus Sc. t. xxiv. p. 675.*). Quum autem tales flores quasi-feminei primo tantum vere maxime frequentes observentur, haud alienum videtur statuere, providam naturam ideo antheras in tubum corollæ recondidisse, ut, hac ratione, tenella illa generationis instrumenta adversus aëris inclementiam defenderet.

THYMUS Serpillum, angustifolium glabrum.
Linn. varietas §.

Op de heide-velden by Harderwyk.

PRUNELLA vulgaris, corollis albis.
Op Doreweerd.

PRUNELLA vulgaris (grandiflora), coerulea,
magno flore. *Syst. veg. 735. 1α.*
In den Enck by Harderwyk.

Hallerus & Pollichius pro distincta specie describunt. Videtur autem varietas tantum esse *Prunellæ vulgaris*; quamvis tamen ab hac, eodem forte jure, distingui posset, ac *P. laciniata*, quam ipse Linnæus ex vulgari ortam dicit.

PEDICULARIS sylvatica, corollis albis.
Op de Gagel-kampen by Emaus buiten Har-
derwyk.

CARDAMINE pratensis, floribus plenis.
Op vogtige weilanden aan de zee by Harderwyk.

ANTIRRHINUM *Linaria*, floribus inferioribus perfectis, superioribus monstrosis Peloriæ.

Op een bouwland aan den Enck by Harderwyk, en aan den weg even buiten Naarden.

Flores, in plerisque mihi visis speciminibus, 4 vel 5 superiores in Peloriam degeneraverant, reliquis *Linariæ* naturalibus; in nonnullis unicus tantum Peloriæ flos aderat. Ergo Peloria non est planta hybrida.

Flores inferiores Peloriæ, superiores *Linariæ*, vidit cl. Krafcheninikof. Vid. *Scopoli Fundam. botan. p. III.*

BRYUM *striatum* ulophyllum, β . Linn.

Weissia ulophylla. Ehrhart *Beiträge zur naturk.* I th. f. 191.

Aan de bomen by Harderwyk, Haarlem, Leyden. en andere plaatsen.

BRYUM *extinctorium* majus, β . Linn.

Op den Esfenburg by Harderwyk.

BRYUM *hypnoides* virescens, β . Linn.

Op de heide-velden by Harderwyk.

LICHEN *islandicus* angustifolius, β . Linn.

Aan het zee-strand tusfchen Harderwyk en Doornspyk (Ehrhart).

LICHEN *islandicus* tenuissimus, γ . Linn.

Op de heide-velden by Harderwyk.

I N D E X.

A.

| | |
|---|---------|
| <i>Agaricus lactifluus.</i> | pag. 65 |
| <i>pustulatus.</i> | ibid. |
| <i>Aira præcox.</i> | 17 |
| <i>Alisma natans.</i> | 28 |
| <i>Anemone nemorosa</i> β , γ , δ . | 72 |
| <i>Anethum graveolens.</i> | 24 |
| <i>Anthoceros punctatus.</i> | 53 |
| <i>Antirrhinum Linaria</i> β . | 74 |
| <i>Afarum europæum.</i> | 31 |
| <i>Asplenium Ceterach.</i> | 70 |
| <i>Atropa Belladonna.</i> | 22 |

B.

| | |
|--------------------------------------|-------|
| <i>Blasia pusilla.</i> | 52 |
| <i>Bryonia dioica.</i> | 40 |
| <i>Bryum exstinctorium</i> β . | 74 |
| <i>hypnoides</i> β . | ibid. |
| <i>friatum</i> δ . | ibid. |
| <i>Buxbaumia aphylla.</i> | 43 |
| <i>Bysfus saxatilis.</i> | 65 |

C.

| | |
|--|----|
| <i>Cardamine pratensis</i> β . | 73 |
| <i>Carex sylvatica.</i> | 40 |
| | 70 |
| <i>Cerastium aquaticum.</i> | 30 |
| <i>Chrysanthemum inodorum.</i> | 39 |
| <i>Chryso-splenium oppositifolium.</i> | 29 |

| | |
|-----------------------------|---------|
| <i>Conserva gelatinosa.</i> | pag. 64 |
| <i>reticulata.</i> | ibid. |

| | |
|--------------------------------|----|
| <i>Convallaria multiflora.</i> | 24 |
| <i>Crambe maritima.</i> | 35 |
| <i>Cratægus monogyna.</i> | 32 |
| <i>Cuscuta Epithymum.</i> | 21 |

D.

| | |
|----------------------------|----|
| <i>Dianthus deltoides.</i> | 29 |
|----------------------------|----|

E.

| | |
|------------------------------|----|
| <i>Erica multiflora.</i> | 28 |
| <i>scoparia.</i> | 69 |
| <i>vulgaris</i> β . | 72 |
| <i>Euphorbia campestris.</i> | 31 |

F.

| | |
|---------------------------|-------|
| <i>Festuca rubra.</i> | 18 |
| <i>Fragaria sterilis.</i> | 33 |
| <i>Fucus digitatus,</i> | 64 |
| <i>loreus.</i> | ibid. |

G.

| | |
|------------------------------------|----|
| <i>Galium saxatile.</i> | 21 |
| <i>Gentiana Amarella.</i> | 22 |
| <i>filiformis.</i> | 23 |
| <i>Glecoma hederacea</i> β . | 72 |

H.

| | |
|------------------------------|----|
| <i>Helvella Pineti.</i> | 66 |
| <i>Holosteum umbellatum.</i> | 20 |

| | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| <i>Hordeum maritimum.</i> | pag. 18 | Lichen <i>Acetabulum.</i> | pag. 58 |
| <i>secalinum.</i> | 19 | <i>aculeatus.</i> | 62 |
| <i>Hypericum montanum.</i> | 38 | <i>aphthosus.</i> | 60 |
| <i>pulchrum.</i> | ibid. | <i>ater.</i> | 56 |
| <i>Hypnum curtipendulum.</i> | 45 | <i>atroalbus.</i> | 54 |
| <i>delicatulum.</i> | ibid. | <i>atrovirens.</i> | 53 |
| <i>filifolium.</i> | ibid. | <i>byssoides.</i> | 53 |
| <i>lutescens.</i> | 47 | <i>carpineus.</i> | 54 |
| <i>muticum.</i> | 46 | <i>centrifugus.</i> | 57 |
| <i>nitens.</i> | 47 | <i>cinereofuscus.</i> | 55 |
| <i>rugosum.</i> | 45 | <i>corallinus.</i> | 54 |
| <i>viviparum.</i> | 47 | <i>crispus.</i> | 57 |
| I. | | <i>foliaceus.</i> | 61 |
| <i>Inula Helenium.</i> | 39 | <i>furcatus.</i> | 63 |
| <i>Isatis tinctoria.</i> | 35 | <i>islandicus β. & γ.</i> | 74 |
| <i>Juncus nemorosus.</i> | 26 | <i>nigrescens.</i> | 59 |
| <i>Tenageia.</i> | 25 | <i>ochroleucus.</i> | 55 |
| <i>tenellus.</i> | ibid. | <i>orbicularis.</i> | 57 |
| <i>Jungermannia bicuspidata.</i> | 50 | <i>Papillaria.</i> | 62 |
| <i>bidentata.</i> | 49 | <i>Parellus.</i> | 56 |
| <i>lanceolata.</i> | ibid. | <i>paschalis.</i> | 61 |
| <i>nemorosa.</i> | 50 | <i>perlatus.</i> | 60 |
| <i>pinguis.</i> | 52 | <i>pertusus.</i> | 54 |
| <i>pulcherrima.</i> | 51 | <i>pullus.</i> | 58 |
| <i>quinqüedentata.</i> | 50 | <i>Roccella.</i> | 71 |
| <i>resupinata.</i> | 51 | <i>spinosus.</i> | 61 |
| <i>trilobata.</i> | ibid. | <i>tartareus.</i> | 56 |
| <i>undulata.</i> | 50 | <i>tenellus.</i> | 59 |
| <i>viticulosa.</i> | 49 | | 70 |
| | | <i>Lonicera Caprifolium.</i> | 69 |

L.

M.

| | | | |
|--------------------------|----|-----------------------------|----|
| <i>Leontodon hirtum.</i> | 38 | <i>Marchantia cruciata.</i> | 52 |
|--------------------------|----|-----------------------------|----|

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|---------|
| <i>Mentha hirsuta.</i> | pag. 34 | <i>Riccia glauca.</i> | pag. 53 |
| <i>Milium confertum.</i> | 68 | <i>natans.</i> | ibid. |
| <i>Mnium annotinum.</i> | 44 | <i>Rosa rubiginosa.</i> | 53 |
| <i>fontanum.</i> | ibid. | <i>Rumex Nemolapathum.</i> | 27 |
| <i>palustre.</i> | ibid. | | S. |
| <i>polytrichoides</i> $\alpha.$ & $\beta.$ | 45 | | |
| <i>Myagrum paniculatum.</i> | 35 | <i>Salicornia fruticosa.</i> | 68 |
| | O. | <i>Salix aurita.</i> | 41 |
| <i>Ononis spinosa.</i> | 36 | <i>incubacea.</i> | 42 |
| <i>Ophrys spiralis.</i> | 39 | <i>repens.</i> | ibid. |
| <i>Orchis.</i> | 70 | <i>triandra.</i> | 41 |
| | P. | <i>Saponaria vulgaris</i> $\beta.$ | 72 |
| <i>Panicum viride.</i> | 17 | <i>Schoenus albus.</i> | 16 |
| <i>Papaver dubium.</i> | 34 | <i>fuscus.</i> | ibid. |
| <i>Pedicularis sylvatica</i> $\beta.$ | 73 | <i>Sedum reflexum.</i> | 30 |
| <i>Phalaris canariensis.</i> | 16 | <i>Sium angustifolium.</i> | 23 |
| <i>Phascum muticum.</i> | 42 | <i>Spergula pentandra.</i> | 32 |
| <i>piliferum.</i> | 43 | <i>Stellaria aquatica.</i> | 29 |
| <i>subulatum.</i> | 42 | | T. |
| <i>Pisum maritimum.</i> | 37 | <i>Thymus Serpillum</i> $\beta.$ | 73 |
| <i>Poa salina.</i> | 17 | <i>Tremella lichenoides.</i> | 63 |
| <i>Polygala amara.</i> | 36 | <i>Trifolium filiforme.</i> | 37 |
| <i>Polygonum dumetorum.</i> | 28 | <i>procumbens.</i> | ibid. |
| <i>Polytrichum urnigerum.</i> | 44 | | U. |
| <i>Potamogeton gramineum.</i> | 22 | <i>Ulva umbilicalis.</i> | 64 |
| <i>marinum.</i> | ibid. | | V. |
| <i>Prunella vulgaris</i> $\alpha.$ $\beta.$ | 73 | <i>Valsa corticalis.</i> | 63 |
| | R, | <i>Veronica latifolia.</i> | 68 |
| <i>Ranunculus Philonotis.</i> | 69 | <i>verna.</i> | 15 |
| <i>Riccia crystallina.</i> | 52 | | |

C O R R I G E N D A.

Præfat. pag. xi. not. lin. 4., leg. *Phytophylacium*.

pag. 17. lin. 27. *maritima*, leg. *salina*.

F L O R A

VII PROVINCiarUM

BELGII FOEDERATI

I N D I G E N A.

IN EFFIGIEM
DAVIDIS GORTERI.

Doctus opes carae miras qui Chloridos auget,
Quemque vocat Phœbus, quemque Hygiea suum;
Talis Mentorea GORTERVS cernitur arte,
Naturæ et pandit grande potentis opus.
Donec ab Hoc crescet ducens GORTERIA famam,
Æmula LINNÆO nomina, Belga, cole.

HENR. JOAN. ARNTZENIVS.
Ictus et Antecess. Groning.

IN EANDEM EFFIGIEM.

Haec est GORTERI Floram meditantis imago
Indigenam. Hic Batavi Laus adamata foli.
Rusforum Princeps Medicum veneratur amica.
Patria dum merito cingit honore caput.

PETRUS DREUX.

DAVIDIS DE GORTER,

A. L. M. Phil. & Med. Doct. antehac in Acad. Harderovicena Med. & Botan. Prof. ord. dein Augustissimæ Rufforum IMPERATRICIS Archiatri; Acad. Cæs. Nat. Cur. Imper. Scient. Petropol. Reg. Stockholm. Societ. Reg. Londin. Harlem. Rotterod. Fleffing. Agriculturæ Amftelod. Membri

FLORA

VII PROVINCICIARUM

BELGII FOEDERATI

INDIGENA.

H A R L E M I

Apud C. H. BOHN & FILIUM, Bibliopolas,

MDCCCLXXXI.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF

CHARLES THE FIRST

BY

JOHN BURNET

OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

IN TWO VOLUMES

LONDON

Printed by J. Sturges, in Pall-mall

1704

—

Printed by J. Sturges, in Pall-mall

1704

L. S.

Opusculum hoc originem suam debet Excur-
sionibus Botanicis, quas Anno 1735 comite Ill.
LINNÆO circa Harderovicum feci. Ab Anno
1743, quo mihi Botanices docendæ munus in
Academia Harderovicena demandatum fuit, Gel-
riam latius peragravi, Plantas in ea obvias studiose
annotavi, sicque Anno 1745 in lucem prodit
Flora Gelro-Zutphanica, continens Plantas 604.
qui numerus ad 682. increverat Anno 1754. quo
ad Aulam Imperialem Russicam ab ELISA-
BETA MAGNA *Glor. mem.* evocatus, Gel-
riæ valedixi. In Russia degens Catalogum illarum
78. Plantarum, quem penes me in peregrinis ter-
ris latere volebam, in propriam ipsarum Patriam
transmisi, ubi Anno 1757. Harderovici, titulo
Appendicis ad Floram Gelro-Zutphanicam typis
divulgatus est. Anno 1764 ego in Patriam redux,
& apud Batavoduranos dehinc vivens, Dioecesin
Ultrajectinam, Comitatum Buranum, Cuilenbur-
genssem, & Leerdamensem, aliaque loca vicina,
Plantas indigenas investigandi præsertim causa,
invisi.

Ex

Ex Plantis illis, et aliis antea in Gelria alibique a me lectis, tum ex C. PELETERII *Synonymia Plantarum Valachriæ*, H. BRUMANI *Indice stirpium circa Zuollam nascentium*, I. COMMELINI *Catalogo Plantarum indigenarum Hollandiæ*, H. BOERHAAVE *Indice altero Plantarum Horti Lugduno-batavi*, (in quo indigenæ Bataviæ Stirpes signo † notantur,) D. MEESE *Flora Frisica*, atque ex incerti Auctoris, sed periti methodoque Rajanæ addicti Botanici Manuscripto, in quo plures plantæ rariores in *Transysalania* nascentes designantur, confeci *Floram Belgicam*, Anno 1767 typis excusam, quam 1768 Supplemento primo, et 1771 Supplemento altero auxi. Quumvero nec omne Belgium peragraré, nec omnes in eo meandros perscrutari mihi datum fuerat, non defuerunt masculi Floræ Satellites, qui plures a me omittas Plantas, tum & aliarum locos natales benevole communicarunt, sicque Rem Herbariam Belgicam magnopere ditarunt.

Inter hos commemorare licet Perillustrem Equitem G. H. Baronem de ROUWENOORT, Dominum *Uilenpassiæ*, reliqua, Virum non modo Natalium & Munerum splendore insignem, sed & Botanices totiusque Historiæ Naturalis peritissimum, id quod Thesaurus Naturalium & Hortus Uilenpassianus ab-

abunde testantur; tum & Illustrissimum Ejus Filium H. A. G. *Baronem de ROUWENOORT*, Dominum in *Lange*; qui Viri Comitatus Zutphaniae rariores Plantas, alibi in Belgio vix aut non reperiundas, mecum communicarunt.

Vir Amplissimus J. DEUTZ, Senator & Scabinus Amstelodamensis, Rei Botanicæ scientia optime imbutus, qui omnis generis exoticas Plantas in amoenissimo suo Prædio Harlemum inter & Velsam confito colit, varias indigenas ibidem in vicinia a Se lectas rariores, & ab aliis prætervisas, benevole suppeditavit.

Nobilissimus W. FABRICIUS SIX, Dominus in *Oterleek*, nulli in diligenti stirpium indigenarum inquisitione & cognitione secundus, bene multas utriusque Hollandiæ Plantas contulit.

Summus Botanicus, Cel. D. VAN ROYEN Professor Leydenfis, Hortique Academici Præfectus, pluribus non solum plantis indigenis, sed & egregiis observationibus Botanicis Suppellectilem meam auxit.

Celeberrimus Vir M. W. SCHWENCKE, inclytus apud Haganos Medicinæ Practicus, Botanicesque Professor, amicus meus colendissimus, multas egregias Stirpes circa Hagam Comitum & in Delflandia collegit, earumque Syllabum benevole mihi misit.

M.

M. HOUTTUYN Medicus Amstelodamensis, amplissimo opere Historiæ Naturalis, secundum LINNÆI *Systema* digesto, cui etiamnum infudat, clarus, Plantarum complurium, quas in Hollandia boreali offendit, locos natales gratiosissime mihi significavit.

Clarissimus M. VAN MARUM Phil. & Med. Doct. & apud Harlemenfes Mathesios & Philosophiæ Lector, cum Groningæ degebat, Plantas istius Provinciæ, & præsertim eas, quæ circa Metropolin crescunt, exquisivit, earumque locos natales mihi impertiit: quod beneficium eo gratius erat, quum de Plantis ibi indigenis mihi, qui juvenis non nisi semel illam Provinciam invisi, nihil innotuerat.

Expertissimo G. I. RINK, Medicinam Tielæ Gelrorum cum laude facienti, acceptam refero accuratam designationem Plantarum in locis illi Urbi circumjacentibus crescentium.

Diligentissimus N. MEERBURGH, primarius in Horto Academico Lugduno-batavo Hortulanus, simulque peritus Botanicus, Pictor & Chalcographus, multas rariores plantas, præsertim Muscos, in Hollandia legit, quibus meam Collectionem ditavit.

Denique, sed non absque tristi recordatione, com-

commemoro Virum, intima mihi ab aliquot annis devinctum amicitia, D. FRED. RAINVILLE, Botanicum consummatissimum, Societati Physices experimentalis, quæ Rotterodami floret, adscriptum, ast eheu Anno 1779. Die Sexto mensis Junii, postquam diutissime gravi cum asthma con-
 flictaverat, vitamque pane solo & lacte toleraverat, rebus humanis ereptum. Incredibile est, quanta industria & solertia optimus ille Vir Plantas Belgii indigenas indagavit; Graminibus interim colligendis & extricandis præsertim intentus, quorum omnium, quotquot in Belgio pluribus annis legerat, specimina sicca mihi misit, doctissimasque de difficilioribus subjunxit observationes. Me insuper rogante Anno 1772 adiit Provinciam Groninganam, quam itinere pedestri ad Dollerdum usque emensus fuit; indeque redux mihi Catalogum Plantarum sub illo itinere lectarum accuratissimum tradidit.

Quid vero quisque horum Virorum contulerit, nomina symbolis suis in hoc opusculo adscripta Lectorem certiore facient.

A triennio tandem ego, cum bonis avibus pristinam meam Gelriam repeteram, inque amœnissima & saluberrima Urbe Zutphania domicilium elegeram, viribus meis, quæ jam ab aliquo
 tem-

tempore labefactatæ multum erant, recuperatis, vegetus iterum pro ætate factus, et singulari heic Procerum in me benevolentia gaudens, occasionem nactus fui varias in Comitatu Zutphanie crescentes Plantas accuratius investigandi, imo nonnullas olim prætervisas detegendi.

Hisce nunc omnibus adminiculis instructus, Elenchum hunc Plantarum indigenarum in Septem Belgii foederati Provinciis hucusque repertarum composui, inque eo cives illos systematice disposui, sequutus Methodum Sexualem Perillustis mei quondam Præceptoris b. LINNÆI, quæ faciliorem aut tutiorem inter hætenus publicatas non inveni; cujusque amplam explicationem in usum meorum popularium propediem prelo committere decrevi, persuasus hujus ope multis in posterum Floram hanc majori fore usui.

Ex *Speciebus Plantarum* (Sp.) LINNÆI mutuatus sum Differentias específicas, quas juxta Systematis Vegetabilium Editionem 13^{ti}am a Cl. MURRAY evulgatam, passim emendavi. Citavi ubique *Specierum* illarum paginam cum numero præfixo; huncque sequitur numerus Plantæ in *Flora Gelro-zutphanica* (Gelr.) et MEESE FLORA FRISICA (Fris.) Passimque adduxi *Floram Jngricam* (Jngr.) ut observationes, quæ de istis Plantis a Cl.

KRA-

KRASCHENINNIKOW & a me in Russia factæ sunt, conferri possent.

Synonyma non alia adduxi, quam quæ necessaria, ne mole sua flores venantem premeret libellus. In omnibus Plantis, quæ C. BAUHINO innotuerunt, ejus *Pinnacem* (*Baub. pin.*) citavi, huicque adposui COMMELINI *Catalogum plantarum indigenarum Hollandiæ* (*Comm. boll.*) ut ita hujus Viri in Rem Herbariam Belgicam merita constarent. Porro DODONÆUM, MORISONUM, RAJUM, PLUKNETIUM, OEDERUM, &c. et in *Muscis* ubique DILLENIUM adduxi, ut Planta obvia icone expressa conferri, tum etiam, ut optima cujusdam Auctoris descriptio consuli posset.

Nomina Vernacula in vulgus recepta, aut a rusticis imposita, in variis locis sæpe diversa, nec eandem semper designantia Plantam, quotquot mihi obvenerunt, adposui, de illorum bonitate aut etymologia haud sollicitus; nec nova cudere volui.

Varietates suis Speciebus subjunxi, græcisque præfixis literis distinxî.

Loca Natalia Belgico expressi idiomate, tum quia multa vix in linguam latinam transferri patiuntur, tum quia specialis eorum designatio Popularibus meis præsertim inservire potest. Mon-

nendum vero Loca illa Plantarum minus fixa, & variationi sæpius obnoxia esse. Licet enim in incultis diutissime species conserventur & multiplicentur, in terris tamen ab hominibus frequentatis & laboratis, sæpe solum mutatur, vertitur subinde campus & ex pratenfi fit agrarius, vel ericeta & tesqua coluntur, aut arboribus, quæ nunc laudabilis cura Magnatum est, conferuntur, quaque Plantæ indigenæ sæpe exulare jubentur: sicque non mirum, multas in locis a COMMELINO indicatis non amplius reperiri, ut ipse circa Harlemum vestigia istius Vri relegens expertus sum. Et hinc etiam frequentiam cujuslibet speciei non prætereundam judicavi, qua simul melius sive patri familias sive medico innotescit, sufficientem Plantæ copiam in usum oeconomicum, medicum, vel alium liberali manu natura quærentibus offerat, nec ne. Sunt vero B. L. variæ Plantæ, quas sola fide Magni BOERHAAVII huic Floræ insertas, & cruce † ad Ejus imitationem insignitas offendes, quum mihi illarum habitationes adhuc non innotuerint. Quasdam tamen omisi, quibus, utpote certe exoticis, ex incuria forsan Typographi signum † præfixum fuit. Illæ sunt *Polycarpon tetraphyllum*, quod *Herniaria alsines folio*. Boerb. lugdb. 2. p. 96. *Cotyledon Umbilicus veneris*, quæ
Co-

Cotyledon major. Boerb. lugdb. 1. p. 287. *Salvia Sclarea*, quæ *Sclarea*. Boerb. lugdb. 1. p. 163. *Polypodium aculeatum*, quod *Lonchitis aculeata major*. Boerb. lugdb. 1. p. 25. huicque præfixum † signum potius ad *Trichomanem* ibi mox subsequenter pertinet. Præterii deinde *Ulmum pumilam*, *Blitum capitatum* & *virgatum*, *Stellariam dichotomam*, a D. MEESE inter indigenas Frisiæ, citatas Plantas, quas crediderim olim ex Hortis aufugas fuisse. Nec Floræ huic inserui eas, quæ culturam hominum in hortis aut agris exposcunt, solas spontaneas enumerasse contentus.

Superfunt quoque nonnullæ Plantæ indigenæ ab Antecessoribus designatæ, quas ad sua Genera & Species minus certe amandare valui; tum & aliæ ad Zoophyta nunc relatæ. Utrarumque harum Catalogum ad calcem hujus opusculi subnexus invenies.

Porro cunctis Plantis Officinalibus nomen Pharmaceuticum (Pharm.) adposui, & partes, quæ prostant, enumeravi, ut scirent Pharmacopoei, quas in suum commodum intra Patriam legere possint.

Observationes ex nuperis meis schedis collectas, aut ab aliis liberalissime mecum communicatas passim suis locis inserui.

Usus quoque Medicum & œconomicum quarum-

rundam Plantarum apud Ruricolas receptum sparsim indicavi: perfectam enim omnium materiem medicam tradendo, extra scopum divagatus fuisssem.

En iterum L. B. botanicum laboris mei foetum; Scias autem me eo non novam, ut forsân expectas, adornasse Floræ Belgicæ editionem; tunc enim totum Foederatum Belgium peragrarè, ut antea animus erat, debuisssem, sed intra Septem Provincias me detinui: interim tamen in præsentî Flora numerum Plantarum, neglectis etiam quas cultura profert, majorem reperiēs; et hinc alio etiam titulo insignitum hoc opusculum in lucem prodit.

Denique deprecor menda typographica, quæ in absentia mea irrepserunt, & Lectores obsecro, ut potiora ex mea emendatione, quæ opusculo subjecta est, corrigant.

C L A S S I S I.

M O N A N D R I A

M O N O G Y N I A.

S A L I C O R N I A.

2. SALICORNIA herbacea patula, articulis apice *herbacea*
compressis emarginato-bifidis. Sp. 3. n. 1. Gelr.
605. Fris. 1.

Salicornia articulis apice crassioribus obtusis. Ger.
prov. 328. Baster *subf.* 2. p. 105. t. 50.

Salicornia. Dod. *pempt.* 82.

Kali geniculatum majus. Baub. pin. 289. Comm.
boll. 61.

Oed. dan. t. 303.

Zee-Kraal, Kraal-Kruid, Krabbe-Kwaad, Zee-
Grappe. Belg.

Overvloedig langs de Zee-en Maas-strand omtrent
's Gravezande; op de weg naar de Helder op 't
Koe gras; aan de Stranden in Zeeland; aan de Zee-
dyk tusschen Harlingen en Roptazyl; aan vochtige
kanten van Koornlanden buiten Francker; aan de
Zeekant van Groningen by de Soltekamp, Warsum,
Delfzyl, Oostwolde, en elders, meest buitendyks,
aan de quelders: ook aan de Zeekant by Harderwyk,
doch niet veel.

Pharm. KALI herb. Sal Alkali Souda.

Aceto condita esculenta Zeelandis.

H I P P U R I S.

2. HIPPURIS. Sp. 6. n. 1. Gelr. 1. Fris. 2. *vulgaris.*

Equisetum palustre, brevioribus foliis, polyspermum.

Baub. pin. 15. theatr. 242. Comm. boll. 31.

Polygonum femina. Dod. *pempt.* 113. Cam. epit. 689.

Oed. dan. t. 87.

Duizent-Knoop Wyfje. Belg.

Aan de kanten der Rivieren, en in staande Wateren
op verscheide plaatsen, overvloedig aan de Zeek by

A J O

A

Zoe-

2 MONANDRIA MONOGYNIA.

Zoelen in de Betuwe; in de Sloot achter Zorgvliet by 's Gravenhage; in de Graft te Leerdam; in de Slooten by 't Huis te Marquette; in de Vyvers van 't Huis te Zandhorst; en overvloedig in de modderige Slooten van Noord-Holland; als ook langs het Horensche-diep, en in de zoogenaamde bronlanden by de Water-luizen in de Provintie Groningen.
Articuli digito compressi, cum strepitu diffiliunt; quæ nota ab Equisetis facile distinguitur. (Gouan. b. monsp. 3.)
Nemausi in Galliis ad ambusta crebro formâ unguenti usurpatur. RAZOUX Tables Nosologiques. p. 109.)

D I G Y N I A.

C A L L I T R I C H E.

- verend,* 3. **CALLITRICHE**, foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. *Sp. 6 n. 1. Gelr 2.*
Stellaria aquatica. Baub pin. 141. Comm. boll. 108.
Alfne aquis innatans, foliis longiusculis. Baub. bist. 3. p. 786.
Zeer gemeen in de Slooten op veele plaatsen.
- autumnalis* 4. **CALLITRICHE** foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. *Sp. 6. n. 2. Gmel. fib. 3. t. 1. f. 2.*
Alfne aquatica minor f. fluitans. Baub. pin 257.
Lenticula palustris angustifolia, folio in apice dissecto. Loes. pruss. 140. t. 38.
By de voorgaande.

C L A S S I S II.

D I A N D R I A

M O N O G Y N I A.

L I G U S T R U M.

3. **LIGUSTRUM.** Sp. 10. n. 1. Gelr. 3. Frisf. 5. *vulgare.*
Ligustrum germanicum. Baub. pin. 475. bist. 3.
 p. 533. Comm. boll. 65.
Keel-Kruid, Mondbout, Liguster. Belg.
In de Boffchadie by Zuideras in 't Graaffchap Zutphen; in de Duinen by Waffenaar; tuffchen Haarlem en Zantvoord; in de Bosjes te Bergum, en by 's Heerenveen in Friesland; op de Mickelhorft agter Haren by Groningen.
 Pharm. LUGUSTRI flor.
Perperam hunc fruticem Belgii civem esse negat
 KNOOP. Dendrol. p. 97.

C I R C A E A.

6. **CIRCAEA** caule erecto, racemis pluribus, foliis *lutetiana.*
 ovatis. Sp. 12. n. 1. Gelr. 4.
Circaea lutetiana. Lob. bist. 137.
Solanifolia Circaea dicta major. Baub. pin. 168.
 Comm. boll. 107.
Herba divi stephani. Tab. bist. 730.
 Oed. dan. t. 210.
In verscheide Boffchen op donkere vochtige plaatsen op 't Loo, Uilenpas, Engelenborg in Gelderland; by Gornichem, Haarlem, 't Huis te Brederoode in Holland.

V E R O N I C A.

7. **VERONICA** spicis terminalibus, foliis oppositis *longifolia.*
 lanceolatis serratis acuminatis. Sp. 13. n. 5. Gelr. 5.
A 2 Ve-

Veronica I erectior latifolia. Clus. hist. 1. p. 346.

Veronica spicata latifolia. Baub. pin. 246.

Te Heemze langs de Vecht in Overijssel.

*Variat foliis latioribus & angustioribus; colore florum
caeruleo intensiore & dilutiore.*

- spicata.* 8. *VERONICA* spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis, caule adscendente simplicissimo.
Sp. 14. n. 7. Gelr. 6. Ingr. 2.

Veronica spicata minor. Baub. pin. 247.

Oed. dan. t. 52.

*In de Laan voor den Huize Uilenpas in de Graaffschap
Zutphen; ook op Effenburg by Harderwyk.*

- officinalis.* 9. *VERONICA* spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. *Sp. 11. n. 9. Gelr. 7. Fris. 6.*

Veronica mas supina & vulgatissima. Baub. pin. 246.

Comm. boll. 114.

Oed. dan. t. 248.

Eeren-prys Manneken. Belg.

*Overvloedig in de Duin-Valeyen van Holland, en
elders op dorre zandige plaatsen.*

Pharm VERONICÆ herb.

- serpyllifolia.* 10. *VERONICA* racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris crenatis. *Sp. 15. n. 14. Gelr. 8. Fris. 7.*

Veronica pratensis serpyllifolia. Baub. pin. 247.

Morif. hist. 2. p. 319. f. 3. t. 22. f. 8.

Oed. dan. t. 492.

Eeren-prys Wyfje. Belg.

*In de Weiden by 't Huis te Zandhorst in Holland; te
Heemze in Overijssel; en aan de wegen en kanten
der Slooten, ook in de Moeshoven op sommige plaatsen.*

- Baccabunga.* 11. *VERONICA* racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente *Sp. 16. n. 15. Gelr. 9. Fris. 8.*

Anagallis aquatica major, folio subrotundo. Baub.

pin. 252. hist. 3. p. 791. Comm. boll. 9.

Oed. dan. t. 511.

Beeke-boom, Beek-punge, Water-punge. Belg.

- β. *Anagallis aquatica minor, folio subrotundo.*
Baub. pin. 252. Comm. boll. 9.

*Op veele plaatsen aan de Beekjes, en op laage natte
gronden en plaatsen, alwaar 's Winters water staat.*

Pharm,

Pharm. BECABUNGÆ herb.

12. VERONICA racemis lateralibus, foliis lanceola- *Anagallis*
tis serratis, caule erecto. Sp. 16. n. 16. Gelr. 9.
a. β. & 606. Frisf. 9.
Veronica aquatica major, folio oblongo. Morisf.
hist. 2. p. 323. f. 3. t. 21. f. 25.
Anagallis aquatica major, folio oblongo. Baub. pin.
252. Comm. boll. 9.
β. Anagallis aquatica minor, folio oblongo. Baub.
pin. 252. Comm. boll. 10.
Aan de Slooten en Graften op verscheide plaatfen als
de voorgaande.
13. VERONICA racemis lateralibus alternis, pedi- *scutellata*
cellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. Sp
16. n. 17. Frisf. 10.
Anagallis aquatica angustifolia scutellata. Baub.
pin. 252. Baub. hist. 3. p. 780. Comm. boll. 9.
Oed. dan. t. 209.
Op veele plaatfen langs de Zuider-Zee kant by Enk-
huizen, Muiderberg, Stavoren, Harlingen, op
Vlieland; in de Slooten van 't Haagsche-Bosch;
en in de Moerassen by Groningen.
Folia omnia denticulis minimis semper instructa sunt.
14. VERONICA racemis lateralibus, foliis oblongo- *prostrata*
ovatis serratis, caulibus prostratis. Sp. 17 n. 22.
Veronica angustifolia minor. Riv. t. 95.
Chamædrys ipuria minor angustifolia. Baub. pin.
249. prodr. 117. Baub. hist. 3. p. 287.
Op het Gebergte te Bronsbergen buiten Zutphen.
(Nob. Baro & Eques de ROUWENOORT, Domi-
nus Uilenpaßia.)
15. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis *Chamæ-*
rugosis dentatis sessilibus, caule bifariam piloso. *drys*
Sp. 17. n. 23. Gelr. 10 Frisf. 11.
Veronica minor, foliis imis rotundioribus. Morisf.
hist. 2. p. 320 f. 3. t. 23. f. 12.
Chamædrys ipuria minor rotundifolia. Baub. pin.
249. Comm. boll. 24.
Oed. dan. t. 448.
Gamanderlyn. Belg.

β. Chamædrys spuria minor latifolia. *Baub. pin.* 249.

Teucrium 5. *Clus. hist.* 1. p. 350.

Veel op schaduwachtige plaatsen; aan den hoogen Sydel by Harderwyk; in 't Haagse Bosch; in den Haarlemmer-hout; ook in de Provintien Utrecht en Friesland; ρ. In Overyssel by Zwoll.

agrestis. 16. *VERONICA* floribus solitariis, foliis cordatis incisifis pedunculo brevioribus. *Sp.* 18. n. 26. *Gelr.* 12. *Fris.* 13.

Alfine chamædryfolia, flosculis pediculis oblongis insidentibus. Baub. pin. 250. *Comm. boll.* 6.

Alfine ferrato folio glabro. Baub. hist. 3. p. 366.

Oed. dan. t. 449.

ρ. *Veronica* flosculis oblongis pediculis insidentibus, chamædryos foliis alternis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 226. n. 22.

In veele Hoven en Bouw-landen.

arvensis. 17. *VERONICA* floribus solitariis, foliis cordatis incisifis pedunculo longioribus. *Sp.* 18. n. 27. *Gelr.* 13. *Fris.* 14.

Alfine veronicæ foliis, flosculis cauliculis adhærentibus. Baub. pin. 250. *Comm. boll.* 7.

Alfine folio ferrato hirsutiori, floribus & loculis cauliculis adhærentibus. Baub. hist. 3. p. 367.

In de Zaaï-landen buiten Harderwyk, Naarden, en elders.

hederæfolia. 18. *VERONICA* floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis. *Sp.* 19. n. 28. *Gelr.* 11. *Fris.* 15.

Alfine hederulæ folio. Baub. pin. 250. *Comm. boll.* 6.

Oed. dan. t. 423

Muur met bladeren van Klim of Veil. Belg.

In de Bouw-landen, en ook op ruwe plaatsen.

triphyllos. 19. *VERONICA* floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce longioribus. *Sp.* 12. n. 19. *Gelr.* 15.

Alfine triphyllos cærulea. Baub. pin. 250.

Alfine folio profunde secto, flore purpureo seu violaceo. Baub. hist. 3. p. 367.

Oed. dan. t. 252

Onder 't Koorn te Dieze in Overyssel.

20. *VERONICA* floribus solitariis sessilibus, foliis *Peregrina.*
 lanceolato-linearibus glabris obtusis integerrimis,
 caule erecto. *Sp.* 20. n. 33. *Fris.* 16.
Veronica terrestris annua, folio polygoni, flore
 albo. *Morif. hist.* 2. p. 322. f. 3. t. 24. f. 19.
Boerb. lugdb. 1. p. 225. n. 17.
Oed. dan. t. 407.
Zomtyas in de Koorn-landen, het meest in de Hoven;
 thans zeer gemeen in de Provintien Friesland en
 Groningen.

G R A T I O L A.

21. *GRATIOLA* floribus pedunculatis, foliis lanceo- *Officinalis.*
 latis serratis *Sp.* 24. n. 1.
Gratiola. *Dod. pempt.* 362.
Gratiola centauroides. *Baub. pin.* 279. *Comm. boll.* 55.
Gods-Genade. Belg.
Tandpyn-wortel Rusticis Gorcomiensibus.
 Overvloedig aan de Dyken omtrent Gornichem.
Pharm. GRATIOLE rad. herb.
Radix denti cavo indita contra odontalgiam Rusticis
Gorcomiensibus in usu.

P I N G U I C U L A.

- 22 *PINGUICULA* nectario cylindraceo longitudine *Vulgaris.*
 petali. *Sp.* 25. n. 2. *Gelr.* 607.
Pinguicula. *Clus. hist.* 311.
Sanicula montana, flore calcari donato. *Baub.*
pin. 243.
Oed. dan. t. 93.
Butter-wortel, Berg-Sanikel. Belg.
Kievits-vet. Vulgo.
Tusschen Groenloo en Borkeloo, als ook op één Boe-
 ren-erf agter Doetinchem, genaamt de Steenbou-
 wer, gelegen in 't buur/chap Brunsveld by den
 Slangenburgh, als mede op de Bakermarkt, en by
 Zelhem in 't Graafschap Zutphen.

U T R I C U L A R I A.

23. *UTRICULARIA* nectario conico, scapo pauci- *Vulgaris.*
 floro. *Sp.* 26 n. 3. *Fris.* 17.
Lentibularia. *Hall. jen.* 237. *Lind. als.* 242. t. 11.
 A 4 Mi.

*Millefolium aquaticum lenticulatum. Baub. pin. 147.
Oed. dan. t. 138.*

Water - Duizend - blad met geele bloemen. Belg.

*Overvloedig in Slooten, Vyvers en Water-dobben,
voornaamlyk by Vorden in 't Graaffschap Zutphen;
omtrent de Bontenbok buiten Gorradyk, en op 't
Orange Woud in Friesland; in de Slooten van de
bronlanden by de Waterbuizen buiten Groningen.*

V E R B E N A.

officinalis. 24. *VERBENA* tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario. *Sp. 29. n. 15. Gehr. 15.*

*Verbena communis, flore cæruleo. Baub. pin. 269.
Comm. holl. 114.*

Verbena recta. Dod. pempt. 150.

Yzer - kruid, Yzer - bard. Belg.

*Te Zandwyk by Tiel; aan den Dyk by Lienden,
Driel, Elden, omtrent 't Huis de Nevel in de Betuwe;
langs de wegen by 's Hage; op dorre beuvelen
by 't Gerecht buiten Naarden; aan sommige Duinkanten
buiten Haarlem; op de Wallen te Utrecht;
en elders.*

Pharm. VERBENÆ herb.

L Y C O P U S.

europæus. 25. *LYCOPUS* foliis sinuato-ferratis. *Sp. 30. n. 1.
Gehr. 16. Frif. 18.*

*Marrubium palustre glabrum. Baub. pin. 230.
Comm. holl. 72.*

*Marrubium aquaticum quorundam. Baub. bist. 3.
p. 318.*

Water - Andorn, of Malrove. Belg.

β. *Lycopus* foliis in profundas lacinias dissectis.
Tourn. inst. 191. Boerb. lugdb. 1. p. 186.

*Aan de kanten der Slooten, ook aan den Yssel op
verscheide plaatsen.*

S A L V I A.

pratensis. 26. *SALVIA* foliis cordato-oblongis crenatis: summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis gelea glutinosis. *Sp. 35. n. 12. Gehr. 17.*

*Horminum pratense, foliis ferratis. Baub. pin. 238.
Or-*

Orvala sylvestris, species quarta. *Dod. pempt.* 293.
Veld-Salie. Belg.

Op verscheide plaatsen omtrent Zutphen, en elders
 in 't Graafschap Zutphen; en omtrent Saik in
 Overijssel.

27. SALVIA foliis ferratis sinuatis lzviusculis, corol- *Verbenaca.*
 lis calyce angustioribus. *Sp.* 35. *n.* 14. *Gelr.* 18.
 Horminum sylvestre, lavandulae flore. *Baub. pin.* 239.
 Hormini sylvestris quarti, species quinta. *Clus.*
bist. 2. *p.* 31.
 By Uilenpas, Enghuizen, en elders in Gelderland.

D I G Y N I A.

A N T H O X A N T H U M.

28. ANTHOXANTHUM spica oblonga ovata, floscu- *odoratum.*
 lis subpedunculatis arista longioribus. *Sp.* 40. *n.* 1.
Gelr. 608. *Fris.* 19. *Schreb. gram.* 1. *t.* 5. *Stil-*
lingf. miscell. *t.* 1.
 Gramen spicatum pratense, spica flavescence. *Baub.*
pin. 2. *theatr.* 43.
 Veel in de Wei-landen en aan de kanten der Boffchen
 en Wegen; ook aan de Duinkant buiten Haarlem,
 in 't Voorjaar.
 Arista semper calyce longior est, ut probe attendenti
 patet. In solo pingui hac planta saepe profert spicam
 vere paniculatam.

C L A S S I S III.
T R I A N D R I A
M O N O G Y N I A.

V A L E R I A N A.

- dioica.* 29. VALERIANA floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis. *Sp.* 44. n. 4. *Gelr.* 20.
Valeriana palustris minor. *Baub. pin.* 164. *Comm. boll.* 113.
Valeriana minima *Dod. pempt.* 350.
Kleine wilde Valeriane. Belg.
In vochtige Weilanden buiten Amsterdam; in de Duin-valeyen by Zorgvliet; aan den Horensche-dyk nevens Haren; ook aan de Oostkant van Haren aan de dykjes buiten Groningen; en elders.
- officinalis.* 30. VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus pinnatis *Sp.* 45. n. 5. *Gelr.* 19. *Fris.* 20.
Valeriana sylvestris major. *Baub. pin.* 164. *Comm. boll.* 113.
Oed. dan. t. 570.
Wilde Valeriane. Belg.
31. Valeriana major sylvestris montana. *Baub. pin.* 164.
Boerb. lugdb. 1. p. 74.
Aan de kanten der slooten en Graften op veele plaatsen.
Pharm. VALERIANÆ SYLVESTRIS rad.
- Locusta.* 31. VALERIANA floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Sp.* 47. n. 16.
clitoria. α. fructu simplici. *Sp.* 47. n. 16. α. *Gelr.* 21. *Fris.* 21
Valeriana campestris inodora major. *Baub. pin.* 165. *Comm. boll.* 113.
Olus album. *Dod. pempt.* 646.
Veld Sala, Koorn-Sala, Vet, Vettik, Vette-koes.
Belg.

In

In de Koorn-landen en Moes-boven.

I R I S.

32. IRIS corollis imberbibus, petalis interioribus *Pseudacorus*.
stigmatate minoribus, foliis ensiformibus. Sp. 36.
n. 10. Gelr. 22. Fris. 22.

Acorus adulterinus. Baub. pin. 34. theatr. 634.
Comm. boll. 4.

Oed. dan. t. 494.

Geel-Lisb; Valsch-Lis. Belg.

Pinxter-Bloemen. vulgo.

Overvloedig in ondiepe Slooten en laage vochtige landen
in de Betuwe; tusschen Harderwyk en Nykerk;
tusschen Rotterdam en Gouda; by 's Hage; buiten
Alkmaar in de Egmonder-Meer; aan de kant van
den Huigen-dyk; en van de Alkmaarder-Vaart;
en elders in Noord-Holland; ook veel in de Pro-
vincien Utrecht, Friesland, en in 't Goregt bui-
ten Groningen.

Pharm. ACORI ADULTERINI rad.

33. IRIS corollis imberbibus, petalis interioribus *foetidissima*
patentissimis, caule unangulato, foliis ensiformi-
bus. Sp. 57. n. 11.

Spatula foetida. Baub. hist. 2. p. 31.

Gladiolus foetidus. Baub. pin. 30. theatr. 560.
Comm. boll. 44.

Wandluis-Kruid. Belg.

Aan de kant van de Vaart tusschen Haarlem en
Leiden.

S C H O E N U S.

34. SCHOENUS culmo tereti, foliis margine dorso-
que aculeatis. Sp. 62. n. 1. *Mariscus*.

Cyperus longus inodorus germanicus Baub. pin.
14. theatr. 221. Comm. boll. 30.

- Cyperus longus inodorus major, foliis & carina
ferratis. Moris. hist. 3. p. 237. f. 8. t. 11. f. 24.
altera bona.

Wild Galigaan zonder reuk. Belg.

Aan de kanten der Rivieren en staande Wateren op
verscheide plaatsen.

35. SCHOENUS culmo tereti nudo, capitulo ovato, *nigricans*.
in-

involucri diphylli valvula altera subulata longa. *Sp.* 64. n. 5.

Juncus lævis minor, panicula glomerata nigricante.

Moris. hist. 3 p. 233. f. 8. t. 10. f. 28.

Overvloedig in de Zee - Duinen by Velzen.

compressus. 36. *SCHOENUS* culmo subtriquetro nudo, spica disticha, involucro monophyllo. *Sp.* 65. n. 10.

Gramen Cyperoides, spica simplici compressa disticha. *Pluk alm. 173. t. 34. f. 9 Scheuch. gram. 490.*

Te Hillegom tusschen Leiden en Haarlem, langs een beekje aan één Weide, loopende naar de Haarlemmer-Meyr. (D. RAINVILLE.)

glomeratus 37. *SCHOENUS* culmo triquetro folioso, floribus fasciculatis, foliis planis, pedunculis lateralibus geminis. *Sp.* 65. n. 11.

In de Weiden by Nymegen. (D. RAINVILLE.)

C Y P E R U S.

flavescens. 38. *CYPERUS* culmo triquetro nudo, umbella triphylla, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis lanceolatis. *Sp.* 68. n. 15.

Gramen Cyperoides minus, panicula sparsa subflavescente. *Baub. pin. 6. theatr. 88. t. 88. Comm. bell. 52.*

Klein Riet-Gras. Belg.

In vochtige Zand-gronden aan de Duinkant, en in de Meben by Harderwyk.

fuscus. 39. *CYPERUS* culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis linearibus. *Sp.* 69. n. 16.

Gramen Cyperoides minus, panicula sparsa nigricante. *Baub. pin. 6.*

Oed. dan. t. 179.

By de voorige, waar van weinig verschilt.

S C I R P U S.

palustris. 40. *SCIRPUS* culmo tereti nudo, spica subovata terminali. *Sp.* 70. n. 2. *Gelr. 27. Frisf. 23.*

Juncus capitulis equiseti major. Baub. pin. 12.

Boerb. lugdb. 2. p. 164.

Juncellus cyperoides, capitulo simplici. Loes. pruss. 131. t. 36.

Oed. dan. t. 273.

Kleine Water - Biese. Belg.

Aan de Oevers van de Maas by het Huis ten Donk, en Delf-haven; in de Weilanden by Velzen; in ondiepe Slooten aan het Veld te Dalfsen in Overysel; ook op verscheide plaatsen in Friesland.

Differt valde longitudine & crassitie culmorum & spicarum pro diversitate loci & soli.

41. *SCIRPUS culmo stricto nudo, spica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus squamula interstinctis. Sp. 71. n. 6.*

Gramen junceum, foliis & spica junci, minus. Baub. pin. 6. Comm. boll. 50.

Oed. dan. t. 167.

In de buitendykse landen aan de Tkant; en overvloedig in vogtige Weiden in de Provinciën Friesland en Groningen:

42. *SCIRPUS culmo tereti nudo fetiformi, spica ovata bivalvi, feminibus nudis. Sp. 71. n. 7.*

Juncus inutilis seu Chamæschenus. Baub. theatr. 183.

Oed. dan. t. 287.

In een Riefwaard aan de Leck by Wyk te Duursted, tusschen de Stad en het Veer. (Filius Peter de Gorter.)

Culmi hic interdum spiithamam longitudine æquant.

43. *SCIRPUS culmis teretibus nudis alternis, caule folioso flaccido. Sp. 71. n. 8. Fris. 24.*

Juncellus, capitulis equiseti, minor fluitans. Baub. pin. 12. prodr. 23.

Gramen junceum clavatum minimum. Raj. hist. 1310. Moris. hist. 3. p. 230. S. 8. t. 10. f. 31. Pluk. alm. 180. t. 35. f. 1.

In Friesland omtrent Bergum op laage natte plaatsen, en voor aan in laagten op de Heide aldaar.

44. *SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis ovatis plurilacustris. bus pedunculatis terminalibus. Sp. 72. n. 9. Gelr. 26. Fris. 25.*

Jun-

Juncus maximus seu *Scirpus major*. *Baub. pin.* 12.
Comm. boll. 61. *Morif. hist.* 3. p. 231. f. 8. t. 10.
 f. 1.

Matte Biesen, Stoele Biesen Belg.

β. *Juncus*, five *Scirpus medius*. *Baub. pin.* 12. *Comm.*
boll. 61. *Morif. hist.* 3. p. 231. f. 8. t. 10. f. 2.

Zeer veel aan de Rivieren, Meyren, Vaarten, Graf-
ten, Slooten; ook aan de Beeken by Harderwyk,
en op het Biesbosch by Dordrecht.

f. *Aan de Rivier 't Spaarne by 't Huis te Heemstede;*
ook aan de Vecht en Maas.

Holoscloe- 45. *SCIRPUS* culmo tereti nudo, spicis subglobosis
nus. glomeratis pedunculatis, involucro diphylo in-
 æquali mucronato. *Sp.* 72. n. 10.

Juncus acutus maritimus, capitulis rotundis. Baub.
pin. 11. *theatr.* 17. *Boerb. lugdb.* 2. p. 164.

Oed. dan. t. 454.

† *Volgens BOERHAAVE.*

setaceus. 46. *SCIRPUS* culmo nudo setaceo, spica terminali
 sessili. *Sp.* 73. n. 12.

Gramen junceum minimum, capitulo squamoso.
Baub. pin. 6. *prodr.* 13.

Gramen junceum minimum maritimum. C. B.
Comm. boll. 50.

Oed. dan. t. 311.

In de Zee- Duinen by Zandvoort en Muiderberg, en
by ter Goes in Zeeland. (Baub. prodr. 13.)

triqueter. 47. *SCIRPUS* culmo triquetro nudo, spicis subses-
 silibus pedunculatisque, mucronem æquantibus.
Linn. mant. 29.

Juncus acutus maritimus, caule triquetro molli,
procerior. Pluk. alm. 200. t. 40. f. 2.

In menigte aan de Oevers van de Maas langs den
Hoogendyk by Rotterdam. (D. RAINVILLE.)

mucrona- 48. *SCIRPUS* culmo triangulo nudo acuminato, spi-
tus. cis conglomeratis sessilibus lateralibus. *Sp.* 73.
 n. 15.

Juncus acutus maritimus, caule triangulo. Baub.
pin. 11. *prodr.* 22. *Morif. hist.* 3. p. 232. f. 8. t. 10.
 f. 20.

Te Overmaas langs de Rivier. (D. RAINVILLE.)

49. *SCIRPUS* culmo triquetro, panicula conglobata *maritimus*.
foliacea, spicularum squamis trifidis: intermedia
subulata. *Sp.* 74. *n.* 21. *Gelr.* 25. *Fris.* 26.
α. *Cyperus rotundus inodorus germanicus*. *Baub.* pin.
14. *theatr.* 215. *Comm. boll.* 30
Water Cyperus van Nederland. Belg.
β. *Cyperus rotundus inodorus anglicus*. *Baub.* pin. 14.
Comm. boll. 31.
Ronde Cyperus zonder reuk Belg.
γ. *Gramen Cyperoides panicula sparsa majus*. *Baub.*
pin. 6. *theatr.* 86. *Comm. boll.* 51.
Wild Galigaan Gras. Belg.
α. & β. *Aan de kanten van verscheide Rivieren en*
staande Wateren. γ. *Aan stilstaande Wateren en*
Slooten.
50. *SCIRPUS* culmo triquetro folioso, umbella folia- *sylvaticus*.
cea, pedunculis nudis supradecompositis, spicis
confertis. *Sp.* 75. *n.* 24. *Gelr.* 24.
Cramen Cyperoides miliaceum. *Baub.* pin. 6.
Comm. boll. 52.
Oed. dan. t. 307.
Grasachtig Galigaan Belg.
In vochtige laage Weilanden.

ERIOPHORUM.

51. *ERIOPHORUM* culmis vaginatis teretibus, spica *vaginatum*
scariosa. *Sp.* 76. *n.* 1
Gramen tomentosum alpinum & minus. *Baub.* pin. 5.
prodr. 10.
Juncus alpinus capitulo lanuginoso Schoenola-
gurus. *Baub.* pin. 12. *prodr.* 23. *theatr.* 188.
Scheuch. gram. 302. *t.* 7. *f.* 1.
Oed. dan. t. 236.
Op Staal-duin by 's Hage. (*Cel. SCHWENCKE.*)
52. *ERIOPHORUM* culmis teretibus, foliis planis, *volystachi-*
spicis pedunculatis. *Sp.* 76. *n.* 2. *Gelr.* 28. *Jngr.* on.
8. *Fris.* 27.
Gramen eriophorum. *Dod. pempt.* 522.
Gramen pratense tomentosum, panicula sparsa.
Baub. pin. 4. *theatr.* 60. *Comm. boll.* 50.
Wolle gras, Wolle-Vlas, Matte-Vlas, Dotter-
gras. Belg.
Veen-

Veen-Hamels, Veen-Pluis. Rusticis.

De Moeren. Drenthinis.

Overvloedig in vochtige dorre Landen en Heigronden by Harderwyk, Barneveld, Scherpenzeel, Veenendaal, en elders in Gelderland; buiten Amsterdam op de Weg naar Amstelveen, aan de Meyrkant; in de Weiden by 't Huis te Marquette; buiten Alkmaar by Heiloo; in de Schermer, op 't Koegras in Noord-Holland; te Bostel in de Meyry; in de Wouden in Friesland; in de laage Hooy-en Bronlanden by Haren, en elders buiten Groningen; en op veele plaatsen in Drenthe.

Rustici nonnulli ad ericeta habitantes pulvinariasua & lectos ex pappo hujus graminis conficiunt.

N A R D U S.

frutic.

53. *NARDUS spica setacea recta secunda. Sp. 77. n. 1.*

Gelr. 29. Frugr. 9. Schreb. gram. 1. t. 7.

Gramen spar-teum juncifolium. Baub. pin. 5. theatr. 69. Comm. holl. 49.

β. *Gramen spar-teum hollandicum, five capillaceo folio minus. Baub. pin. 5. prodr. 11. Comm. holl. 49. Moris. hist. 3. p. 217. f. 8. t. 7. f. 8.*

In de Gagel-Kampen by Harderwyk, en op veele plaatsen in de Duinen, onder het Mosch. β. In de Duinen by Heemstede.

D I G Y N I A.

P H A L A R I S.

*arundina-
cea.*

54. *PHALARIS panicula oblonga ventricosa ampla. Sp. 80. n. 6.*

Gramen arundinaceum spicatum. Baub. pin. 6. theatr. 94. Comm. holl. 52.

Riet-gras. Belg.

β. *Gramen arundinaceum, Calamagrostis dictum, spica multiplici. Baub. pin. 6. Comm. holl. 52.*

Oed. dan. t. 259.

γ. *Gramen aquaticum paniculatum latifolium. Baub. pin. 3. Comm. holl. 47.*

Op vochtige zandige plaatsen by Doesburg, Harderwyk, Wageningen; aan de Duinkant by Haarlem;

in

*in de Laanen tuffchen het beghout by de Slooten op
S. Hacken-goedt by Zwol.*

55. PHALARIS panicula effusa, glumarum carinis oryzoides.
ciliatis. *Sp. 81. n. 8. Schreb. gram. 6. t. 12.*

Gramen palustre, panicula speciosa. *Baub. pin. 3.
prodr. 17.*

Homolocenchrus. *Mieg. act. belv. 4. p. 307. Hall.
bist. 1411.*

*Aan den Beukelsdyk langs de Sloop, en beneden aan
den Hoogendyk, digt by het einde van de Rivier,
aan geene zyde van Boschjes - Eiland buiten Rot-
terdam. (D. RAINVILLE.)*

Floret sero, ♂ maturescit raro.

P A N I C U M.

56. PANICUM spica verticillata, racemulis quater-
nis, involucellis unifloris bifetis, culmis diffusis. *verticilla-
tum.*
Sp. 82. n. 3.

α. Panicum spiculis spicatis scabritie adhærentibus.
Linn. b. Cliff. 27. Act. Jtokb. 1741. p. 183.

Gramen paniceum, spica aspera. *Baub. pin. 8.
theatr. 139. t. 139.*

β. Panicum vulgare, spica simplici vestibus non ad-
hærente. *Dalib. par. 21.*

γ. Glumis muticis, nullatenus aristatis.

*Gemeen in de Moesboven, en van zelfs op de Broey-
bedden.*

α. *Habet glumas aristatas; aristæ hamis armantur, qui
versus aristarum basin reflectuntur; . Hami arista-
rum versus earundem apicem inflectuntur.*

57. PANICUM spicis alternis conjugatisque, spiculis *Crus galli.*
subdivisis, glumis aristatis hispidis: rachi quin-
quangulari. *Sp. 83. n. 8. Gelr. 35. Fris. 28.*

Gramen paniceum, spica divisa. *Baub. pin. 8.
Comm. holl. 54. Moris. bist. 3. p. 189. f. 8. t. 4. f. 15.*

β. Gramen paniceum, spica aristis longis armata.
*Baub. pin. 8. Comm. holl. 54. Moris. bist. 3. p. 189.
f. 8. t. f. 16.*

Wild Panik - Koorn. Belg.

γ. Gramen sorghi effigie. *Lob. ic. 5.*

Gramen sorghi panicula erectum. *Baub. pin. 8.*

Comm. holl. 55.

B

Sorgb-

Sorgh-Zaad-Gras. Belg.

In de Hoven en Moes-hoven, en andere bebouwde gronden. β. omtrent het Oranje-wout tusschen het koor. γ. op dorre zandige velden.

D. RAINVILLE in horto ampliss. *Viri Consularis*

D. VAN DER HEIM *varietatem hujus reperit vere giganteam, quæ ad altitudinem 5 & 6 pedum excreverat.*

Anglicale. 58. *PANICUM* spicis digitatis basi interiore nodosis, flosculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. *Sp.* 84. *n.* 13. *Gelr.* 36. *Schreb. gram.* 119. *t.* 16. Gramen dactylon, folio latiore. *Baub. pin.* 8. *theatr.* 114. *Comm. holl.* 53.

Oed. dan. t. 388.

Komt van zelfs voort in de Hoven.

P H L E U M.

pratense. 59. *PHLEUM* spica cylindrica longissima ciliata, culmo erecto. *Sp.* 87. *n.* 1. *Gelr.* 30. *Fris.* 29. *Schreb. gram.* 103. *t.* 14.

Gramen typhoides asperum primum. *Baub. pin.* 4. *theatr.* 51. *Comm. holl.* 48.

β. Gramen typhoides maximum, spica longissima. *Baub. pin.* 4. *prodr.* 10. *theatr.* 49. *Comm. holl.* 48. *Morif. hist.* 3. *p.* 193. *f.* 8. *t.* 4. *f.* 1.

Langs de Wegen en in zandige Weilanden op verscheidene plaatsen.

Varietas minor, rigidior, spica brevior, occurrit in Sabulosis Dunis circa Harlemum & Scheveningam.

III. HALLERUS *hist.* 1528. & 1531. ex hoc *Phleo* duas facit species.

nodosum. 60. *PHLEUM* spica cylindrica, culmo adscendente, foliis obliquis, radice bulbosa. *Sp.* 88. *n.* 2.

Phleum spica cylindracea brevi, radice nodosa. *Berg viad.* 318.

Gramen typhoides asperum alterum. *Baub. pin.* 4. *theatr.* 52.

Gramen nodosum, spica parva. *Baub. pin.* 2. *prodr.* 3. *theatr.* 20. *Comm. holl.* 47. *Morif. hist.* 3. *p.* 194. *f.* 8. *t.* 4. *f.* 3.

Oed. dan. t. 380.

β. Gramen typhoides culmo reclinato. *Baub. pin.* 4. *Comm. holl.* 49.

Gramen cum cauda muris, foliis hirsutis. *Baub. hist.*

bist. 2. p. 471.

Buiten Haarlem aan de zandige wegen, en op ruwe plaatsen.

61. PHLEUM spica ovata ciliata, culmo ramoso. *Sp. arenarium.*

88. n. 4. *Gelr.* 31.

Gramen typhinum maritimum minus. *Raj. syn.* 392.

Pluk alm. 177. t. 33. f. 8.

In de Zee-duinen.

A L O P E C U R U S.

62. ALOPECURUS culmo spicato erecto, glumis *pratensis.*

villosis, corollis muticis. *Sp.* 88. n. 1. *Gelr.* 32.

Fris. 30. *Schreb. gram.* 133. t. 19. f. 1.

Gramen phalaroides, spica molli f. germanicum.

Baub. pin. 4. *prodr.* 10.

Gramen myurum, spica molli candicante villosa.

Scheuch. gram. 70.

Gramen typhoides molle. *Baub. pin.* 4. *Comm. boll.*

48. *secundum Hall. bist.* 1539.

Gramen typhoides spica angustiore. *C. B. Comm.*

boll. 48.

Op zandige wegen en ruwe plaatsen, omtrent Haarlem, Zwol, en elders; ook in Weilanden even buiten Franeker.

63. ALOPECURUS culmo spicato erecto, glumis *agriflis.*

laevibus. *Sp.* 89. n. 2.

Alopecurus myosuroides. Schreb. gram. 140. t. 19. f. 2

Gramen typhoides, spica angustiore. *Baub. pin.* 4.

theatr. 53.

Oed. dan. t. 228.

In de Koornlanden te Maarssen. (*Nob. D. FABRICIUS SIX.*)

64. ALOPECURUS culmo spicato infracto, corollis *geniculatus*

muticis. *Sp.* 89. n. 3. *Gelr.* 33.

Gramen aquaticum geniculatum spicatum. *Baub.*

pin. 3. *theatr.* 42. *Comm. boll.* 48.

Oed. dan. t. 564.

Veel in de Moerassen.

65. ALOPECURUS panicula subspicata, glumis villosis *panicus.*

corollis aristatis. *Sp.* 90. n. 5.

Gramen paniceum f. Panicum sylvestre simplici spica. *C. B. Comm. boll.* 54.

Gramen alopecurinum minus, spica virescente divulsa. *Barr. ic.* 115. f. 2.

In de Hoven en Moeshoven, en andere bebouwde gronden.

III. LINNÆUS *banc plantam olim ad Cynosuros retulit, et omnino alia adposuit synonyma, quæ nunc ad Panicum verticillatum & Panicum viride amandavit; quare ad evitandam confusionem plura non adduxi synonyma.*

M I L I U M.

effusum. 66. MILIUM floribus paniculatis dispersis muticis. *Sp.* 90. n. 1. *Gelr.* 37. *Fris.* 31.

Gramen sylvaticum, panicula miliacea sparsa. *Baub. pin.* 8. *theatr.* 141. *Comm. boll.* 55. *Morif. hist.* 3. p. 197. f. 8. t. 5. f. 10.

Hirs. Gras, Zaad-Gras. Belg.

In den Enck by Harderwyk; in den Haarlemmer Hout; in de Hooilanden om Utrecht; en in Friesland; ook op veele andere plaatsen in de bosschen, en by de Wegen.

A G R O S T I S.

spicayenti. 67. AGROSTIS petalo exteriori arista erecta stricta longissima, panicula patula. *Sp.* 91. n. 1. *Gelr.* 39. *Fris.* 32.

Gramen segetum altissimum, panicula sparsa. *C. B. Comm. boll.* 47. *Scheuch. gram.* 144. t. 10. f. 3.

In de Koorlanden onder de Haver en Garst; overvloedig omtrent Heemstede in Holland, en by Duinswoude, Haule, Wyfel, Kooten, &c. in Friesland.

stolonifera. 68. AGROSTIS panicula ramulis patentibus muticis, culmo repente, calycibus æqualibus. *Sp.* 93. n. 8. *Gelr.* 38. *Fngr.* 10.

Gramen caninum supinum minus. *Scheuch. gram.* 148. non *C. B.*

Veel in de Duinen buiten Haarlem, en by Scheveningen.

III. HALLERUS *hist.* 2. p. 223. *ex fide horti sicci C. B.*

B. monet Gramen caninum supinum, *idem esse cum*
Gramine pratensi paniculato minore, seu Poa
annua.

69. AGROSTIS panicula capillari patente, calycibus *capillaris*
subulatis aequalibus hispidiusculis coloratis, fl-
sculis muticis. *Sp. 93. n. 9. Jngr. 10. Stillingfl.*
misc. t. 3.

Gramen montanum panicula spadicea delictiore.
Baub. pin. 3. prodr. 12. theatr. 36. Scheuch.
gram. 129. t. 3. f. 5.

Oed. dan. t. 163.

Aan een sloot langs de Meerburger - Watering buiten
Leyden; dog meer aan de slooten, loopende bezyden
de Leede naar de Zyl. (Cel. 15. VAN ROYEN.)
In 't Haagsche Bosch; by Zorgvliet; aan de weg
tusschen Gonda en Bodegrave. (D. RAINVILLE.)

Gramen bocce vel e longinquo se prodit herba sua latissi-
ma virente, panicula vero purpureo-pulla. (Cel.
D. VAN ROYEN.)

70. AGROSTIS panicula coarctata mutica, calycibus *sylvestica*
æqualibus virgineis corolla brevioribus foecun-
datis duplo longioribus. *Sp. 1665.*

Gramen miliaceum sylvestre, glumis oblongis.
Raj. angl. 3. p. 404.

In 't Haagsche - Bosch. (D. RAINVILLE.)

71. AGROSTIS panicula laxa, calycibus muticis *alba*
æqualibus, culmo repente. *Sp. 93. n. 10.*

Gramen miliaceum majus, panicula spadicea &
viridi. *Pet. gram. 118. 119. Raj. angl. 3. p. 404.*

In 't Haagsche - Bosch, te Voorburg. (D. RAIN-
VILLE.)

72. AGROSTIS flosculis oblongis mucronatis, culmo *serotina*
obtecto foliis brevissimis. *Mant. 30.*

Festuca serotina. Sp. 111. n. 16.

Gramen loliaceum serotinum, panicula dispanfa.

Segu ver. 3. p. 146. t. 3. f. 2.

Te Zorgvliet by s' Hage. (D. RAINVILLE.)

A I R A.

73. AIRA panicula patente, corollis muticis lævibus *aquatica*.

calyce longioribus, foliis planis. *Sp.* 95. n. 6.
Gelr. 42. *Jngr.* 11.

Gramen caninum supinum paniculatum dulce. *Baub.*
pin. 1. *prodr.* 2. *theatr.* 13. *Baub. bist.* 2. p. 459.
Comm. boll. 45.

Oed. dan. t. 381.

In vochtige Bouw- en Weilanden.

subspicata. 74. *AIRA* foliis planis, panicula spicata, flosculis
 medio aristatis: arista reflexa laxiore. *Sp.* 95.
 n. 7.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum humile,
 locustis in spicam collectis varicoloribus aristatis.
Scheuch. gram. 221. *Baub. prodr.* 24. t. 6.

Oed. dan. t. 228.

Op de Duinen by Hillegom. (D. RAINVILLE.)

Pleraque Airæ aristatæ habent aristam dorsalem con-
tortam, adeoque vix genere ab Avena distinguendæ.

caespitosa. 75. *AIRA* foliis planis, panicula patente, petalis basi
 villosis aristatisque: arista recta brevi. *Sp.* 96. n. 8.
 Gramen segetum panicula arnudinacea. *C. B. Comm.*
boll. 47. *Scheuch. gram.* 244. t. 3. f. 2. 3.

Oed. dan. t. 240.

Aan de kanten van de Bouw- en Weilanden.

flexuosa. 76. *AIRA* foliis setaceis, culmis subnudis, panicula
 divaricata, pedunculis flexuosis. *Sp.* 96. n. 9.

Gramen nemorosum, paniculis albis, capillaceo
 folio. *Baub. pin.* 7. *prodr.* 14. *Morif. bist.* 3. p.
 200. f. 8. t. 7. f. 9.

Oed. dan. t. 157.

Op de Heide by Nymegen; en overvloedig in den
Haarlemmer-hout, en in de Duinen by Haarlem.

Cl. SCHEUCHZER Agrost. p. 218. *dicit aristam prodire*
ex basi dorsi et terioris petali; sed in nostra planta,
arista supra basin e dorso petali exit.

montana. 77. *AIRA* foliis setaceis, panicula angustata, floscu-
 lis basi pilosis aristatis: arista tortili longiore.
Sp. 96. n. 16. *Stillingfl. gram. t.* 4.

Gramen avenaceum capillaceum, minoribus glumis.
Baub. pin. 10. *theatr.* 155. *Comm. boll.* 55.

Overvloedig op de Heide buiten Nymegen en Gro-
ningen; ook op Muiderberg, en in den Haarlem-
mer-hout.

78. *Ar-*

78. AIRA foliis setaceis, summo spathaceo panicula inferne obvolvente. *Sp. 97. n. 12. Gelr. 41. canescens.*
 Gramen foliolis junceis oblongis, radice alba.
Baub. pin. 5. theatr. 72. Comm. boll. 49. Morisf. hist. 3. p. 200. f. 8 t. 3. f. 10. Scheuch. gram. 242. t. 4. f. 29. 30.
 f. Gramen sparteum variegatum. *Baub. pin 5 theatr. 72. Comm. boll. 49.*
Op 's Heeren-Loo by Harderwyk, en overvloedig langs 't Voetpad in den Haarlemmer-hout naar Heemstede, op koude donkere plaatsen. β. In de Duinen niet verre van Zandvoort.

79. AIRA foliis setaceis, panicula divaricata, floribus aristatis distantibus. *Sp. 97. n. 14. Stillingfl. carvophyll lea. miscell. t. 5.*
 Caryophyllus arvensis glaber minimus. *Baub. prodr. 105.*
Oed. dan. t. 382.
Langs de zandige wegen by Velzen buiten Haarlem. (D. FABRICIUS SIX.) In de Duinen by 's Gravenhage omtrent Langenhorst. (Hortulanus MEERBURG.)

M E L I C A.

80. MELICA panicula coarctata, floribus cylindricis. *cerulea. Mant. 335.*
 Aira caerulea. *Sp 95. n. 3. Fris. 33. Belg. 64.*
 Gramen arundinaceum enode minus sylvaticum.
Baub. pin. 7. theatr. 97.
Oed. dan. t. 239.
In de Duinen en Weilanden by Velzen; veel in vochtige landen by den Yssel in 't Graafschap Zutphen, en aan de gemeene wegen en velden zo op de Kley, als in de Wouden in Friesland.

P O A.

- 81 POA panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. *Sp. 98. n. 1. Gelr. 44. Fris. 34.*
 Gramen palustre paniculatum altissimum. *Baub. pin. 2. theatr. 38. Comm. boll. 47. Scheuch. gram. 191. t. 4. f. 1.*
Aan de kanten van Vaarten, Graften en Slooten, e.
B 4 in

in natte Landen op zeer veele plaatsen.

- trivialis.* 82. PoA panicula diffusa, spiculis trifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti. Sp. 99. n. 4. Gelr. 613.

Gramen pratense paniculatum medium. Baub. pin. 2. theatr. 30. Comm. boll. 47.

In de Weilanden.

Variat altitudine ratione soli.

- angustifolia* 83. PoA panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti. Sp. 99. n. 5. Gelr. 614.

Gramen pratense paniculatum majus, angustiore folio. Baub. pin. 2. prodr. 5. theatr. 29.

Gemeen in de Weilanden en by de wegen.

Variat longitudine culmorum, foliis laevibus aut asperis; culmis foliis & glumis viridibus aut purpureis.

- pratensis.* 84. PoA panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. Sp. 99. n. 6. Gelr. 611. Fragr. 12. Fris. 35.

Gramen pratense paniculatum majus latiore folio, Poa theophrasti. Baub. pin. 2. Comm. boll. 47.

Eerst of gemeen Beemdt-Gras. Belg.

Niets gemeener in vette Weilanden.

Variat magnitudine & crassitie omnium partium.

- annua.* 85. PoA panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. Sp. 99. n. 7. Gelr. 612. Fris. 36.

Gramen pratense paniculatum minus. Baub. pin. 2. theatr. 31. Comm. boll. 47. Scheuch. gram. 189. t. 3. f. 17. E.

Stillingsf. t. 7.

Zeer veel langs de Wegen en Paden, en aan Wallen, en tusschen de Steenen der Straaten.

- compressa.* 86. PoA panicula coarctata secunda, culmo obliquo compresso. Sp. 101. n. 16. Gelr. 610. Fris. 37.

Gramen murorum, radice repente. Baub. pin. 2. prodr. 2. Comm. boll. 46.

Gramen paniculatum, radice repente, culmocompresso. Vaill. par. 91. n. 63. t. 8. f. 5.

Aan 't Huis te Brederode in Holland, en elders op oude

oude muuren en steenachtige plaatsen; ook aan drooge wallen en wegen buiten Franeker.

87. *Poa panicula coarctata*, calycis altera valvula *maritima.*
duplo longiore, furculis prostratis.

Te Delfzyl op de Wallen, en noch meer op het Zand langs den Dollart. (D. RAINVILLE.)

E Radice fibrosa plures prodeunt furculi articulati, sæpe geniculati, humi prostrati, ad summum usque striatis foliorum vaginis vestiti. Folia oblongo lanceolata striata. Culmus terminatur panicula oblonga, cujus rami ante florescentiam culmo approximantur, tempore florescentiæ ad angulum rectum recedunt, & post foecundationem sæpe versus radicem reflectuntur. Paniculae rami sunt bini & alterni; quandoque tertius adest ramulus brevius pedunculatus. Glumæ margine scarisæ. Calyx 6-12 florus.

Gramen huic omnino simile, eodemque nomine insignitum, sed aliunde allatum Clar. D. BANKS dedit D^{no} RAINVILLE.

88. *Poa panicula attenuata*, spiculis subbifloris *memoralis.*
crownatis scabris, culmo incurvo. Sp. 93. n. 18.

Gramen paniculatum angustifolium alpinum, locustis rarioribus & angustioribus non aristatis. Scheuch. gram. 164. t. 2.

In de Velden buiten Nymegen; ook op de Muuren van de Kerk te Persingen. (D. RAINVILLE.)

Calyx 2, 3, 4, 5 florus.

89. *Poa panicula patentiuscula secunda*, spiculis *bulbosa.*
quadrifloris. Sp. 102. n. 19.

Gramen arvense, panicula crispa. Baub. pin. 3. Boerb. lugdb. 2. p. 162. n. 6. Barr. ic. 703.

Gramen cum panicula molli rubente. Baub. bist. 2. p. 464.

† Volgens BOERHAAVE.

90. *Poa panicula spicata*, floribus subulatis, floscu- *spicata.*
lis remotis. Mant. 32.

Op de Wallen en onder aan de Muuren in 't Zand te Delfzyl aan den Dollart; ook by Franeker. (D. RAINVILLE.)

91. *Poa panicula spicata*, calycibus subpilosis sub- *crispata.*
qua-

quadrifloris pedunculo longioribus, petalis aristatis. *Syst.* 94.

Aira cristata *Sp.* 94. n. 2.

Gramen spica cristata subhirsutum. *Baub.* pin. 13. *prodr.* 8. *Morif. hist.* 3. p. 194. f. 8. t. 4. f. 7.

Gemeen in de Duinen by 's Hage, Hillegom, Haarlem.

B R I Z A.

media.

92. *BRIZA* spiculis ovatis, calyce flosculis (7) breviorē. *Sp.* 103. n. 3. *Gelr.* 48.

Gramen tremulum majus. *Baub.* pin. 2. *theatr.* 22.

Oed. dan. t. 258.

Trillend - Gras. Belg.

Veel op zandige plaatsen by 't Huis te Dorth in 't Graafschap Zutphen; by Wageningen; en buiten Alkmaar tusschen Egmond op den Hoef en Bergen.

D A C T Y L I S.

glomerata. 93. *DACTYLIS* panicula secunda glomerata. *Sp.* 103. n. 2. *Gelr.* 47. *Fris.* 38. *Schreb. gram.* 68. t. 8. f. 2.

Gramen spicatum, folio aspero. *Baub.* pin. 3. *prodr.* 9. *theatr.* 45. *Morif. hist.* 3. p. 202. f. 8. t. 6. f. 38.

Op de Wallen te Amsterdam, Wyk by Duurstede, Zwol, en aan drooge Wallen en kanten van Koornvelden om Franeker, en op andere plaatsen.

C Y N O S U R U S.

cristatus. 94. *CYNOSURUS* bracteis pinnatifidis. *Sp.* 105. n. 1. *Fris.* 39. *Schreb. gram.* 69. t. 8. f. 1.

Gramen pratense cristatum s. spica cristata. *Baub.* pin. 2. *prodr.* 8. *theatr.* 42. *Comm. boll.* 48.

Oed. dan. t. 238.

Stillingfl. misc. t. 11.

Buiten Haarlem, in de zandige Weilanden aan het Spaarne; ook veel in Friesland.

F E S T U C A.

ovina.

95. *FESTUCA* panicula secunda coarctata aristata, cul-

culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. *Sp.* 108. n. 1. *Gelr.* 43. *Frisf.* 41.

Gramen foliis junceis brevibus majus, radice nigra. *Baub. pin.* 5. *prodr.* 24.

Gramen foliolis junceis brevibus minus. C. B. *Comm. boll.* 50.

Gramen cristatum, radiculis nigricantibus. *Loef. pruss.* 110. t. 24.

Stillingsfl. misc. t. 8.

Amelands-Gras. *Frisiis.*

Veel op de Heide buiten Nymegen, Harderwyk, Naarden, &c. op dorre zandige plaatzen in het Veld aan den Haarlemmer-hout; aan de Zee-kust in Friesland; en veel in dorre Zandgronden op Ameland.

Aristæ flosculorum fragiles, post foecundationem evanescent.

Culmus in juniore planta striatus, hispidus, in adultiori cylindricus & laevis est.

96. *FESTUCA* panicula secunda oblonga, spiculis *duriuscula.* oblongis laevibus, foliis setaceis, *Sp.* 108. n. 3.

Gramen foliolis junceis brevibus minus. *Baub. pin.* 5.

Gramen pratense, panicula duriore laxa unam partem spectante. *Raj. hist.* 1286. *angl.* 3. p. 43. t. 19. f. 1.

Langs de Meerburger-Watering tegens de Kaadyk, en aan de Vliet by Lammen buiten Leyden. (*Cel. D. VAN ROYEN.*) tusschen het Gras by het Huis te Zwieter. (*Hortulanus MEERBURG.*)

97. *FESTUCA* panicula spicata, calycibus minutissimis muticis, floribus scabris: aristis longis. *Myurus.* *Sp.* 109. n. 8.

Gramen avenaceum murorum, spica longissima nutante aristata. *Morif. hist.* 3. p. 215. f. 8. t. 7. f. 43.

Zeer gemeen te Leyden op de Stads-muur tusschen de Witte en Koepoorten. (*Cel. D. VAN ROYEN.*) op Zandige plaatzen by Nymegen. (*D. RAINVILLE*)

98. *FESTUCA* panicula erecta, spiculis subovatis *decumbens.* muticis, calyce flosculis majore, culmo decumben
te

te. *Sp.* 110. n. 12.

Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non aristatis. *Raj. angl.* 3. p. 408. *hist.* 1288.
Pluk. alm. 174. t. 34. f. 1.

Oed. dan. t. 162.

In het Zand tusschen Nymegen en Hulsen; ook by Franeker. (D. RAINVILLE.)

- elatio.* 99. *FESTUCA* panicula secunda erecta, spiculis subaristatis: exterioribus teretibus. *Sp.* 111. n. 13.
Fris. 43. *Schreb. gram.* 34. t. 2.
Gramen loliaceum, spica divisa, pratense majus.
Morif. hist. 3. p. 183. f. 8. t. 2. f. 15.
Menigvuldig in Weilanden en langs de Wegen.

- fluitans.* 100. *FESTUCA* panicula ramosa erecta, spiculis subfessilibus teretibus muticis. *Sp.* 111. n. 14. *Gelr.* 46. *Fris.* 42. *Schreb. gram.* 37. t. 3.
Gramen aquaticum fluitans, multiplici spica.
Baub. pin. 2. *theatr.* 41. *Comm. holl.* 48.
Stillingfl. misc. t. 20.
Oed. dan. t. 137.
Vlot-Gras. Belg.
In stilstaande Wateren en Slooten op veele plaatsen.

B R O M U S*.

- secalinus.* 101. *BROMUS* panicula patente, spiculis ovatis, aristis rectis, feminibus distinctis. *Sp.* 112. n. 1.
α. *Festuca* graminea, glumis hirsutis. *Baub. pin.* 9. *theatr.* 143. *Comm. holl.* 37. *Scheuch. gram.* 250.
Dravik. Belg.
β. *Bromus* (hordeaceus) panicula erecta coarctata.
Sp. 1. p. 77. n. 8. *Fris.* 45.
γ. Gemeen in de Koornlanden onder de Rogge en Haver. β. Aan hooge drooge Wallen op veele plaatsen.
- mollis.* 102. *BROMUS* panicula erectiuscula, spicis ovatis pubescentibus, aristis rectis, foliis mollissime villosis. *Sp.* 112. n. 2. *Schreb. gram.* 60. t. 6.
Gramen avenaceum pratense, panicula squamata &

* Genus hoc difficulter discernendum summo studio extricavit Cl. C. E. WEIGEL, Medicus Suudensis. *Observ. botan. Gryphis.* 1772. 4^o.

& villosa. *Morif. bist.* 3. p. 213. f. 8. t. 7. f. 18.
*In meenigte omtrent Amsterdam, vooral buiten de
 Muiderpoort aan den Zee - dyk. (Nob. D. FA-
 BRICIUS SIX.)*

103. *BROMUS* panicula patula, spiculis oblongis *sterilis*.
 distichis, glumis subulato-aristitatis *Sp.* 113. n. 6.
Festuca avenacea sterilis elatior. *Baub. pin.* 9.
Morif. bist. 3. p. 212. f. 8. t. 7. f. 11.
*In den Haarlemmer - hout, en aanden Weg tusschen
 's Hage en Voorburg.*

104. *BROMUS* panicula nutante, spiculis ovato-ob-arvensis.
 longis. *Sp.* 113. n. 7. *Gelr.* 50.
Festuca graminea, juba effusa. *Baub. pin.* 9. *prodr.*
 19. *Scheuch. gram.* 262. t. 5. f. 15.
Festuca avenacea sterilis elatior seu *Bromos* dio-
 scoridis. *C. B. Comm. boll.* 37.
Oed. dan. t. 293.
Naakte of Ydele Haver. Belg.
In de Zaaïlanden onder de Haver en Garst.

105. *BROMUS* panicula nutante, spiculis linearibus. *testorum*.
Sp. 114. n. 8.
Festuca avenacea sterilis, spicis erectis. *Raj. angl.*
 3. p. 413. *Pluk. alm.* 174. t. 299. f. 2.
Festuca avenacea sterilis, pediculis brevioribus
 & spicis erectis. *Morif. bist.* 3. p. 212. f. 8. t.
 7. f. 13.
*Op de daken der boere-wooningen, op oude muuren
 en dorre plaatsfen, veel omtrent Haarlem, en te
 Zutphen.*

106. *BROMUS* panicula nutante, spiculis quadrifloris: *giganteus*.
 aristis brevioribus. *Sp.* 114. n. 12. *Schreb. gram.*
 88. t. 11.
Gramen sylvaticum glabrum, panicula recurva.
Vaill. par. 93. t. 18. f. 3.
*Hier en daar in 't Haagsche - Bosch. (Cel. D. VAN
 ROYEN.) by het Huis ten Donk te Overmaas,
 en op Boschjes - Eiland by Rotterdam. (D. RAIN-
 VILLE.)*

107. *BROMUS* racemo simplicissimo, pedunculis uni-racemosus.
 floris, floribus sexfloris laevibus aristatis. *Sp.* 114.
 n. 13. *Fe*

Festuca avenacea spicis strigosioribus e glumis
glabris compactis. *Raj. angl.* 3. p. 414.
Op de Wallen te Nymegen. (D. RAINVILLE.)

- pinnatus* 108. *BROMUS* culmo indiviso, spiculis alternis sub-
fessilibus teretibus subaristatis. *Sp.* 115. n. 14.
Gelr. 51.
Gramen, spica brizæ, majus. *Baub. pin.* 9. *prodr.*
19. *theatr.* 133. *Baub. hist.* 2. p. 477. *Comm.*
boll. 55.
Oed. dan. t. 164.
In de zandige Weilanden by den Haarlemmer - hout,
en elders.

A V E N A.

- clatior.* 109. *AVENA* paniculata, calycibus bifloris, flosculo
hermaphrodito submutico, masculo aristato.
Sp. 117. n. 2. *Gelr.* 55. *Schreb. gram.* 25. t. 1.
Gramen nodosum, avenacea panicula. *Baub. pin.*
2. *theatr.* 18. *Scheuch. gram.* 239. t. 4. f. 27. 28.
Oed. dan. t. 165.
Op verscheide plaatsen in de Velden onder andere
Grazen.

- loeslingiana* 110. *AVENA* panicula contracta, flosculis binis, al-
tero pedunculato, apice biaristatis, dorso ari-
sta reflexa. *Sp.* 118. n. 4.
Overvloedig in 't Haagsche-Bosch onder de boomen;
en op de Duinen, by 't Dorp Hillegom, alwaar
het Zand met mosch bedekt is. (D. RAINVILLE.)
Planta nostra omnibus characteribus convenit cum de-
scriptione ab Ill. LINNÆO in Spec. plant. data,
sed major est, interdum spithamæ longitudine.

- nuda.* 111. *AVENA* paniculata, calycibus trifloris receptacu-
lo calycem excedente, petalis dorso aristatis,
tertio flosculo mutico. *Sp.* 118. n. 6.
Avena nuda. *Baub. pin.* 23. *Dod. pempt.* 511.
Comm. boll. 15. *Morif. hist.* 3. p. 209. f. 8. t. 7.
f. 4.
Naakte Haver. Belg.
Buiten Haarlem aan den weg naar Overveen.
Locum crescendi ex Commelino mutuavi, sed ego ibi-
dem

dem eam non vidi: et an vere indigena apud nos sit, dubito.

112. Avena paniculata, calycibus subtrifloris, flosculis omnibus aristatis, receptaculis barbatis. *fesquiter-
tia.*

Mant. 34.

Gramen pratense villosum panicula densa ex argenteo dilute spadicea s. fusca. *Scheuch. gram.*

220. t. 4. f. 17. A. B.

By Haarlem. (D. RAINVILLE.)

Ill. HALLERUS bist. 1497. *habet pro Varietate Avenæ flavescentis.*

113. Avena paniculata, calycibus trifloris, flosculis omnibus aristatis basi pilosis. *Sp.* 118. n. 7. *Gelr.* 54. *Schreb. gram.* 109. t. 15.

Festuca utriculis lanugine flavescentibus. *Baub. pin.* 10. *theatr.* 149. *Comm. boll.* 37.

Onder de Rogge, Haver en Garst; als ook in de Tabaks-landen.

114. Avena panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, flosculis omnibus aristatis. *Sp.* 118. n. 9. *Schreb. gram.* 72. t. 9.

Gramen avenaceum spica sparsa flavescente, locustis parvis. *Morif. bist.* 3. p. 215. f. 8. t. 7. f. 42.

In de Heide by Nymegen, en op de Muur van den Hoogendyk by Rotterdam. (D. RAINVILLE.)

L A G U R U S.

115. Lagurus spica ovata aristata. *Sp.* 119. n. 1. *ovatus.* *Schreb. gram.* 143. t. 19. f. 3.

Alopecuros genuina. *Morif. bist.* 3. p. 191. f. 8. t. 4. f. 1.

Gramen alopecuroides, spica rotundiore. *Baub. pin.* 4. *theatr.* 56. *Boerb. lugdb.* 2. p. 158. n. 7.

† *Volgens BOERHAAVE.*

A R U N D O.

116. Arundo calycibus quinquefloris, panicula laxa. *phragmites* *Sp.* 120. n. 3. *Gelr.* 56. *Fris.* 48.

Arundo vulgaris s. phragmites dioscoridis. *Baub. pin.*

pin. 17. Comm. boll. 13.

Arundo vulgaris palustris. Baub. bist. 2. p. 485.

Morif. bist. 3. p. 218. f. 8. t. 8. f. 1.

Gemeen Riet of Dek-Riet. Belg.

Overvloedig langs de Rivieren, Meiren, Vaarten,
Graffen en Slooten, en in veele laage Landen.

epigejos. 117. ARUNDO calycibus unifloris, panicula erecta,
foliis subtus glabris. Sp. 120. n. 4.

Gramen montanum, panicula flavescente, modo
aristata, modo aristis carente. Mont. gram. 58.
f. 86.

In de Duinen buiten 's Hage tusschen de Helm. (Hor-
tul. MEERBURG.)

Calamagrostis. 118. ARUNDO calycibus unifloris lævibus, corollis
lanuginosis, culmo ramoso. Sp. 121. n. 5.

Gramen arundinaceum, panicula molli spadicea,
majus. Baub pin. 7. theatr. 94. Comm. boll. 52.
Scheuch. gram. 222. t. 3. f. 5.

Oed. dan. t. 280.

Pluim-Riet-Gras. Belg.

In vette vogtige Akkers en Velden by Delft, en in de
Betuwe; ook te Zorgvliet by 's Gravenhage.

Variat magnitudine & crassitie totius plantæ, tum &
colore paniculæ viridi, purpureo, rubiginoso &c.

arenaria. 119. ARUNDO calycibus unifloris, foliis involutis
mucronato-pungentibus. Sp. 121. n. 6. Gelr. 18.
Fris. 49.

Gramen sparteum spicatum, foliis mucronatis
longioribus f. spica secalina. Baub. pin. 5.
theatr. 67. Comm. boll. 49.

Helm. Belg.

β. Gramen sparteum spicatum latifolium. Baub.
pin. 5. theatr. 68. Comm. boll. 49.

Duin-Helm. Belg.

γ. Gramen sparteum spicatum, foliis mucronatis
brevioribus. Baub. pin. 5. Comm. boll. 49.

δ. Gramen sparteum f. Spartum maximum mariti-
mum hollandicum, spica secalina. Raj. bist.
1260. Morif. bist. 3. p. 180.

Op veele plaatsen in de Zee- en Binnen-Duinen. β.

Digt aan het Zee-strand by Zandvoort, op de
Dui-

Duinen; als ook in 't Aanstooter-Zand op de Veluwe. γ . By en onder de voorige by Heemstede in de Duinen. δ . By Scheveningen. *Vide Moris. l. c.*

Habitat etiam hæc planta in mari prope Stauriam Frisæ, ubi habetur pro Tritico sterili, quod fabulantur ortum esse ex frumento luxuriose ibidem in mare projecto. Vide, si lubet, Chr. Schotani Kerkeleyke en Weereldlyke Geschiedenisfen van Friesland, VI. Boek, p. 195. F. Sjoerd's Histor. Jaarboeken van Friesland. I. Deel. p. 94. en II. Deel. p. Nieuwe Vaderlandsche Letteroeff. III. Deel. p. 552.

Magni usus in Belgio planta ad domandam dunarum arenam mobilem.

L O L I U M.

120. **LOLIUM** spica mutica: spiculis compressis multifloris. *Sp. 122. n. 1. Gelr. 60. Fris. 50. Perenne.*

Gramen loliaceum, angustiore folio & spica. Baub. pin. 9. theatr. 127. Comm. boll. 53. Moris. bist. 3. p. 182. f. 8. t. 2. f. 2.

Muisen-Koorn. Belg.

β . *Gramen loliaceum majus, spicis rarius dispositis. Park. theatr. 1146. Moris. bist. 3. p. 182. f. 8. t. 2. f. 2. a.*

Gramen loliaceum majus, spicis longius distantibus. Tourn. inst. 516.

γ . *Gramen loliaceum spicis brevioribus & latioribus compressis. Moris. bist. 3. p. 182. f. 8. t. 2. f. 2. b.*

Gramen loliaceum spica lata ex plurimis spicis duplici versis dispositis constante. Scheuch. gram. t. 1. f. 7. D.

δ . *Gramen loliaceum, f. Phoenix multiplici spicata panicula. Park. theatr. 1145. Moris. bist. 3. p. 182. f. 8. t. 2. f. 2. c.*

Gramen loliaceum, panicula multiplici & spicata. Tourn. inst. 516.

In de Zaaillanden en langs de Wegen zeer menigvuldig. β . Veel in de Weilanden om Rotterdam. γ . Gemeen op de Dyken aldaar. δ . Op vochtige en schaduwagtige plaatsen, alwaar een vette grond is. Nullam in Belgio est Gramen, quod tot admittit

varietates lususque natura, quam hoc *Lolium* perenne. Variat foliis latioribus & angustioribus; spica latiore, strictiore, bifida, paniculata; spiculis crassioribus, tenuioribus, longioribus, brevioribus, ovatis, obtusis, aggregatis, simplicibus, oppositis, versus unum latus intortis seu veluti secundis; calyce spiculam æquante aut superante, aliisque vix definiendis modis. Præcipuas harum varietatum, numero sexdecim, mecum communicavit D. RAINVILLE, qui et ad me misit Gramen a se lectum in muro vetusto aggeris alti prope Villam Donk extra Rotterodamum, quod facie sua exteriore *Lolio* perenni quam simillimum est, sed calyce bivalvi et flosculis subsessilibus instructum, adeoque ad *Festucas* referendum: an hoc sit nova *Festuca* species, vel planta hybrida ex patre *Lolio* perenni et matre forte *Festuca* quadam, ulterius inquirendum.

tenuis.

121. *LOLIUM* spica mutica tereti: spiculis trifloris.

Sp. 122. n. 2.

Graminis loliacei angustiore folio & spica varietas.

Bauh. pin. 9. spica tereti angustissima. Scheuch. gram. 28.

Te Nymegen op de Wallen onder de groote boomen in de schaduw. (D. RAINVILLE.)

tenu-
lentum.122. *LOLIUM* spica aristata: spiculis compressis multifloris. Sp. 122. n. 3. Gelr. 59. Fris. 51.Gramen loliaceum, spica longiore, f. *Lolium* dioscoridis. Bauh. pin. 9. theatr. 121. Comm.

boll. 53. Scheuch. gram. 31. t. 1. f. 7. E. F.

Oed. dan. t. 160.

Dolyk. Belg.

In de Koorn-landen tusschen de Haver en 't Vlas.

E L Y M U S.

arenarius.

123. *ELYMUS* spica erecta arcta, calycibus tomentosis flosculo longioribus. Sp. 122. n. 1.

Triticum foliis acuminatis pungentibus. Roy. lugdb. 71.

Gramen caninum maritimum, spica triticea nostras.

Raj. hist. 1256. Scheuch. gram. 6.

Zee-Haver. Gelris.

Over-

Overvloedig aan de Zee-kant by Harderwyk, en in de Zee-Duinen van Holland.

An hoc referendum Gramen caninum maritimum spicatum C. B. & Gramen caninum maritimum spica foliacea. C. B. Comm. boll. 46? Jed synonymum I. B. et nomen belgicum obstat.

H O R D E U M.

124. HORDEUM flosculis lateralibus masculis aristatis, involucris intermediis ciliatis. Sp. 126. n. 6. *murinum.*

Gelr. 66. Fris. 53.

Gramen hordeaceum minus & vulgare. Baub. pin. 8. theatr. 134. Comm. boll. 54.

Gramen secalinum vulgatissimum viarum. Morisf. hist. 3. p. 179. f. 8. t. 6. f. 4.

Bastard-Garst. Belg.

- β. Gramen spicatum secalinum minus. Scheuch. gram. 17. Vaill. par. 83. t. 17. f. 6.

Overvloedig langs de wegen, paden, muuren, aan booge drooge Wallen, en in dorre Weilanden.

T R I T I C U M.

125. TRITICUM calycibus quadrifloris ventricosis villosis imbricatis obtusis. Sp. 126. n. 3. *turgidum.*

Triticum spica villosa quadrata brevior & turgidior. Morisf. hist. 3. p. 175. f. 8. t. 1. f. 8.

In en om Nymegen op verscheide plaatsen.

126. TRITICUM calycibus quinquefloris truncatis, foliis involutis. Sp. 128. n. 8. *juncum.*

Gramen angustifolium spica tritici muticæ simili.

Baub. pin. 9. theatr. 132. prodr. 18. t. 17.

Scheuch. gram. 7. Boerb. lugdb. 2. p. 156. n. 2.

In de Duinen by Scheveningen.

127. TRITICUM calycibus quadrifloris subulatis acuminatis, foliis planis. Sp. 128. n. 9. Gelr. 61. *repens.*

Fris. 56.

Gramen caninum arvense f. Gramen dioscoridis.

Baub. pin. 1. Comm. boll. 45. Scheuch. gram. 5.

Gramen caninum repens vulgatus. Morisf. hist. 3.

p. 178. f. 8. t. 1. f. 8.

Honds-Gras, Leed-Gras, Lidt-Gras, Puin-Gras,

- Gras, Peen-Gras, Kruip-Koorn, Queeck. Belg.
 β. Gramen latifolium spica triticea latiore compacta.
Baub. pin 8. prodr. 17. theatr. 31. Comm. boll. 54.
Morif. hist. 3. p. 177. f. 8. t. 1. f. 1. Boerb.
lugdb. 2. p. 156. n. 2.
 γ. Gramen maritimum vulgato canario simile. *Morif.*
hist. 3. p. 178. Boerb. lugdb. 2. p. 156. n. 7.
 δ. Gramen geniculatum parvum arenosum aggerum
 maritimorum Zelandiæ, longius radicum.
Morif. hist. 3. p. 178. Boerb. lugdb. 2. p. 156.
n. 8.

Gemeen in de Bouw-landen en Hoven. β. Aan de
 kanten der Bouw-landen op verscheide plaatsen.
 γ. Aan de Zee-dyk, en ook wel tusschen de Balsteenen
 genoegzaam in Zee, niet verre van Ropta-Zyl in
 Friesland. δ. Aan de Zee-dyken in Zeeland.

Pharm. GRAMINIS rad. herb.

Variat magnitudine & crassitie totius plantæ, a-
 ristis longioribus & brevioribus, numeroque flo-
 sculorum in singula spicula.

- caninum. 128. TRITICUM calycibus quadrifloris subulatis ari-
 statis. *Sp. edit. 1. p. 86.*
 Triticum radice perenni, spica subnutante, spi-
 culis erectis: aristis longissimis. *Schreb. spicileg.*
p. 51.
 Elymus spica nutante arcta, spiculis rectis invo-
 lucro destitutis, infimis geminis. *Sp. edit. 2.*
p. 124.
 Gramen caninum non repens elatius, spica arista-
 ta. *Morif. hist. 3. p. 177. f. 8. t. 1. f. 2. Buxb.*
cent. 4. p. 29. t. 50.
 Gramen loliaceum radice repente f. Gramen offi-
 cinarum, longioribus aristis donatum. *T. Vaill.*
par. 81. t. 17. f. 2.
 Veel aan de kanten der Slooten om Rotterdam,
 Utrecht, Franeker, en elders.
 Ob spiculis inferiores geminas hoc Gramen Ill. LINNEUS
 a Triticis removit, & ad Elymos amandavit; po-
 tiori vero jure inter Tritica relinquendum esse
 sentio, quippe Doctissimus Botanicus. D. RAIN-
 VILLE in literis ad me datis, testatur se inter nu-
 merosas quas examinavit hujus speciei plantas,
 nequidem unicam reperisse, quæ characterem essen-
 tialem Elymi habebat; neque unquam plures, quam
 unam

unam alteramve supra eandem plantam, spicas, quæ geminas seu combinatas ferebant spiculas, hasque non semper inferiores, sed modo in medio, modo versus summitatem spicæ positas, absque ulla certa lege, sicuti idem non raro in Lolio perenni videre est. Imo Cl. SCHREBERUS numquam spiculas geminas se vidisse ait, sed semper aliquantulum distantes, spicamque raram efficientes.

T R I G Y N I A.

M O N T I A.

129. MONTIA. Sp. 129. n. 1. Fris. 58.

Montia aquatica minor. Mich. gen. 18. t. 13.
f. 2.

Portulaca arvensis. Baub. pin. 288.

Oed. dan. t. 131.

Te Heemze by Zwol, en elders in Slooten, waar in weinig water is; op natte en schaduwachtige plaatsen in de Wouden, op Zand- en Veen-gronden, omtrent de Joure en Donkerbroek, en dicht by de Rivier de Kuinder of Tjonger in Friesland; op Veengronden by Groningen.

C L A S S I S IV.

T E T R A N D R I A

M O N O G Y N I A.

G L O B U L A R I A.

- vulgaris.* 130. GLOBULARIA caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis; caulinis lanceolatis. *Sp.* 139. *n.* 3. *Gelr.* 67.
 Scabiosa, bellidis folio, humilis, Globularia dicta, caule folioso. *Morif. bist.* 3. p. 51. f. 6. t. 15. f. 46.
 Bellis cærulea, caule folioso. *Baub. pin.* 262.
 By 's Gravenhage in de Duinen tusschen de Heide; by Zwol achter den Kranenberg, en te Heemze.

D I P S A C U S.

- fallonum.* 131. DIPSACUS foliis sessilibus serratis. *Sp.* 140. *n.* 1. *Gelr.* 68. *Fris.* 59.
 Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major. *Baub. pin.* 385. *Comm. holl.* 31. *Morif. bist.* 3. p. 158. f. 7. t. 36. f. 3.
 Kaarden, Kannewassers. Belg.
 Aan de Dyken en Wegen in de Betuwe, by Zutphen, Harderwyk, Naarden, Muiderbergh, Overschie, Velzen, Cuylenborg, Leerdam, Utrecht, Jutphaas, Zwol; by Haren buiten Groningen; achter 's Gravezande langs de Zee en Maas-dyk, en op Staalduin.

132. Dir.

132. *DIPSACUS* foliis petiolatis appendiculatis. *Sp. pl. fl.*
141. n. 3. *Gelr.* 69.

Dipsacus sylvestris, capitulo minore, vel *Virga
pastoris minor*. *Baub. pin.* 385. *Morif. hist.* 3.
p. 158. f. 7. t. 39. f. 5.

*In de Fortificatien om Arnhem; ook buiten Naarden
en Utrecht by de voorgaande.*

S C A B I O S A.

133. *SCABIOSA* corollulis quadrifidis æqualibus, *Succisa*.
caule simplici, ramis approximatis, foliis lan-
ceolato-ovatis. *Sp.* 142. n. 6. *Gelr.* 71. *Frif.* 60.
Succisa glabra. *Baub. pin.* 269. *Cam. boll.* 103.
Succisa f. Morsus diaboli. *Cam. epit.* 397.
Oed. dan. t. 279.
Duivels-beet. Belg.

- β. *Succisa hirsuta*. *Baub. pin.* 269.

*Veel in de Weilanden tusschen Harderwyk en 's Hee-
ren - Loo; in 't Clarenbeeksche - Bosch by
Arnhem, in de Duin-Valeyen en Velden by
's Hage, Brederode, Alkmaar, Utrecht; op
Heivelden in Friesland; by Haren buiten Gronin-
gen; en op meer andere plaatsen.*

*Pharm. SCABIOSÆ SUCCISÆ f. MORSUS
DIABOLI. rad. herb.*

*Variat corollis cæruleis, albis & carneis. Folia ple-
rumque integra, rarius laciniata.*

134. *SCABIOSA* corollulis quadrifidis radientibus, *arvensis*.
foliis pinnatifidis incisis, caule hispido. *Sp.* 143.
n. 10. *Gelr.* 70.

Scabiosa pratensis hirsuta. *Baub. pin.* 269. *Comm.*
boll. 103.

Scabiosa major communior hirsuta, folio laciniato.
Morif. hist. 3. p. 45. f. 6. t. 13. f. 1.

Oed. dan. t. 447.

Schurft-Kruid. Belg.

- β. *Scabiosa major communior hirsuta, folio non la-
ciniato latifolia*. *Baub. hist.* 3. p. 2. *Boerb. lugdb.*
1. p. 129.

*Aan de kanten der Akkers en Zaa-landen by Zut-
phen, Harderwyk, Zwol, Groningen; te Dart-
huysen en Leerzum in de Provincie Utrecht; in de
Duinen by 's Hage, Velzen, Overveen; en elders.*

40 TETRANDRIA MONOGYNIA.

Pharm. SCABIOSÆ herb.

- columbaria* 135. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinatis setaceis. *Sp.* 134. n. 12. *Fris.* 61. Scabiosa, capitulo globofo, major. *Baub. pin.* 270. Scabiosa minor. *Cam. epit.* 711. *Oed. dan. t.* 314. *Middel-Scabieuſe*, of *Schaaps-Scabieuſe*, Belg. In Friesland by de *Scabioſa Succifa*. (MEESE.)

A S P E R U L A.

- cynanchica.* 136. ASPERULA foliis quaternis linearibus: superioribus oppositis, caule erecto, floribus quadridis. *Sp.* 151. n. 6. Gallium album minus. *Tabern. biſt.* 433. t. 433. f. 2. *Comm. boll.* 43. *Wit-Walſtroo.* Belg. Aan de kanten van de zandige Bouw-landen by Velzen buiten Haarlem; by Zwol; en op de Stads-muuren te Utrecht.

G A L I U M.

- paluſtre.* 137. GALIUM foliis quaternis obovatis inæqualibus, caulibus diffusis. *Sp.* 153. n. 3. *Gelr.* 71. *Fris.* 62. Gallium paluſtre album. *Baub. pin.* 335. *Comm. boll.* 43. *Oed. dan. t.* 423. *Water-Walſtroo.* Belg. Aan de kanten van de Sypel by Harderwyk; aan ſtilſtaande Slooten, in waterachtige Velden, en moeraſſige Veen-gronden buiten Amſterdam, Haarlem, Utrecht, Zwol, Groningen; in de Wouden buiten Franeker; in de Slooten aan de Duinkant by 's Hage.
- uliginofam.* 138. GALIUM foliis ſenis lanceolatis retrorſum ſerrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fruſtu majoribus. *Sp.* 153. n. 7. *Fris.* 63. Gallium album minus. *Pet. herb.* n. 30. f. 6. Aparine paluſtris minor pariſienſis, flore albo. *Tourn. inſt.* 114. *Vaill. par.* 14. By Harderwyk op de Stads-weide; aan de kanten der

TETRANDRIA MONOGYNIA. 41

der Slooten buiten Franeker, en elders; ook langs de Duinen.

139. *GALIAM* foliis octonis linearibus sulcatis, ramis ^{verum.} floriferis brevibus. *Sp.* 155. n. 12. *Gelr.* 72. *Fris.* 64.

Gallium luteum. *Baub.* pin. 335. *Comm. boll.* 43.

Gallium. *Dod. pempt.* 335.

Walstroo. Belg.

Op ruwe zandige en steenige gronden; overvloedig op de barre Duinen; op de Wallen te Harderwyk; op de Muuren der Stad Utrecht; en elders.

140. *GALIAM* foliis octonis ovato-linearibus subser. *Mollugo.* ratis, caule flaccido, ramis patentibus. *Sp.* 155. n. 14. *Gelr.* 75. *Jngr.* 22.

Mollugo belgarum. *Lob. ic.* 802.

Rubia sylvestris laevis. *Baub.* pin. 333.

Oed. dan. t. 455.

- β. *Mollugo montana angustifolia*, vel *Gallium album latifolium.* *Baub.* pin. 331.

By Zandvoort op de Weg aan de Duinen; te Harderwyk aan de Wal buiten de groose Poort; aan de Dykjes by Haren buiten Groningen. β. Om-trent Zwol.

141. *GALIAM* foliis octonis lanceolatis carinatis *Aparine.* scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructibus hispidis. *Sp.* 157. n. 22. *Gelr.* 76. *Fris.* 65.

Aparine. *Dod. pempt.* 353.

Aparine vulgaris. *Baub.* pin. 334. *Comm. boll.* 11.

Oed. dan. t. 495.

Kleef-Kruid, *Klet*, *Katte-Klaauwen.* Belg.

- β. *Aparine femine coriandri saccharati.* *Park. theatr.* 547.

Overvloedig by de Wegen, in de Heggen, Besschen, Hoven, bebouwde en onbezaaide landen. γ. Gemeen te Overmaas in 't Koorn.

Varietas β semper minor est, sed rigidior &c. scabrior.

P L A N T A G O.

142. *PLANTAGO* foliis ovatis glabris, scapo tereti, *major.* spica flosculis imbricatis. *Sp.* 163. n. 1. *Gelr.* 77.

C 5

Fris.

Fris. 66.

Plantago latifolia sinuata. *Baub. pin.* 189. *Comm. boll.* 89.

Oed. dan. t. 461.

Weegbree. Belg.

♀. *Plantago marina magna.* *Baub. bist. 3. p.* 504. *Comm. boll.* 89.

Zee-Weegbree. Belg.

By de Wegen, aan de Wallen, in de Weilanden, en in de Hoven. r. Aan de Zeekant by Muiderberg, Amsterdam, Zandvoort, op 't Eiland Wieringen, en elders.

Pharm. PLANTAGINIS rad. herb. sem.

media.

143. *PLANTAGO* foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti. *Sp.* 163. *n.* 3. *Gelr.* 78.

Plantago latifolia incana. *Baub. pin.* 189. *Comm. boll.* 89. *Morif. bist. 3. p.* 259. *f.* 8. *t.* 15. *f.* 6.

Oed. dan. t. 581.

Ruige Weegbree. Belg.

♀. *Plantago latifolia hirsuta minor.* *Baub. pin.* 189. *Boerb. lugdb. 2. p.* 100. *n.* 5.

Als vooren; veel op Staal-duin buiten 's Hage.

maritima.

144. *PLANTAGO* foliis semicylindraceis integerrimis basi lanatis, scapo tereti. *Sp.* 165. *n.* 11. *Gelr.* 81. *Fris.* 68.

Plantago marina. *Lob. ic.* 306. *Tab. ic.* 733.

Coronopus maritimus major. *Baub. pin.* 190. *Comm. boll.* 29.

Oed. dan. t. 243.

Zee-Harts-boorn. Belg.

Krokkeling. *Enchusanis.*

Aan de kant van de Zuider-Zee onder 't Gras by Harderwyk, Muiderberg, Naarden, Enkhui-zen; aan de Noord-Zee op den Haack achter 's Gra-vezande, en te Delfzyl; aan de Zeedyk by Har-lingen, Roptazyl, Dykshoek; als mede op som-mige plaatsen in de Wouden in Friesland.

Nonnullis pro acetario comesta placet. Vaccæ, quæ hac planta vescuntur, optimum ac copiosum lac præbent.

*coronopifo-
lia.*

145. *PLANTAGO* foliis linearibus dentatis, scapo te-

tereti. Sp. 166. n. 14. Gelr. 80. Frisf. 69.

Coronopus sylvestris hirsutior. Baub. pin. 190.

Herba stella f. Cornu cervinum. Dod. pempt. 109.

Harts-boorn, Gravinne - Kruid. Belg.

β. Coronopus hortensis. Baub. pin. 190. Comm. boll. 29.

Langs de Weg tusschen Zutphen en Doesburg; op de Wallen te Harderwyk; achter Zorgvliet buiten 's Hage, en op de Tarassen aldaar; te Heemze in Overysfel; by Harender Moolen in 't Heideveld, en in 't witte Veen tusschen Haren en de Waterhuizen buiten Groningen. β. In de Bouwlanden en op zandige gronden by Haarlem.

CENTUNCULUS.

146. CENTUNCULUS. Sp. 169. n. 1. Dill giff. 161. gen. minimus.

111. Eph. Nat. Cur. cent. 5. app. 32. t. 10. f. 30.

Anagallis paludosa minima, foliis rotundis alternatis. Vaill. par. 12. t. 4. f. 2.

Alfene palustris minima, rosulis albis, fructu coriandri exiguo. Mentz. pug. t. 4. f. 5.

Oed. dan. t. 177.

Te Heemze in Overysfel op 't Veld, alwaar plaggen afgemaait zyn.

SANGUISORBA.

147. SANGUISORBA spicis ovatis. Sp. 169. n. 1. officinalis. Gelr. 82.

Pimpinella sanguisorba major. Baub. pin. 160.

Morif. hist. 3. p. 264. f. 8. t. 18. f. 7.

Oed. dan. t. 97.

Te Heemze in de Hooi-landen.

Pharm. SANGUISORBÆ. rad.

CORNUS.

148. CORNUS arborea, cymis nudis, ramis rectis. sanguinea. Sp. 171. n. 3. Gelr. 83.

Cornus fæmina. Baub. pin. 447.

Visga sanguinea. Dod. pempt. 782.

Oed. dan. t. 481.

Overvloedig aan de ruige Wallen langs de wegen buiten Zutphen; ook te Heemze, en elders in Overysfel; en aan de oostkant van de Heereweg aan

aan de Dykjes by Haren buiten Groningen.

I S N A R D I A.

- palustris.* 149. ISNARDIA. Sp. 175. n. 1.
Alfine palustris rotundifolia repens, foliis portu-
lacæ pinguibus. Lind. alfat. 114. t. 2.
In één Sloot by Achtienhoven in 't Sticht van
Utrecht. (Cel. E. I. VAN WACHENDORFF.)

T R A P A.

- natans.* 150. TRAPA. Sp. 175. n. 1.
Tribulus aquaticus. Baub. pin. 194. Comm. boll. 111.
Tribulus aquatilis. Dod. pempt. 581.
Water-Nooten, Minck-yzers. Belg.
In Vyvers en Stilstaande zoete Wateren op sommige
plaatsen.

A L C H E M I L L A.

- vulgaris.* 151. ALCHEMILLA foliis lobatis. Sp. 179. n. 1.
Alchimilla vulgaris. Baub. pin. 319. Comm. boll. 4.
Alchimilla. Dod. pempt. 140.
Zinauw, Leeuwen-Klaauw, Leeuwen-voet, Onze
Vrouw Mantel. Belg.
† Volgens BOERHAAVE.
Pharm. ALCHIMILLÆ. herb.

D I G Y N I A.

A P H A N E S.

- arvensis.* 152. APHANES. Sp. n. 1. Gelr. 86.
Chærophyllo nonnihil similis. Baub. pin. 182.
Comm. boll. 25.
Perchepier anglorum quibusdam. Baub. bist. 3.
p. 74.
Engelsch Steen doorsnydend Kruid. Belg.
In de Zaaï-landen en Koorn-akkers op verscheide
plaatsen; gemeen by Groningen.
Cl. ADANSON in hac planta si sponte in arvis crescit,

unum pistillum; in hortis si nascitur, duo constanter reperiit.

C U S C U T A.

153. *CUSCUTA* floribus sessilibus. *Sp.* 180. n. 1. *Gelr. europæa.*

87. *Fris.* 71.

Cuscuta major. *Baub.* pin. 219. *Comm. boll.* 32.

Cassutha. *Dod. pempt.* 554.

Oed. dan. t. 199.

Wrange, Schorfte, Filt-Kruid. Belg.

Op de Heide by Harderwyk, Veldtwyk, en Kerpel; om 't Vlas by Twello, en elders in Gelderland; op de Haagen, en tusschen andere Kruiden by Utrecht en Tiel; aan de Heide-struikjes by Makkinga, Nyeberkoop &c. in Friesland.

Pharm. CUSCUTÆ herb.

T E T R A G Y N I A.

I L E X.

154. *ILEX* foliis ovatis acutis spinosis. *Sp.* 181. n. 1. *Agrifolium*
Gelr. 88. *Fris.* 72.

Ilex aculeata baccifera, folio sinuato. *Baub.* pin. 425. *Comm. boll.* 60.

Agrifolium. *Dod. pempt.* 659.

Oed. dan. t. 508.

Hulst, Muisen-doorn. Belg.

β. *Ilex* foliis glabris integerrimis exacte folia lauri referens. *Linn. b. Cliff.* 40.

Op verscheide plaatsen by Harderwyk, Zwol; omtrent het Heerenveen, en Dragten, en tusschen Donkerbroek en Haule in Friesland; achter Haren by de Mickelhorst buiten Groningen; ook vooraan in 't Landschap Drenthe in 't Cluivingsbosch te Paterwolde en Eelde. β. In de Mebensteeg by Harderwyk.

Pharm. AGRIFOLII herb.

P O T A M O G E T O N.

155. *POTAMOCETON.* foliis oblongo-ovatis petio-
latis.

latis natantibus. Sp. 182. n. 1. Fris. 73.

Potamogeton rotundifolium. Baub. pin. 193.

Comm. boll. 93.

Potamogeton. Fuchs. hist. 651. fig. optima.

Fontein-Kruid. Belg.

In stilstaande zoete Wateren en Vyvers; te Hullen by Nymegen; op 't Eiland Wieringen; in de Slooten omtrent Tjomaram, en tusschen Tjetjerk en Bergum in Friesland; en elders.

perfoliatum 156. POTAMOGETON foliis cordatis amplexicaulis. Sp. 182. n. 2. Fris. 74.

Potamogeton tertia. Dod. pempt. 582.

Potamogeton foliis latis splendentibus. Baub. pin. 193. Comm. boll. 93.

Potamogeton rotundifolium alterum. Loef. pruss. 205. t. 65.

Oed. dan. t. 196.

In brakke wateren in Noort-Holland; ook omtrent Amsterdam, Zwol, en elders. In Friesland te Lollum in de Vaart, in den opvaart naar Balk, en in de Rivier de Kuinder of Tjonger; en op andere plaatsen.

densum. 157. POTAMOGETON foliis ovatis acuminatis oppositis confertis, caulibus dichotomis, spica quadriflora. Sp. 182. n. 3.

Tribulus aquaticus minor alter. Clus. hist. 2. p. 252.

In Overysfel omtrent Zwol, si fides M. S. S. quod inde habeo.

lucens. 158. POTAMOGETON foliis lanceolatis planis in petiolos desinentibus. Sp. 183. n. 4. Gelr. 90. Fris. 75.

Potamogeton foliis angustis splendentibus. Baub. pin. 193. Comm. boll. 93.

Fontinalis lucens major. Baub. hist. 3. p. 777. Comm. boll. 93.

Oed. dan. t. 195.

Veel in zoete stilstaande Wateren en Vyvers in Noort-Holland; ook by Harderwyk, Haarlem, Zwol, en elders; in de oude Leidse Vaart en omtrent Kortenhoef; in de Vecht by den Voetangel; buiten Leeuwarden aan de zwarte Weg, in

in den opvaart naar Balk, en in de Rivier de Kuinder of Tjonger.

COMMELINUS boll. 93. male distinguit plantam Casp. Baubini ab ea Job. Baubini.

159. POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis oppositisve undulatis serratis. Sp. 183. n. 5. Gelr. 91. 92. Fris. 76.

Potamogeton foliis crispis, five Lactuca rana-
rum sarmentis planis. Baub. pin. 193. Comm.
boll. 93.

Fontinalis crispa. Baub. hist. 3. p. 770.

Fonti-Lapathum pusillum. Lob. ic. 286.

In zoete staande Waieren op veele plaatsen in Noort-Holland, vooral aan de Duinkant. In de Slooten aan de Stadsweide van Harderwyk, en elders. In Friesland op veele plaatsen, zoo wel op de Kley als in de Wouden, in Vaarten, Vyvers en Slooten.

160. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppositis ^{serratis} subundulatis. Sp. 183. n. 6. Fris. 77.

Potamogeton altera. Dod. pempt. 582.

Potamogeton longo serrato folio. Baub. pin. 193.

Lapathum fluitans, folio longo serrato. Baub.
hist. 2. p. 988.

By de voorige, dog niet zoo veel.

161. POTAMOGETON foliis linearibus obtusis, ^{compressum} caule compresso. Sp. 183. n. 7. Gelr. 93. Fris. 78.

Potamogeton caule compresso, folio graminis canini. Raj. hist. 189. Boerb. lugdb. 1. p. 197.

Oed. dan. t. 203.

In de Craften om Harderwyk; veel in Noort-Holland; in Friesland in een Sloop aan de weg van Tietjerk naar Bergum, en op verscheide andere Woutplaatsen.

162. POTAMOGETON foliis fetaceis parallelis appropinquantibus distichis. Sp. 183. n. 8. Fris. 79.

Potamogeton gramineum. ramosum Baub. pin. 193. prodr. 101.

Millefolium temifolium. Gerard. hist. 828. fig. bona.

In de Slooten by Uilenpas, Latmer, en elders in Gelderland; en op zeer veele plaatsen in Friesland.

48 TETRANDRIA TETRAGYNIA.

- setaceum.* 163. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppositis acuminatis. *Sp.* 184. n. 9.
Potamogeton ramosum angustifolium. *Baub. pin.* 193. *Boerb. lugdb.* 1. p. 197.
In den Ouden Yssel op verscheide plaatsen.
- pufillum.* 164. POTAMOGETON foliis linearibus oppositis alternisque distinctis: basi patentibus, caule tereti. *Sp.* 184. n. 12.
Potamogeton pufillum, gramineo folio, caule tereti. *Raj. angl.* 3. p. 150. *Boerb. lugdb.* 1. p. 197. n. 8.
Potamogeton minimum, capillaceo folio. *Baub. pin.* 193. *prodr.* 101.
Potamogeton pufillum, gramineo folio brevior. *Vaill. par. t.* 32. f. 4.
Oed. dan. t. 186.
Te Katwyk op Rhyn.

R U P P I A.

- maritima.* 165. RUPPIA. *Sp.* 184. n. 1.
Buccaferrea maritima, foliis acutissimis. *Mich. gen.* 72. t. 35.
Gramen maritimum fluitans cornutum. *Baub. pin.* 3. *prodr.* 7.
Oed. dan. t. 364.
By Katwyk aan Zee in de Slooten (Linn. b. Cliff. 430.) ook binnen 's Lands. (Cl. HOUTTUYN.)

S A G I N A.

- procumbens* 166. SAGINA ramis procumbentibus. *Sp.* 185. n. 1.
Gelr. 94. *Fris.* 80.
Alfine pusilla graminea, flore tetrapetalo. *Tourn. inst.* 243. *Lind. alf.* 204. t. 8. *Segu. veron.* 421. t. 5. f. 3.
In Tonzel en elders buiten Harderwyk; veel op vochtige straaten en muuren in Holland; op Zandhorst in een graspad.
- erecta.* 167. SAGINA caule erecto subunifloro. *Sp.* 185. n. 2.
Alfine foliis caryophyllæis. *Raj. angl.* 3. p. 344. t. 15. f. 4.
In de Weiden by Sneek. (D. RAINVILLE.)

CLAS.

C L A S S I S V.

P E N T A N D R I A

M O N O G Y N I A.

M Y O S O T I S.

168. MYOSOTIS feminibus lævibus, foliorum apicibus callofis. *Sp.* 188. *n.* 1. *Gelr.* 95. *Fris.* 81. *Scorpioides*

a. Myosotis foliis hirsutis. *Linn. b. Cliff.* 45. *arvensis.*

Echium scorpioides arvense. Baub. pin. 254. *Comm. boll.* 32.

Scorpiurus annuus arvensis hirsutus cæruleus.

Morif. hist. 3. *p.* 450. *f.* 11. *t.* 31. *f.* 2.

Oed. dan. t. 58.

Muizen-oor, Scorpioen-Kruid. Belg.

β. Myosotis foliis glabris. *Linn. b. Cliff.* 46. *palustris.*

Echium scorpioides palustre. Baub. pin. 254. *Comm.*

boll. 32.

Scorpiurus palustris perennis, viridioribus foliis.

Morif. hist. 3. *p.* 451. *f.* 11. *t.* 31. *f.* 4.

Water-Muizen-oor, Water-Scorpioen-Kruid. Belg.

α. In de Zaai-landen en Hoven. *β.* Aan de kanten van de Beeken en Slooten, en op andere vochtige plaatsen.

L I T H O S P E R M U M.

169. LITHOSPERMUM feminibus lævibus, corollis *officinale.* vix calycem superantibus, foliis lanceolatis.

Sp. 189. *n.* 1.

50 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Lithospermum majus erectum. Baub. pin. 258.
Comm. boll. 68.

Lithospermum minus. Cam. epit. 659.

Paarl-Kruid, Steenbreek, Steen-Zaad, Zonne-Gierst. Belg.

Op zandige gronden buiten Haarlem in 't Grootte Bent-veld, by de Kruidberg, en elders; ook omtrent Zwol.

Pharm. LITHOSPERMI f. MILII SOLIS sem.

arvense. 170. *LITHOSPERMUM* feminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus. *Sp. 190. n. 2. Gelr. 96.*
Fris. 82.

Lithospermum arvense, radice rubra. Baub. pin. 58. Comm. boll. 68.

Lithospermum nigrum quibusdam, flore albo, semine echii. Baub. bist. 3. p. 592.

Oed. dan. t. 456.

Wild Steen-Zaad, Wild Paarl-Kruid. Belg.

In de Voor-Zomer aan de kanten der Akkers by Oldbroek op de Veluwe; buiten Amsterdam op de Weg langs den Amstel naar Ouderkerk, en elders in Holland; by de Maat omtrent Cothen in de Provincie Utrecht; tusschen het Koorn op veele plaatsen in Friesland; aan de Westkant van de Heereweg aan de Dykjes tegenover de Estcrweg buiten Groningen.

A N C H U S A.

officinalis. 171. *ANCHUSA* foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Sp. 191. n. 1. Gelr. 615.*

Buglossum angustifolium majus. Baub. pin. 256.

Buglossum vulgare. Cam. epit. 915.

Oed. dan. t. 572.

Osse-tong. Belg.

Langs de wegen buiten Arnhem, en vry overvloedig langs de Duinen by Wassenaar, Heemstede, Bennenbroek, en elders.

Pharm. BUGLOSSI herb. flor.

C Y N O G L O S S U M.

officinale. 172. *CYNOGLOSSUM* staminibus corolla brevioribus, fo-

PENTANDRIA MONOGYNIA. 51

foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus. *Sp.*
192. n. 1. *Gelr.* 97.

Cynoglossum vulgare. Cam. epit. 917.

Cynoglossum majus vulgare. Baub. pin. 257. *Comm.*
boll. 30.

Honds-tonge. Belg.

f. *Cynoglossum majus vulgare, flore albo. Baub.*
pin. 257.

By Doesburg en Arnhem in de Fortificatien; op de
Wallen van Harderwyk; aan de Dyken boven
Tiel; veel tusschen Maas en Waal; langs de
wegen buiten Wyk by Duurstede; en over-
vloedig langs de Duinkant van Holland.

Pharm. CYNOGLOSSI rad.

P U L M O N A R I A.

173. *PULMONARIA foliis radicalibus ovato-corda-* *officinalis.*
tis scabris. Sp. 194. n. 2.

Symphytum maculosum f. Pulmonaria latifolia.
Baub. pin. 259. *Comm. boll.* 109.

Symphytum maculosum. Dod. pempt. 135.

Oed. dan. t. 482.

Longe-Kruid, Wrange-Kruid, Onzer-Vrouwen
Melk-Kruid. Belg.

Wolven-Laa. Rusticis.

Overvloedig op Zandwyk by Tiel, en in 't Bosch
te Buuren; buiten Haarlem naar de Sillick.

Pharm. PULMONARIÆ herb.

S Y M P H Y T U M.

174. *SYMPHYTUM foliis ovato-lanceolatis decur-* *officinalis.*
rentibus. Sp. 195. n. 1. *Gelr.* 98. *Fris.* 83.

Symphytum majus. Cam. epit. 700.

Symphytum, Consolida major. Baub. pin. 259.
Comm. boll. 108.

Smeer-Wortel, Heel-Wortel, Waal-Wortel Belg.

Scheur-Wortel, Felje. Zutphanensibus.

Overvloedig aan de Dyken, Wegen, Kanten der
Slooten, en in de Weilanden.

Pharm. SYMPHYTI f. CONSOLIDÆ MAJORIS
rad. herb. far.

Variat corollis cæruleis, purpureis, rubris & albis,
vel pallide luteis.

B O R A G O.

- officinalis.* 175. BORAGO foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Sp.* 197. *n.* 1. *Gelr.* 99.
 Borrigo floribus cæruleis & albis. *Baub. hist.* 3. p. 574.
 Buglossum latifolium, Borrigo. *Baub. pin.* 236. *Comm. boll.* 17.
Bernasie. Belg.
 Komt thans van zelfs voort in de Hoven, langs de Wegen, ook op zommige Vuilnischoopen.
 Pharm. BORRAGINIS herb. flor.

A S P E R U G O.

- procumbens* 176. ASPERUGO calycibus fructus compressis. *Sp.* 198. *n.* 1. *Gelr.* 102.
 Asperugo spuria. *Dod. pempt.* 356.
 Buglossum sylvestre, caulibus procumbentibus. *Baub. pin.* 257. fructu pedem anserinum referente. *Morif. hist.* 3. p. 439. *f.* 11. *t.* 26. *f.* 13. *Oed. dan. t.* 552.
 Aan ruige Wallen langs de Duinkant omtrent de Boere-bove buiten 's Hage; en tusschen Overveen en Bloemendal by Haarlem; aan 't Dykje even voorby de Vier Staten naar de breedeweg buiten Alkmaar; aan de Wallen der Bouwlanden te Dieze in Overysfel.

L Y C O P S I S.

- aryensis.* 177. LYCOPSIS foliis lanceolatis hispidis, calycibus florescentibus erectis. *Sp.* 199. *n.* 4. *Gelr.* 100. *trif.* 87.
 Buglossum sylvestre minus. *Baub. pin.* 256. *Comm. boll.* 18.
 Buglossa sylvestris. *Dod. pempt.* 628.
Oed. dan. t. 435.
 Wilde Bugloss of Osse-tonge. Belg.
 f. Buglossum sylvestre minus alterum & asperius. *Baub. pin.* 256.
 In de Bouw landen en Akkers, en langs de Hegen, veel in de Duinen naar Wassenaar; en aan de Dykjes tusschen Helpen en nieuwe werken buiten Groningen, f. In de Moeshoven en bebouwde Lan-

Landen buiten Haarlem.

E C H I U M.

178. *ECHIU*M caule tuberculato - hispido , foliis *vulgare.*
caulnris lanceolatis hispidis , floribus spicatis
lateralibus. *Sp.* 200. *n.* 4. *Gelr.* 101.

Echium vulgare. *Baub.* pin. 254. *Baub. hist.* 3. p.
585. *Morif. hist.* 3. p. 440. *f.* 11. *t.* 27. *f.* 1.

Lycopsis. *Baub.* pin. 255. *Comm. boll.* 69.

Oed. dan. t. 445.

Slinge-Bruid. Belg.

Te Keppel by de Kerk , en in de Fortificatien om
Zutphen , Doesburg en Arnhem ; aan de Duinen ,
en langs de Weg by Noorddorp , in de Duinen
van Heemstede en Wassenaar ; op de Stads-
Muuren te Deutinchem , Hattem , Zwol ; veel
langs de Wegen by Rhenen , en elders.

Variat floribus cæruleis & rubris. Caule fasciato
occurrit inter Neomagum & Villam Hulsen.

P R I M U L A.

179. *PRIMULA* foliis dentatis rugosis. *Sp.* 204. *n.* 1. *veris.*
l. limbo corollarum plano.

Primula veris , pallido flore , elatior. Clus. hist.
1. p. 301.

Verbasculum pratense vel sylvaticum inodorum.
Baub. pin. 241. *Comm. boll.* 114.

Oed. dan. t. 433.

Sleutel- Bloem , Bak- Kruid. Belg.

Overvloedig op de Uittenwaarden te Drumpt , Zoe-
len en Avesaate in de Neder- Betuwe ; op de
Stadsweide en by de Bronsbergen buiten Zutphen ;
in vogtige Bosjes buiten Haarlem , en in veele
Duin- Valeien ; ook langs de boutkant van 't
Haagsche- Bosch

Pharm. PRIMULA VERIS herb. flor.

M E N Y A N T H E S.

180. *MENYANTHES* foliis cordatis integerrimis, *Nympha*
corollis ciliatis. *Sp.* 207. *n.* 1. *Gelr.* 104. *Fris.* 84. *des.*

Lymnanthemum peltatum. Gmel. act. petrop. 1769.
V. 14. *p.* 527. *t.* 17. *f.* 2.

Nymphæa lutea minor , flore fimbriato. Baub. pin.

194. *Baub. bist.* 3. p. 772.*Nymphæa lutea minor parvo flore.* C. B. *Comm. boll.* 81.*Oed. dan. t.* 339.*Kleine Geele Plompen.* Belg.

Veel in den Ouden-Yssel; in de Graften om Zutphen; in de Slooten by Uilenpas, Maurik, Amerongen &c. in 't Graaffschap Leerdam; by 's Gravenhage; in 't wyde Spaarne by 't Huis te Heemstede; in verscheide Wateren in Friesland, by de Joure, Akkrum &c. In Overysfel omtrent Zwol en elders; als ook op veele plaatsen in de Veenen.

trifolia. 181. *MENYANTHES foliis ternatis.* *Sp.* 208. n. 3. *Gelr.* 103. *Frif.* 85.

Trifolium palustre. *Baub. pin.* 327. *Dod. pempt.* 580. *Comm. boll.* 112.

Oed. dan. t. 541.

Water-Drieblad, Water-Klaveren, Boks-Boonen. Belg.

β. *Menyanthes palustre angustifolium triphyllon.* *Tourn. inst.* 117. *Boerb. lugd.* 1. p. 206.

By Harderwyk, in de Slooten tusschen Hierden en de Zee; in 't Veen agter Uilenpas, te Elden, Driel, Wamel, Dreumel, Veenendal; in de Weiden by Wageningen, en elders in Gelderland; in de binnendykse Wielen by Muiderberg; in de Slooten tusschen Muiden en Naarden; in die om 's Hage, en buiten Alkmaar, by Bergen, Egmond op den Hoef en Egmond binnen; overvloedig buiten Leeuwaarden aan de Zwarte-Weg, in laage Landen en in Slooten, op Bergummer-Heide in Friesland; by Holten in Overysfel; in 't Go-regt om Groningen; en elders.

Pharm. TRIFOLII AQUATICI. berb.

HOTTONIA.

palustris. 182. *HOTTONIA pedunculis verticillato-multifloris.* *Sp.* 208. n. 1. *Gelr.* 105. *Jngr.* 30. *Frif.* 86.

Myriophyllum alterum. *Cam. epit.* 879.

Millefolium aquaticum, f. Viola aquatica, caule nudo. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 75.

Millefolium aquaticum equisetifolium, caule nudo. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 75.

Oed.

Oed. dan. t. 487.

Water-Violen of Violieren. Belg.

Veel in stilstaande Slooten tusschen Harderwyk en Nykerk, in Heerden, Twello, en elders op de Veluwe, ook in de Betuwe; in de Slooten by Vianen, Heycoop, te Overveen buiten Haarlem; by Dokkum, Tjetjerk &c. in Friesland; by Haren buiten Groningen; ook op veele plaatsen in de Provinciën Utrecht en Overysfel.

LYSIMACHIA.

183. *LYSIMACHIA paniculata*: racemis terminalibus. vulgaris.

Sp. 209. n. 1. Gelr. 106. Frig. 30. Fris. 87.

Lysimachia lutea major. Baub. pin. 245. Comm. boll. 70.

Lysimachium luteum. Dod. pempt. 84.

Geele Wederik. Belg.

Veel aan de Beeken en Slooten by Harderwyk, Uilenpas, Zeyst, 's Hage, in den Aarden-hout, aan de Duinbeeken; in Friesland by Bergum, Oostermeer, Heerenveen, als elders in de Wouden; buiten Groningen by de Mickelhorst, en op andere boschagtige plaatsen.

Variat foliis ternis, quaternis & quinis.

184. *LYSIMACHIA* racemis lateralibus pedunculatis. thyrsiflora.

Sp. 209. n. 4. Gelr. 107. Fris. 88.

Lysimachia bifolia, flore glaboso luteo. Baub. pin. 245. Comm. boll. 70.

Lysimachia lutea. Clus. bist. 2. p. 53. t. 12.

Oed. dan. t. 517.

Water-Wederik. Belg.

In 't Veen by Uilenpas; in de Riet-Pol te Wageningen; in de waterachtige Rietlanden tusschen Amsterdam en Muiden; in 't Haagsche-Bosch; in de moerassen by Rotterdam, Leeuwaarden, Franeker, Groningen; en elders.

Mirè variat numero staminum 6. 7. & 8 corollaque in totidem laciniis secta.

185. *LYSIMACHIA* foliis subquaternis subsessilibus, punctata.

pedunculis verticillatis unifloris. Sp. 210. n. 6.

Lysimachia lutea minor, foliis nigris punctis notatis. Baub. pin. 245.

Blattariae affinis planta minor, flore luteo; foliis nigris punctis notatis. *Morif. bist. 2. p. 491. f. 5. t. 10. f. 15.*

Aan 't Haarlemmer-Meer tusschen 't Riet. (Linn. b. Cliff. 52.) Langs de Maas achter 's Gravezande. (Cl. Schencke.)

Nummularia. 186. *LYSIMACHIA* foliis ovatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente. *Sp. 211. n. 9.*

Anagallis lutea nemorum. Baub. pin. 252. Boerb. lugdb. 1. p. 203. Morif. bist. 3. p. 569. f. 5. t. 26. f. 5.

Oed. dan. t. 174.

In 't Veen by Uilenpas.

Nummularia. 187. *LYSIMACHIA* foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. *Sp. 211. n. 10. Gelr. 108. Frif. 89.*

Nummularia. Dod. pempt. 500.

Nummularia major lutea. Baub. pin. 309. Comm. boll. 80.

Oed. dan. t. 493.

Penning-Kruid. Belg.

Aan de kanten van vochtige Weilanden, in drooge Slooten, en in de Veenen op veele plaatsen.

Pharm. NUMMULARIÆ herb.

A N A G A L L I S.

arvensis. 188. *ANAGALLIS* foliis indivisis, caule procumbente. *Sp. 211. n. 1. Gelr. 109. Frif. 90.*

α. *Anagallis phœniceo flore. Baub. pin. 252. Comm. boll. 8.*

Anagallis mas. Dod. pempt. 32.

Oed. dan. t. 88.

Bastard-Muur of Guichelbeil Manneken. Belg.

Lieven-Heers Teentjes. Mosa-Trajectinis.

β. *Anagallis cœruleo flore. Baub. pin. 252. Comm. boll. 8.*

Anagallis foemina. Dod. pempt. 32.

Bastard-Muur of Guichelbeil Wyffe. Belg.

γ. *Anagallis flore purpurascente. Baub. pin. 252. Boerb. lugdb. 1. p. 204.*

δ. *Anagallis flore carneo. Park. theatr. 558. Boerb. lugdb. 1. p. 204.*

α. *In.*

α. In de Koornlanden en Hoven op verscheide plaatsen ook in de barre Duinen. γ. δ. by de zelve, dog niet zoo overvloedig.

Pabulum gratissimum pecori.

Pharm. ANAGALLIDIS herb.

189. ANAGALLIS foliis ovatis acutiusculis, caule re- *tenella.*
pente. *Mant.* 335.

Lyfimachia tenella. *Sp.* 211. n. 11.

Nummularia minor, purpurascence flore. *Baub.*
pin. 310. *prodr.* 139. *Morif. list.* 2. p. 567. f. 5.
t. 26. f. 2.

Nummularia rubra. *Baub. list.* 3. p. 371. *Boerb.*
lugdb. 1. p. 203.

† Volgens BOERHAAVE.

C O N V O L V U L U S.

190. CONVULVULUS foliis sagittatis utrinque acutis, *arvensis.*
pedunculis subunifloris. *Sp.* 218. n. 1. *Gelr.*
110. *Frif.* 91.

Convolvulus minor arvensis. *Baub. pin.* 294.
Comm. boll. 28. flore roseo.

Smilax lævis minor. *Dod. pempt.* 393.

Oed. dan. t. 459.

Kleine Winde, *Kloekens Winde*, *Liend*, *Windom.*
Belg.

β. *Convolvulus minor arvensis*, flore candido. *Tourn.*
inst. 83.

γ. *Convolvulus minor arvensis*, flore purpurascence,
radiis albis picto. *Tourn. inst.* 83.

Menigvuldig in zandige Bouwlanden en aan ruige
Wallen; ook in de Duinen langs de Wegen achter
Zorgvliet, en buiten Haarlem.

191. CONVULVULUS foliis sagittatis postice trunca- *Septem.*
tis, pedunculis tetragonis unifloris. *Sp.* 218. n.
2. *Gelr.* 111. *Frif.* 92.

Convolvulus vulgaris major albus. *Baub. pin.* 294.
Comm. boll. 27.

Smilax lævis major. *Dod. pempt.* 392.

Oed. dan. t. 458.

Groote Winde. *Belg.*

δ. *Convolvulus vulgaris major*, flore ex roseo et albo
variegato. *Boerb. lugdb.* 1. p. 246.

- γ. *Convolvulus major purpureus*. *Comm. boll.* 28.
Veel aan de heggen by de wegen β. by de zelve, maar
zeldzaam. γ. buiten Haarlem by 't Kraayenest.

- Soldanella*. 192. *CONVOLVULUS foliis reniformibus, pedunculis unifloris*. *Sp.* 226. *n.* 39.
Convolvulus maritimus nostras rotundifolius. *Morif. hist.* 2. *p.* 11. *f.* 1. *t.* 3. *f.* 2.
Soldanella maritima minor. *Baub. pin.* 295. *Comm. boll.* 107.
Brassica marina, five Soldanella. *Baub. hist.* 2. *p.* 166.
Zee-Winde; Zee-Kool. Belg.
Overvloedig in Zeeland aan den West-Cappelschen-Dyk; en achter 's Gravezande, langs de Zee-duinen en stranden van de Maas.
Pharm. SOLDANELLA herb.

C A M P A N U L A.

- rotundifolia.* 193. *CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus*. *Sp.* 232. *n.* 3. *Gel.* 117.
Fris. 93.
Campanula minor rotundifolia vulgaris. *Baub. pin.* 93. *Comm. boll.* 2c.
Campanula vulgaris minor, foliis imis rotundioribus sinuatis non serratis. *Morif. hist.* 2. *p.* 456. *f.* 5. *t.* 2. *f.* 17.
Oed. dan. t. 489.
Kleine wilde Raponce of wilde kleine Kloxkens. Belg.
 β. *Campanula minor rotundifolia vulgaris, floribus candidis*. *Tourn. inst.* 111.
Overvloedig aan de kanten der Akkers in Gelderland en Overysfel; ook omtrent Velsen in Holland; in Friesland by Bergummer-Heide, en elders in de Wouden aan de dykjes en wegen, β. Veel omtrent den Ouden Yssel by Keppel.

- Rapunculus.* 194. *CAMPANULA foliis undulatis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula coarctata*. *Sp.* 232. *n.* 5. *Gelr.* 116.
Rapunculus esculentus. *Baub. pin.* 92.
Rapunculum. *Dod. pempt.* 165.
Raponcen. Belg.
In de Herkeloer-waart in Overysfel: by Zuideras, Diempt, Wageningen, Hunderen, de Poll, Lat-

Latmer, *eu elders in Gelderland.*

195. CAMPANULA foliis radicalibus obovatis, cau-^{perficifolia.}linis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis. *Sp.* 232. *n.* 6. *Gelr.* 115.

Campanula perficæfolia. *Lob. hist.* 117. *Morif. hist.* 2. *p.* 452. *f.* 5. *t.* 1. *f.* 2.

Rapunculus perficifolius, magno flore. *Baub. pin.*

^{93.}
Veel by Uilenpas.

196. CAMPANULA foliis cordato-lanceolatis, caule ^{rapunculi-}ramoso, floribus secundis squarosis, calycibus re-^{des.}flexis. *Sp.* 234. *n.* 12. *Gelr.* 114. *Fris.* 94.

Campanula hortensis, rapunculi radice. *Baub. pin.* 94. repente. *Morif. hist.* 2. *p.* 400. *f.* 5.

hist. 3. *f.* 32.

Duvels Naaigaarn. Belg Hortulanis.

In de Hoven onder de beggen, en in de Zaaïlanden op verscheide plaatsen.

197. CAMPANULA caule angulato, foliis petiolatis, ^{Tracheli-}calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Sp.* 235. ^{um.}
n. 16. *Gelr.* 113.

Campanula vulgarior, foliis urticæ, vel major & asperior. *Baub. pin.* 94.

Cervicaria major. *Dod. pempt.* 164.

Hals-Kruid. Belg.

In de Koornlanden by Zoelen in de Betuwe; ook zomtyds in de Hoven en op ruwe plaatsen.

198. CAMPANULA capsulis quinquelocularibus ob-^{barbata.}tectis, caule simplicissimo subunifolio, foliis lanceolatis, corollis barbatis. *Sp.* 236. *n.* 22. *Gelr.* 119.

Campanula foliis anchusæ, floribus oblongis. *Baub. pin.* 94.

Campanula foliis hispida, caule subunifloro. *All. pedem.* 36. *t.* 6. *f.* 2.

Rapunculus montanus. *Baub. hist.* 2. *p.* 808.

In de Salker-waart.

199. CAMPANULA caule ramosissimo diffuso, foliis ^{Speculum.}oblongis subcrenatis, floribus solitariis capsulis prismaticis. *Sp.* 268. *n.* 31. *Gelr.* 118.

Ono-

Onobrychis arvensis, vel *Campanula arvensis* erecta. *Baub. pin.* 215. *Comm. boll.* 81.

Avicularia sylvii quibusdam. *Baub. bist.* 2. p. 800. *Vrouwen - Spiegel.* Belg.

In de Koorlanden by Tiel, en op andere plaatsen in de Betuwe; by Twello op de Veluwe; by Utrecht, Wyk te Duurstede, Zwol, en elders.

Corolla apud nos calyce semper longior.

S A M O L U S.

Valerandi. 200. *SAMOLUS.* Sp. 243. n. 1. *Gelr.* 120. *Fris.* 95.

Anagallis aquatica, rotundo folio non crenato. *Baub. pin.* 252. *Comm. boll.* 9.

Alfina aquatica, foliis rotundis beccabungæ. *Morif. bist.* 2. p. 323. f. 3. t. 24. f. 28.

Oed. dan. t. 198.

Waterpungen met ronde ongekerfde bladeren. Belg.

Op veele plaatsen langs de Zuider-Zee-kant by Enkhuisen, Muiderberg, op Vlieland; en in de Duin-Valeyen tusschen Beverwyk en Velsen, en agter Egmond op den Hoef; ook langs de Zee-en Maas-kant by 's Gravezande, en in de pannen der Duinen op Staalduin. In Friesland by Koe-hool aan den binnenkant van de Zeedyk; buiten Franeker op verscheide plaatsen, in beneden wallen der Slooten, desgelyks in de Wouden, en ook by Groningen.

L O N I C E R A.

Periclymenum. 201. *LONICERA capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis* Sp. 247. n. 3. *Gelr.* 121.

Caprifolium germanicum. *Dod. pempt.* 411.

Periclymenum non perfoliatum germanicum. *Baub. pin.* 302. *Comm. boll.* 86.

Geiten-blad, *Mammetjes - kruid*, *Memmekens - kruid.* Belg.

Weeuwytjes. *Hollandis.*

Wilde Caperseely. *Vulgo.*

Veel langs de wegen by Zutphen; te Maurik op den Bikkelenberg; aan de Hierderweg by Harderwyk, en aan de Nuwspeeter-beek; in de Haarlemmer-hout; aan de kanten der Akkers tusschen de Zandpoort en Velsen, en buiten Naarden;

in

in 't Haagſche-Bofch, en in de Duinen aldaar;
in Friesland in de Wouden; by Groningen in 't
Goregt, voornaamlyk te Onnen en Haren; en
elders op vochtige en ſchaduwachtige plaatſen.
Pharm. CAPRIFOLII. herb. flor.

V E R B A S C U M.

202. VERBASCUM foliis decurrentibus utrinque to- *Thapſus.*
mentofis, caule ſimplici. *Sp.* 252. n. 1. *Gelr.* 125.

Verbascum mas latifolium luteum. *Baub.* pin. 239.
Comm. boll. 114.

Verbascum mas. *Dod. pempt.* 143.

Wolle-Kruid, Toortſen, Konings-Kaarsen. Belg.

Overvloedig aan de kanten der Duinen en Akkers op
veele plaatſen; ook zomtyds op oude Muuren. Me-
nigvuldig aan de Dyken tuſſchen Maas en Waal;
en aan de Weg by Middagten op de Veluwe; aan
de Ooſtkant van de Heereweg op de dykjes by de
Wolf, en agter Haren by Voorveld buiten Gro-
ningen; en elders.

Pharm. VERBASCI herb. flor.

203. VERBASCUM foliis cordato-oblongis petiolatis. *nigrum.*
Sp. 253. n. 4. *Gelr.* 126.

Verbascum nigrum. *Dod. pempt.* 144.

Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurascente.
Baub. pin. 240.

Op Uilenpas aan de wal om de Graften; op de
Paſtory-Kamp te Putten op de Veluwe; hier en
daar omtrent Boere-boeven buiten 's Hage; agter
den Kranenborg in Overyſſel.

204. VERBASCUM foliis amplexicaulibus oblongis *Blattaria.*
glabris, pedunculis ſolitariis. *Sp.* 254. n. 6.
Gelr. 127.

Blattaria. *Dod. pempt.* 145.

Blattaria lutea, folio longo laciniato. *Baub.* pin.
240.

Motten-Kruid. Belg.

Op zandige gronden by Haarlem, Overveen; op de
Paſtory-Kamp te Putten, en overvloedig by Warus-
veld, Keppel, Drempt en Uilenpas in 't Graaf-
ſchap Zutphen; op hooge ſchraale Uittenwaarden
te Wamel over Tiel.

D A T U R A.

- Stryamoni-um.* 205. **DATURA** pericarpis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Sp.* 255. n. 2. *Gelr.* 122.
Solanum foetidum, pomo spinoso oblongo, flore albo. *Baub.* pin. 168.
Tatula. *Cam.* *epit.* 176.
Oed. dan. t. 436.
Doorn-Appel, *Dol-Appel.* Belg.
Wonder-Boom. Nonnullus.
 By Tiel, Twello, ter Wolde, Wiesel, Hattem, en elders in Gelderland; in de Duinen niet verre van Heemstede; by 't Huis te Paauw; en op veele andere plaatsen; in sommige Boere-boven, en Boomgaarden by Haren buiten Groningen.

H Y O S C Y A M U S.

- niger.* 206. **HYOSCYAMUS** foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. *Sp.* 257. n. 1. *Gelr.* 123. *Fris.* 97.
Hyoscyamus vulgaris & niger. *Baub.* pin. 169.
Comm. boll. 59. *Morif. hist.* 2. p. 494. f. 5. t. 11. f. 1.
Dol-Kruid, *Zwart-Bilsen-Kruid.* Belg.
 Op de Kerkboven en andere ruwe plaatsen, en overvloedig in de Duinen.
Pharm. **HYOSCYAMI** rad. herb. sem.

S O L A N U M.

- Dulcamara* 207. **SOLANUM** caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. *Sp.* 264. n. 5. *Gelr.* 131. *Fris.* 98.
Solanum scandens f. *Dulcamara.* *Baub.* pin. 167. *Comm. boll.* 106.
Dulcamara. *Dod. pempt.* 402.
Alfrank, *Elfrank*, *Bitterzoet*, *Hoe langer hoe liever.* Belg.
Elgjes-bout, *Dolbessen-bout.* Buranis.
Weer-bout. *Veenendalensis.*
Qualster. *Rusticis.*
 Overvloedig aan de kanten der Slooten.
Pharm. **DULCAMARE** stipit.
Contra Arthritidem & Febres intermittentes Rusticis in usu; & manducatur contra Sodom.

208. So-

208. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis *nigrum*.
dentato-angulatis, racemis distichis nutantibus.

Sp. 266. n. 15. Gelr. 129. Fris. 99.

Solanum officinarum. Baub. pin. 166. Comm. boll.
106.

Solanum hortense. Dod. pempt. 154.

Oed. dan. t. 460.

Nagtschade, Dol-Kruid, Dolle-Beyen. Belg.

Op veelte plaatsen langs de Wegen, en in de Hoven.

Pharm. SOLANI herb.

Variat baccis rubris, viridibus & nigris.

R H A M N U S.

209. RHAMNUS spinis terminalibus, floribus quadri- *catharticus*
fidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. Sp.

279. n. 1.

Rhamnus catharticus. Baub. pin. 478.

Rhamnus solutivus. Dod. pempt. 756.

Rbynbezien - doorn, Doorn-bezien, Wege - doorn.
Belg.

By Waffenaar en aan de weg van 's Hage naar
Scheveningen voorby het Tolbek, en elders daar
omtrent in de Duinen.

Pharm. RHAMNI CATHARTICI f. SPINÆ

CERVINÆ bacc.

210. RHAMNUS inermis, floribus monogynis herma- *Frangula*
phroditis, foliis integerrimis. Sp. 280. n. 5.

Gelr. 128. Jngr. 37. Fris. 100.

Frangula. Dod. pempt. 784.

Alnus nigra baccifera. Baub. pin. 428. Comm.
boll. 6.

Oed. dan. t. 278.

Honds-boom, Sporcken-bout, Pyl-bout. Belg.

Stincke-boom, Vuil-boom, Hontjes-Hout. vulgo.

Baccæ Groninganis leupjes audiunt.

Buiten Harderwyk in Tonsel aan de Nykerker-
weg; buiten Utrecht, de Veurst, Venendal;
in 't Haagsche-Bosch; in Friesland omtrent
Kuykhorne; in Swartzenburgs-Bosch; in ruige
Wallen en Kreupelbosjes by 't Orange-Woud en
Bonte Bok, en elders; buiten Groninger in 't
Goreght op de meeste boschachtige plaatsen.

EU.

E U O N Y M U S.

Europæus. 211. *EUONYMUS* floribus plerisque quadrifidis, foliis sessilibus. *Sp.* 286. *n.* 1. *Gelr.* 85. *Fris.* 101. *Euonymus* vulgaris, granis rubentibus. *Baub. pin.* 428.

Euonymus. 2. *Clus. hist.* 1. *p.* 57.

Tetragonia. Dalech. hist. 272.

Paapen - Muts, Paapen - Hoed, Paapen - Hout, Kardinaals - Muts, Kardinaals - Hoed. Belg.

Luizen - Boom. Rusticis.

By Ouden - Aller, in Hierden, en elders buiten Harderwyk; veel om Tiel, te Drumpt, aan de Waal - Dyk op veele plaatsen; buiten Utrecht omtrent Zeyst; op de Velferheide; in Friesland buiten Makkinga, tusschen Kreupelbout; overvloedig by Haren buiten Groningen.

Rustici pulvere fructuum utuntur ad pediculos capiti infantum necandos.

R I B E S.

rubrum. 212. *RIBES* inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Sp.* 290. *n.* 1. *Gelr.* 135. *Fris.* 102.

Ribes vulgare acidum rubrum. *Baub. hist.* 2. *p.* 97.

Grossularia multiplici acino, f. non spinosa hortensis rubra. *Baub. pin.* 455. *Comm. boll.* 55.

Wilde Roode Aalbezien. Belg.

Aan de Duinkant tusschen Overveen en Bredenrode; buiten Utrecht; in Friesland op verscheide plaatsen in Boffchen, op oude Muuren en bolle Boomen; buiten Groningen op de Mickelhorst in 't Bosch.

nigrum. 213. *RIBES* inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. *Sp.* 291. *n.* 3. *Gelr.* 134.

Grossularia non spinosa, fructu nigro. *Baub. pin.* 455. *Comm. ball.* 56.

Oed. dan. t. 556.

Zwarte Aalbezien. Belg.

Overvloedig langs de Hackfortsche - beek in 't Graaffschap Zutphen; aan de Duinkant van Holland op verscheide plaatsen; buiten Groningen op de Mickelhorst in 't Bosch, en by de Endekooy tus-

tuffchen de Mickelhorft en Waterhuizen; en ook op de Wilgeboomen in de Laan van de Borgb te Hemmen.

214. *RIBES* ramis aculeatis, baccis glabris, pedicel-*Uvacrispa*.
lis bractea monophylla. *Sp.* 292. *n.* 7. *Gelr.* 136.

Fris. 103.

Grossularia simplicis acino, vel *spinosa sylvestris*.

Baub. pin. 455. *Comm. boll.* 55.

Uva crispa. *Dod. pempt.* 748.

Oed. dan. t. 546.

Kruis - Doorn, Kruis - Beziën, Doorn - Beziën,
Steekel - Beziën, Stik - Bessen. Belg.

Krissen. Bommeliensibus.

Aan de Duinkant in 't Wild, en ook in de Heggen
op sommige plaatsen.

H E D E R A.

215. *HEDERA* foliis ovatis lobatisque. *Sp.* 292. *n.* 1. *Hellz.*
Gelr. 132. *Fris.* 104.

Hedera arborea. *Baub.* pin. 305. *Comm. boll.* 56.

Hedera. *Dod. pempt.* 413.

Klimop, Boem - Veil. Belg.

Eyloof. Rusticis.

- β. *Hedera major sterilis.* *Baub.* pin 305. *Comm. boll.* 57.
Kleine Veil of Klimop. Belg.

Veel aan oude Muuren. β. in den Haarlemmer -
Hout, in 't Haagfche en andere Boffchen, over-
vloedig in 't Goregt buiten Groningen.

Pharm. *HEDERÆ ARBOREÆ.* herb. bacc.
gummi.

Flores hujus fæpe hexandri hexapetali. (Nob. D.
FABRICIUS SIX.)

I L L E C E B R U M.

216. *ILLECEBRUM* floribus verticillatis nudis, cau-*verticilla-*
libus procumbentibus. *Sp.* 298. *n.* 1. *Fris.* 105. *sum.*

Paronychia serpillifolia palustris. *Vaill. par.* 157.
t. 15. *f.* 7.

Polygonum parvum, flore albo verticillato. *Baub.*
bist. 3. *p.* 371. *Comm. boll.* 89.

Oed. dan. t. 335.

Op vochtige Zandige gronden op de Veluwe, en by
Zelhem in 't Graafſchap Zutphen; op de Heide by
E Rens-

Renswoude en by de Bildt in 't Sticht van Utrecht; aan de Wallen en Wegen by het Heereveen, Orangewoud, Augustinisga, &c. in Friesland; en omtrent Zwol.

G L A U X.

- maritima.* 217. GLAUX. Sp. 301. n. 1. Gelr. 137. Fris. 106.
 Glaux *maritima*. Baub. pin. 215. Comm. boll. 45.
Alfina bifolia, fructu coriandri, radice geniculata: Loeff. pruss. 13. t. 3.
 Oed. dan. t. 548.
 Zee-Melk-kruid. Belg.
 Aan de Zee-kant by Harderwyk, Elburg, Harlingen, Delfzyl, en andere plaatsen; op op de Haek langs 't Strand achter 's Gravezande; aan de Ykant, in de buitendykse landen buiten Amsterdam.

V I N C A.

- cilnor.* 218. VINCA caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. Sp. 304.
 n. 1. Gelr. 138.
Clematis daphnoides minor. Baub. pin. 301.
Clematis daphnoides. Dod. pempt. 405.
 Maagden-Palm, Vincoorde. Belg.
 In de Boschadje voor Uilenpas; en te Maurik in de Betuwe; by Haren, aan de Hooftweg naar de Waterhuizen buiten Groningen.
 Pharin. VINCE PERVINCE herb.

D I G Y N I A.

H E R N I A R I A.

- glabra.* 219. HERNIARIA glabra. Sp. 317. n. 1. Gelr. 139.
 Fris. 107.
Herniaria. Dod. pempt. 114.
Polygonum minus f. *Millegrana major*. Baub. pin. 281. Comm. boll. 88.
 Oed. dan. t. 529.
 Duizend-graen, Duizend-koorn. Belg.

Op drooge zandige plaatsen buiten Haarlem, Zwol,
in de Wouden in Friesland; en elders.

C H E N O P O D I U M.

220. CHENOPodium foliis triangulari - sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis axillaribus. *Sp.* 318. *n.* 1. *Bonus Hen- ricus.*

Lapathum unctuosum, folio triangulo. *Baub. pin.* 115. *Comm. boll.* 64.

Bonus Henricus. *Baub. hist.* 2. p. 965.

Oed. dan. t. 579.

Goeden Hendrik, Algoede, Lammertjes - Ooren. Belg.

In de Moesbeven en by de Wegen; veel te Putten op de Veluwe; om Tiel en in de Tielerwaard; op 't Kerkhof te Zoelen, aan den Dyk by 't Derp Heusden, en op de Pastory te Ommeren in de Neder-Betuwe; langs de Maas-dyk en op de Heide by 's Hage; op de Maat omtrent Wyk by Duurstede; en elders.

Pharm. BONI HENRICI herb.

221. CHENOPodium foliis cordato - triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subsessilibus caule brevioribus. *Sp.* 318. *n.* 3. *Gelr.* 143. *Frif.* 108. *rubrum.*

Atriplex sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 119. *Comm. boll.* 14. *Morif. hist.* 2. p. 604. f. 5. t. 31. f. 1.

Pes anserinus. *Dod. pempt.* 616. *Dalech. hist.* 542. fig. opt.

Ganze-voet. Belg.

Op veele plaatsen langs de wegen en paden, by vervallene Gebouwen, en in de Moes-boven.

222. CHENOPodium foliis ovatis nitidis dentatis acutis, racemis ramosis nudis. *Sp.* 318. *n.* 4. *muralis.*

Gelr. 144.

Chenopodium 1. *Tabern. hist.* 812. f. 1.

Atriplex sylvestris latifolia, acutiore folio. *Baub. pin.* 119.

Op de Muuren, en aan de kanten der Akkers op veele plaatsen.

223. CHENOPodium foliis rhomboideo - triangularibus *album.*

- bus erosis postice integris: summis oblongis, racemis erectis. *Sp.* 319. *n.* 6. *Gelr.* 141.
Atriplex sylvestris, folio sinuato candicante. *Baub. pin.* 119. *Comm. holl.* 13.
Atriplex sylvestris, *Fuchf. hist.* t. 119.
Wilde Melde. Belg.
Buiten Amsterdam, Doesburg, en elders langs de Dyken en Wegen, en op de Akkers.
- viride.* 224. *CHENOPODIUM* foliis rhomboideis: dentato-sinuatis, racemis ramosis subfoliatis. *Sp.* 319. *n.* 7. *Fris.* 109.
Chenopodium sylvestre, opuli folio. *Vaill. par.* 36. t. 7. f. 1.
Atriplex sylvestris. *Baub. hist.* 2. p. 972.
Veel in de Moes - boven.
Cl. COMMELINUS Atriplicem sylvestrem I. B. habuit pro Chenopodio albo.
- hybridum.* 225. *CHENOPODIUM* foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis nudis. *Sp.* 319. *n.* 8. *Gelr.* 144. *Fris.* 110.
Chenopodium stramonii folio. *Vaill. par.* 36. t. 7. f. 2.
Chenopodium 2. *Tabern. hist.* 812. f. 2.
Veel in Koorn- en andere Bouw-landen in Friesland; by Mestboopen omtrent Zwol, en elders.
- Botrys.* 226. *CHENOPODIUM* foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. *Sp.* 320. *n.* 9. *Fris.* 111.
Botrys ambrosioides vulgaris. *Baub. pin.* 138.
Botrys. *Dod. pempt.* 34.
Druiven-kruid, Motte-kruid. Belg.
In Boom-kwekeryen en sommige Moes-landen, tusschen de Boomen en Vruchten buiten Leeuwarden. (MEESE.)
Pharm. BOTRYOS. herb.
- glaucum.* 227. *CHENOPODIUM* foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis simplicibus glomeratis. *Sp.* 320. *n.* 13. *Gelr.* 142. *Fris.* 112.
Atriplex angustifolia laciniata minor. *Baub. hist.* 2. p. 972. *Comm. holl.* 14.
Veel langs de Wegen omtrent Amsterdam, Zwol, en elders by Boere-Woningen en Mestboopen.
 228. *CHE-*

228. *CHENOPodium* foliis integerrimis rhomboideis-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus.
Sp. 321. n. 14. *Fris.* 113.
Atriplex foetida. *Baub.* pin. 119.
Vulvaria. *Dalech. hist.* 543.
Stinkende Melde. Belg.
Overal in Moes-boven, en aan de Wegen in Friesland.
229. *CHENOPodium* foliis intergerrimis ovatis, ^{poly spermum.} caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus. *Sp.* 321. n. 15.
Blitum polyspermum. *Baub.* pin. 118.
Blitum minus polyspermum a feminis copia. *Morif. hist.* 2. p. 599. f. 5. t. 30. f. 6.
In de Moes-boven op verscheide plaatsen.
230. *CHENOPodium* foliis subulatis semicylindricis. ^{maritimum.}
Sp. 321. n. 17. *Fris.* p. 87.
Kali minus album, femine splendente. *Baub.* pin. 289. *Morif. hist.* 2. p. 610. f. 5. t. 33. f. 3.
Kali minus, f. Sedum minus arborefcens vermiculatum. *Baub. hist.* 3. p. 702. *Comm. boll.* 62.
Oed. dan. t. 489.
Kleine witte Kali. Belg.
Overeloodig op de weg naar de Helder op 't Koe-gras, en aan de Zee-kant by 's Gravezande, Enkhuizen, Delfzijl, en in Friesland.

B E T A.

231. *BETA* floribus geminis. *Sp.* 322. n. 1. ^{maritima.}
Beta sylvestris maritima. *Baub.* pin. 118.
Wilde Beete of Kroote. Belg.
Aan de Zee-kant by Helvoetsluis.

S A L S O L A.

232. *SALSOLA* herbacea decumbens, foliis subulatis ^{Kali.} spinosis scabris, calycibus marginatis axillaribus. *Sp.* 322. n. 1. *Gelr.* 146. *Fris.* 114.
Kali spinoso affinis. *Baub.* pin. 289. *Comm. boll.* 62.
Morif. hist. 2. p. 611. f. 5. t. 33. f. 11.
Seekende Kali. Belg.
Op veelde plaatsen langs de Zee-kant by Hoophuizen
E 3
bui.

buiten Harderwyk, by Scheveningen, 's Gravezande, Zandvoort, Wyk op Zee; aan de Zee-dyk by Medenblick, en tusschen Harlingen en Roptazyl.

Soda. 233. *SALSOLA* herbacea patula, foliis inermibus. *Sp.* 323. n. 6.

Kali. *Dod. pempt.* 81.

Kali majus, cochleato femine. *Baub. pin.* 287.

† *Volgens* BOERHAAVE.

Pharm. KALI herb.

fruticosa. 234. *SALSOLA* fruticosa erecta, foliis filiformibus obtusiusculis. *Sp.* 324. n. 11.

Kali species, f. *Vermicularis marina* arborescens.

Baub. hist. 3. p. 704. *Comm. holl.* 62.

Anthyllis chamæpityides frutescens. *Baub. pin.* 282.

Op 't Eyland Walcheren en Texel.

U L M U S.

campestris. 235. *ULMUS* foliis duplicato-ferratis: basi inæqualibus. *Sp.* 327. n. 1. *Gelr.* 151.

Ulmus campestris & *theophrasti*. *Baub. pin.* 426. *Comm. holl.* 116.

Ulmus. *Dod. pempt.* 837.

Olm-boom, Ypen-boom, *Hersfeleer.* Belg.

Overal aan de Wegen en in de Bosschen.

G E N T I A N A.

Pneumonanthe. 236. *GENTIANA* corollis quinquefidis campanulatis oppositis pedunculatis, foliis linearibus. *Sp.* 330. n. 5. *Gelr.* 147. *Fris.* 116.

Gentiana angustifolia autumnalis major. *Baub. pin.* 188. *Comm. holl.* 44. *Morif. hist.* 3. p. 483.

f. 12. t. 5. f. 12.

Gentiana palustris angustifolia. *Dod. pempt.* 168.

Oed. dan. t. 269.

Klein Gentiaan, Blauwe Lelytjes, Spade Kloxkens. Belg.

In Veen-landen en op vochtige Hei-velden by Harderwyk, Hartskamp, Voorthuizen, Barneveld, Hal, Uilenpas, en elders in Gelderland; by Naarden, Utrecht, Zwol, by Heerenveen, Bergum, Rot-

Rotteval, Dragten, en elders in Friesland; by Haren, de Michelhorst, en elders in de Provincie Groningen.

237. GENTIANA corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, foliis radicalibus confertis majoribus. *Sp.* 331. n. 10.

Gentianeilla alpina verna major. *Baub.* pin. 188.

Gentianeilla verna minor. *Clus. hist.* 1. p. 315.

Ericoila Reneale *spec.* 75. t. 68.

† Volgens BOERHAAVE.

238. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici. *Centaureum.*
Sp. 332. n. 17. *Gelr.* 149. *Fris.* 117.

Centaureum minus. *Baub.* pin. 278. *Dod. pempt.* 336. *Comm. boll.* 23.

Duizend-guldens-kruid, Kleine Santory. Belg.

- β. Centaureum minus, flore albo. *Baub.* pin. 278.
Boerb. lugdb. 1. p. 223.

Overvloedig in de Duin-valeyen van Holland; in schraale Weilanden te Avesaatte, Maurik, en vooral te Ommeren in de Betuwe; in de Weilanden by Zutphen, en tusschen Harderwyk en Doornspyk; ook by Zeist, Amerongen, Neer-Langbroek, Wykersloot in de Provincie Utrecht; by Franeker, Bergum, Dragten, Oostermeer en Heerenveen in Friesland op verschillende gronden en in groote menigte op 't Eiland Schiermunnikoog.

Pharm. CENTAURII MINORIS herb. summit.

239. GENTIANA corollis quadrifidis fauce barbatis. *campestris.*
Sp. 334. n. 23.

Gentiana purpurea minima. *Col. ecphr.* 1. p. 223.
t. 221.

Gentianeilla alpina verna minor. *Baub.* pin. 188.

Oed. dan. t. 367.

Op de Heide by Hengel in 't Graaffschap Zutphen; in de Duinen tusschen Vellen en Beverwyk, agter de Hofstede Westerhout; en agter Leyduin by de Vogelzang buiten Haarlem.

240. GENTIANA corollis quadrifidis imberbibus, *Cruciata.*
floribus verticillatis sessilibus. *Sp.* 334. n. 25.

Gentiana cruciata. *Baub.* pin. 188. *Comm. boll.* 43.

Boerb. lugdb. 1. p. 205.

Gentiana minor. Cam. epit. 417.

Maldelgeer. Belg.

In verscheide Duin-valeyen agter Overveen buiten Haarlem; en overvloedig langs de weg naar Scheveningen buiten 's Hage.

ERYNGIUM.

maritimum 241. *ERYNGIUM* foliis radicalibus subrotundis plicatis, spinosis, capitulis pedunculatis paleis tricuspidatis. *Sp.* 337. *n.* 5. *Gelr.* 152. *Fris.* 118.

Eryngium maritimum. *Baub.* pin. 386. *Comm. boll.* 35.

Eryngium marinum. *Dod. pempt.* 370. *Clus. bist.* 2. p. 169. *Cam. epit.* 448.

Zee-Kruis-Distel, Meer-Distel. Belg.

Veel aan de Zee-kant by Harderwyk; aan de Zee-Dyken en Duinen van Holland, en dicht by het strand te Zandvoort; in Friesland tusschen Harlingen en Roptazyl, en elders aan de Zee-Dyken; ook binnenslands by Schagen buiten Alkmaar.
Pharm. *ERYNGII MARITIMI* rad.

campestre. 242. *ERYNGIUM* foliis radicalibus amplexicaulibus pinnato-laciniatis. *Sp.* 337. *n.* 8. *Gelr.* 153.

Eryngium vulgare. *Baub.* pin. 386. *Comm. boll.* 35.

Eryngium campestre vulgare. *Clus. bist.* 2. p. 157.

Oed. dan. t. 554.

Veld-Kruis-Distel, Wallen-Distel. Belg.

Tuimel-Distel. Vulgo.

Overvloedig aan den Yssel-dyk in Gelderland en Overijssel; aan de Lek-dyk in de Provintie Utrecht; by de vervallen Kerk op Muiderberg; langs de Dyken by Loosduinen, Monster, 's Gravezande; en elders op zandige ruwe plaatsen.

HYDROCOTYLE.

vulgaris. 243. *HYDROCOTYLE* foliis peltatis, umbellis quinquefloris. *Sp.* 338. *n.* 1. *Gelr.* 154. *Fris.* 119.

Hydrocotyle vulgaris. *Tourn. inst.* 328. *Lind. als.* 266. *t.* 12.

Ranunculus aquaticus, cotyledonis folio. *Baub.*

pin. 180. Comm. boll. 96.

Cotyledon palustris. Dod. pempt. 113.

Oed. dan. t. 90.

Water-Navel-Kruid. Belg.

In vochtige Wei en Hooi-landen by Harderwyk, Amsterdam, Zwol, en elders; ook in de Duin-valeyen; in Friesland in de Wouden; en in de Provincie Groningen by Haren, de Waterhuizen, &c. zeer gemeen, aan kanten van Slooten, en op andere vochtige gronden.

S A N I C U L A.

244. SANICULA foliis radicalibus simplicibus, floscu- *europaea.*
lis omnibus sessilibus. Sp. 339. n. 1. Gelr. 155.

Sanicula officinarum. Baub. pin. 319.

Diapensia. Cam. epit. 763.

Oed. dan. t. 283.

Sanikel, Breuk-kruid. Belg.

Op schaduwwachtige plaactjen by Engelenburg en Uilenpas in Gelderland.

Pharm. SANICULÆ berb.

B U P L E U R U M.

245. BUPLEURUM involucris universalibus nullis, *rotundifolium.*
foliis perfoliatis. Sp. 340. n. 1. Gelr. 169.

Perfoliata vulgarissima, f. arvensis. Eaub. pin.

277.

Perfoliata. Dod. pempt. 104.

Deurwas, Doorwas. Belg.

In de Koorn-landen by Uilenpas en Hunderen in Gelderland.

T O R D Y L I U M.

246. TORDYLIUM umbellis confertis, foliolis ova- *Anthriscus.*
to-lanceolatis pinnatifidis. Sp. 346. n. 6. Fris.
120.

Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus.

Baub. pin. 152. prodr. 30. Boerb. lugdb. 1. p.

63.

Caucalis minor, flore rubente. Moris. bist. 3. p.

308. f. 9. t. 14. f. 8.

Akker-Klitzzen. Belg.

E S

Langs

Langs de zandige Wegen buiten Haarlem, Utrecht, Zwol, en in de Schermer buiten Alkmaar. Aan drooge Wallen en op andere schraale plaatsen en wegen buiten Franeker, en elders in Friesland.

In Comm. boll. 23. perperam hæc planta reerisetur nomine Caulalidis lato apii folio. Baub. pin. 152.

nodosum. 247. **TORDYLIUM** umbellis simplicibus sessilibus, feminibus exterioribus hispidis. *Sp. 346. n. 7. Fris. 121.*

Caucalis nodosa, echinato semine. Baub. pin. 153. prodr. 80. Baub. bist. 3. p. 83.

In Friesland by de voorige. (MEESE.)

D A U C U S.

Carota. 248. **DAUCUS** feminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. *Sp. 348. n. 1. Gelr. 156. Fris. 122.*

Pastinaca tenuifolia sylvestris dioscoridis, vel Daucus officinarum. Baub. pin. 151. Comm. boll. 85. Moris. bist. 3. p. 305. f. 9. t. 13. f. 2.

Wilde - Peen, Vogel - nest, Kroontjes - kruid. Belg. Overvloedig in braak - leggende Zaai - landen by Tiel, Zutphen, Doesburg, Harderwyk; aan de Duinkanten van Holland; aan de wegen om Wyk by Daurstede; aan de ryd - en trekweg tusschen Harlingen en Franeker; en elders.

Pharm. DAUCI VULGARIS sem.

B U N I U M.

Bulbocastanum. 249. **BUNIMUM.** *Sp. 349. n. 1.*

Bulbocastanum majus, folio apii. Baub. pin. 162. Comm. boll. 17.

Nucula terrestris. Lob. bist. 429.

Oed. dan. t. 220.

Aard - Nooten. Belg.

By Loosduinen, Monster, de Zandpoort, en omtrent Velsen in de Zaai - landen.

C O N I U M.

maculatum. 250. **CONIUM** feminibus striatis. *Sp. 349. n. 1. Gelr. 157. Fris. 123.*

Cicuta major. Baub. pin. 160. Comm. boll. 26.

Mo-

Morif. bist. 3. p. 290. f. 9. t. 6. f. 1.
Dalle-Kervel, Scheerling. Belg.
Veel by de Wegen en Paden, en aan de Slooten, als
ook in de Boffchen.
 Pharm. CICUTÆ MAJORIS herb.

S E L I N U M.

251. SELINUM radice fusiformi multiplici. *Sp. 350. sylvestre.*
n. 1. Gehr. 158.

Apium sylvestre lacteo succo turgens. Baub. pin.
153. Comm. boll. 12.

Thysselinum plinii. Lob. bist. 409. Morif. bist. 3.
p. 319. f. 9. t. 17. f. 2.

Wilde Peterselie. Belg.

Aan de kanten van de Boomgaarden, op vochtige
schaduwachtige plaatsen, buiten Haarlem, U.
trecht, Zwol, en elders.

252. SELINUM sublaetescens, radice unica. *Sp. 350. palustre.*
n. 2. Fris. 124.

Seseli palustre laetescens. Baub. pin. 162. prodr.
85. Comm. boll. 105.

Seseli palustre laetescens acre, foliis ferulaceis,
flore albo, semine lato. Baub. bist. 3. p. 189.

Wilde-Eppe. Belg.

Overvloedig in de Slooten om Tiel; in de Weiden te
Kraalingen by Rotterdam; aan de Slootswallen
by Tjetjerk, Bergum, en elders in de Wouden
in Friesland; in stilstaande Poelen en byna uitge-
droogde Slooten in de Zillick in Overysfel.

P E U C E D A N U M.

253. PEUCEDANUM foliis quinques tripartitis fili-*officinale.*
formibus linearibus. Sp. 353. n. 1. Fris. 125.

Peucedanum germanicum. Baub. pin. 149.

Peucedanum. Baub. bist. 3. p. 36.

Varkens-Venkel. Belg.

Aan de wegen en kanten der Slooten te Bergum,
Oostermeer, Langweer, Heerenveen, &c. in
Friesland.

Pharm. PEUCEDANI rad.

CRITH.

CRITHMUM.

- maritimum* 254. CRITHMUM foliolis lanceolatis carnosiss. *Sp.*
354 n. 1.
Crithmum f. Foeniculum maritimum minus. *Baub.*
pin. 288. *Boerb. lugdb.* 1. p. 57.
Foeniculum marinum. f. Empetrum. f. Calcifraga
Lob. ic. 392.
Zee-Venkel, *Zee-Peterfelie*. Belg.
In Zeeland.

HERACLEUM.

- Sphondyli-* 255. HERACLEUM foliolis pinnatifidis lævibus, flo-
um. ribus uniformibus. *Sp.* 358. n. 1. *Gelr.* 175.
Sphondylium vulgare hirsutum. *Baub. pin.* 157.
Comm. boll. 108. *Morif. bist.* 3. p. 313. f. 9. t. 16. f. 1.
Beeren-Klaauw. Belg.
Zeer veel in de Betuwe, Tielerwaard, en om Tiel;
buiten Harderwyk langs 't voetpad aan de Hooge
Sypel; in 't Haagfche Bosch; in den Haarlem-
mer-hout; om Utrecht, Wyk by Duurstede,
Zwol, in 't Goregt buiten Groningen; en elders
op fchaduwachtige plaatfen.

LIGUSTICUM.

- Levisticum.* 256. LIGUSTICUM foliis multiplicibus: foliolis su-
perne incis. *Sp.* 359. n. 1.
Ligusticum vulgare. *Baub. pin.* 157. *Comm. boll.* 66.
Levisticum vulgare. *Morif. bist.* 3. p. 275. f. 9.
t. 3. f. 1.
Lavas. Belg.
Lubbestok, Mans-kracht, Rusticis.
In de Duinen van den Weeligen-berg tusschen
Haarlem en Bennenbroek; en elders.
Pharm. LEVISTICI rad. herb. sem.

ANGELICA.

- lyvestris.* 257. ANGELICA foliolis æqualibus ovato-lanceolatis
ferratis. *Sp.* 361 n. 2. *Gelr.* 161. *Fris.* 126.
Angelica sylvestris major. *Baub. pin.* 155. *Comm.*
boll. 10.
Angelica sylvestris. *Dod. pempt.* 318.

Wilde Angelica. Belg.

In de Boschadien by Uilenpas, Enghuizen, Tiel, en elders in Gelderland; langs de Graften en Slooten by 's Hage; in de Veen-landen by Amstelveen; in den Aardenbouts-laan buiten Haarlem; aan de Zander-sloot buiten Alkmaar; te Bergum, Oostermeer, Langweer, Heerenveen, en elders in Friesland; op de Mickelhorst en elders buiten Groningen.

S I U M.

243. *Sium* foliis pinnatis, umbella terminali. *Sp. latifolium.*
361. n. 1. *Gelr.* 162.

Sium latifolium. *Baub. pin.* 154.

Sium sive *Apium* parvifolium, foliis oblongis. C. B.
Comm. bell. 106.

Sium majus latifolium. *Morif. hist.* 3. p. 282. f. 9.
t. 5. f. 1.

Oed. dan. t. 246.

Water-Eppe. Belg.

In veele Slooten en Beeken; overvloedig aan 't Eind van de Hooge Sydel by Harderwyk; en aan de Duinkant.

Synonymum C. *Baub. a Commelino allegatum pertinet ad Sium angustifolium Linn.*

259. *Sium* foliis pinnatis, umbellis axillaribus sessilibus. *Sp. nodiflorum.*
361. n. 2. *Fris.* 128.

Sium aquaticum procumbens ad alas floridum.
Morif. hist. 3. p. 283. f. 9. t. 5. f. 3.

Als vooren; en in de Slooten rondom Zandhorst in Holland; ook omtrent Augustinisga, en aan de kanten van de Rivier de Tjonger of Kuinder by Oude-Berkoop in Friesland.

Confunditur ab imperitis cum Sisymbrio Nasturtio aquatico dicto.

S I S O N.

260. *Sison* repens, umbellis bifidis. *Sp.* 363. n. 5. *inundatum.*
Ingr. 43. *Fris.* 129.

Sium minimum, foliis imis ferulaceis. *Morif. hist.*
3. p. 283. f. 9. t. 5. f. 5.

Millefolium aquaticum umbellatum capillaceo
bre-

brevique folio. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 74.
Oed. dan. t. 89.

In stilstaande zoete wateren aan de Duinkant by den Aardenhout; en buiten Utrecht; in natte gruppels, in en aan de kanten der Slooten, omtrent Kuikhorne, Bonte-bok, Ureterp, Deurswolde; Haule, &c. in Friesland.

O E N A N T H E.

fistulosa. 261. *OENANTHE* stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis. *Sp.* 365. *n.* 1. *Gelr.* 165. *Fris.* 138.

Oenanthe aquatica. Baub. pin. 162. *Comm. boll.* 81.
Juncus odoratus aquatilis. Dod. pempt. 590.

Welriekende Water-Biesen. Belg.

2. *Oenanthe aquatica minor. Boerb. lugdb.* 1. p. 51.
 Veel in stilstaande Wateren en vochtige Weiden.

P H E L L A N D R I U M.

aquaticum. 262. *PHELLANDRIUM* foliorum ramificationibus divaricatis. *Sp.* 366. *n.* 1. *Gelr.* 166. *Fris.* 131

Phellandrium. Dod. pempt. 591.

Cicutaria palustris tenuifolia. Baub. pin. 161.
Comm. boll. 26.

Water-Kervel. Belg.

Op veele plaatsen in de Slooten en Graften.

Pharm. PHELLANDRII herb. sem.

Bobus innoxium est tabulum.

C I C U T A.

virosa. 263. *CICUTA* umbellis oppositifoliis, petiolis marginatis obtusis. *Sp.* 366. *n.* 1. *Gelr.* 167. *Fris.* 132.

Cicuta aquatica gesneri. Baub. hist. 3. p. 175.

Sium erucæ folio. Baub. pin. 154. *Comm. boll.* 106.

Sium alterum. Dod. pempt. 589.

Oed. dan. t. 208.

Dolle-Kervel of Water-Scheerling. Belg.

Op verscheide plaatsen in de Slooten en Moerassen; aan 't Konings-meer by Meerveld op de Veluwe; in eenen diepen Sloop boven de Stad Cutlenburg; veel aan de Duinkant, en om 's Hage in de veenplassen, en in de Oost-en West-beek; in de Slooten

ten nevens 't Hoorensche-diep, en aan de Offe-
brink agter de Mickelhorst, ook by de Water-
huizen buiten Groningen.
Pharm. Cicutæ herb.

Æ T H U S A.

264. *ÆTHUSA* foliis conformibus. Sp. 367. n. 1. *Cynapium*.
Gelr. 168. Fris. 132.

Cicuta minor, petroselino similis. Baub. pin. 160.

Comm. boll. 26. Moris. hist. 3. p. 290. f. 9. t. 7. f. 2.

Cicutaria fatua. Lob. ic. 280.

Kleine Dulle-Kervel, Wilde Eppe, Wilde Peters-
lie, Hond's-Peterselie. Belg.

Buiten Amsterdam op de weg naar Amstelveen;
in 't Haagse-bosch tusschen de Akkers, en veel
by de Boere-boeven in de Duinen; ook veel omtrent
Deventer en Zwol; en in Friesland aan de We-
gen, in de Boffchen en Moes-boven op veele plaat-
sen.

S C A N D I X.

265. *SCANDIX* feminibus rostro longissimo. Sp. 368. *P. Ren*.
n. 2. Gelr. 170. Fris. 134.

Scandix, semine rostrato, vulgaris. Baub. pin.

152. Comm. boll. 103. Moris. hist. 3. p. 304. f.

9. t. 11. f. 1.

Pecten veneris. Cam. epit. 302.

Naalde-Kervel. Belg.

Ooijevaars-Neb, Kraanebek. Rusticis.

In de Zaaïlanden op veele plaatsen.

266. *SCANDIX* feminibus nitidis ovato-fusculatis, *Cerofolium*
umbellis sessilibus lateralibus. Sp. 368. n. 3.

Gelr. 172.

Cherophyllum sativum. Baub. pin. 152. Comm.
boll. 25.

Chærefolium. Dod. pempt. 700.

Kervel. Belg.

Komt op veele Akkers en in Moes-boven van zelfs
voort.

Pharm. *CHÆROPHYLLI* herb. sem.

267. *SCANDIX* feminibus ovatis hispidis, corollis *Anthriscus*
uni-

uniformibus, caule lævi. *Sp.* 368. *n.* 4. *Gelr.* 171. *Fris.* 135.

Cerese folium sylvestre annuum, seminibus brevioribus villosis. Moris. bist. 3. p. 303. f. 9. t. 10. f. 2.

Myrrhis sylvestris, seminibus asperis. Baub. pin. 160. Comm. boll. 79.

Veel by de wegen op ruwe plaatsen buiten Harderwyk, Amsterdam, aan de Stads-wal te Franeker; en elders.

C H Æ R O P H Y L L U M.

sylvestre. 268. *CHÆROPHYLLUM* caule lævi striato geniculis tumidiusculis. *Sp.* 369. *n.* 1. *Gelr.* 173. *Fris.* 136.

Myrrhis sylvestris, seminibus lævibus. Baub. pin. 160. Comm. boll. 79.

Myrrhis vulgaris. Dod. pempt. 701.

Wilde Kervel, Pyp-kruid. Belg.

By de wegen en in de velden, omtrent Scheveningen, Heemstede, Zwol, &c.

Luscinias allicere dicitur, unde Nagtegaals-kruid Westfrisijs audit.

temulentum. 269. *CHÆROPHYLLUM* caule scabro: geniculis tumidis. *Sp.* 370. *n.* 3. *Gelr.* 174.

Chærophyllo sylvestre. Baub. pin. 152. Comm. boll. 79.

Myrrhis annua vulgaris, caule fusco. Moris. bist. 3. p. 302. f. 9. t. 10. f. 7.

Wilde Kervel. Belg.

Langs de wegen, op vochtige schaduwachtig plaatsen omtrent Harderwyk, 's Hage, Haarlem, Zwol, &c.

P A S T I N A C A.

fatia. 270. *PASTINACA* foliis simpliciter pinnatis. *Sp.* 376. *n.* 1. *Gelr.* 176. *Fris.* 137.

Pastinaca sylvestris latifolia. Baub. pin. 155. Comm. boll. 85. Moris. bist. 3. p. 314. f. 9. t. 16. f. 2.

Wilde Pastinaken, of Pinxternakels. Belg.

In de Weiden, en aan de kanten der Akkers, ook by de wegen omtrent Harderwyk, 's Hage, Haarlem,

lem, Utrecht; in Friesland zoo op de Kley als in de Wouden; overvloedig aan de Slooten van 't laage land van 't Goregt buiten Groningen.
Pharm. PASTINACÆ SYLVESTRIS rad. sem.

S M Y R N I U M.

271. SMYRNIUM foliis caulinis ternatis petiolatis *oluscarum*.
ferratis. Sp. 376. n. 3.
Hippofelinum theophrasti f. Smyrnum dioscoridis. Baub. pin. 154. Comm. boll. 59.
Hippofelinum. Dod. pempt. 698.
Grootste Eppe, Wilde Eppe. Belg.
Veel op 't Eyland Texel.
Pharm. OLERIS ATRI herb. sem.

C A R U M.

272. CARUM. Sp. 378. n. 1. Jngr. 45. Fris. 138. Dod. Carui. pempt. 299. Cam. epit. 516.
Cuminum pratense, Carui officinarum. Baub. pin. 158. Comm. boll. 29.
Carwey, Caruwy, Hof-Comyn. Belg.
In 't Broeck by Arnhem; in de Weiden om Tiel, en te Meinderswyk in de Betuwe; aan den Dyk tusschen Amsterdam en Muyden; by Houten buiten Utrecht; in verscheide Weilanden buiten Franeker; in een stuk Weiland even buiten de Ebbinge-poort te Groningen.

P I M P I N E L L A.

273. PIMPINELLA foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis; fummis linearibus. Sp. 378. n. 1. Gelr. 179. Fris. 139.
Pimpinella saxifraga minor. Baub. 160. Cam. epit. 775. Comm. boll. 88.
Tragofelinum foliis pinnatis, pinnis ovatis. Hall. bist. 1. p. 350.
Kleine Bevernel, Bevernaart, of Steenbreek. Belg.
Op zandige plaatsen by Hattem, Zwol, Velsen, in de wildernis by 's Huis te Bredenrode achter de Zandpoort; in de Duinen tusschen de Heide buiten 's Hage; aan de Wegen en op Heivelden by Bergum, Heerenveen en Orange-woud in Friesland

magna.

274. PIMPINELLA foliolis omnibus lobatis: impari-trilobo. *Mant.* 219.

Pimpinella saxifraga major, umbella candida. *Baub. pin.* 159. *Comm. boll.* 88.

Pimpinella saxifraga. *Cam. epit.* 775.

Saxifraga magna. *Dod. pempt.* 315.

Tragofelinum foliis pinnatis, pinnis lanceolatis, ferratis, extremis trilobatis. *Hall. bist.* 1. p. 349.

Groote Bevernel, Bevernaart, of Steenbreek. Belg. Buiten Haarlem voorby de Zandpoort op hooge landen.

Pharm. PIMPINELLÆ ALBÆ rad. *sem.*

Præcedenti minus acris.

A P I U M.

- graveolens.* 275. APIUM foliolis caulinis cuneiformibus. *Sp.* 379. n. 2. *Gelr.* 181. *Fris.* p. 87.

Apium palustre & Apium officinarum. *Baub. pin.* 154. *Comm. boll.* 12.

Apium palustre. *Cam. epit.* 527.

Fuffrouw-Merk, Eppe, Wilde Seldery. Belg.

Langs de Muider-dyk omtrent Amsterdam; langs de weg naar Spaarnwoude en 't Penninx-veer buiten Haarlem; in de Slooten tusschen bet Riet langs de Maas agter 's Gravendyk; in Waterland; aan de kanten der Slooten op veele plaatsen buiten Alkmaar; op 't Eyland Schokland; aan den Yssel-dyk by Campen; ook in Worrummer-Nylanden in Friesland.

Pharm. APII. rad. herb. *sem.*

Æ G O P O D I U M.

- Podagraria* 276. ÆGOPodium foliis caulinis summis ternatis. *Sp.* 379. n. 1. *Gelr.* 180. *Fris.* 140.

Angelica sylvestris minor sive erratica. *Baub. pin.* 155. *Comm. boll.* 11.

Herba gerardi. *Dod. pempt.* 326.

Gerards-Kruid, Flierfin-Kruid, Haanepoot. Belg. Zevenblad. *Vulgo.*

Overvloedig by de Wegen, aan Wallen, in Hoven, onder de Heggen op schaduwachtige plaatsen.

T R I G Y N I A.

V I B U R N U M.

277. *VIBURNUM* foliis lobatis, petiolis glandulosis. *Opulus.*

Sp. 384. *n.* 7. *Gelr.* 183.

Sambucus aquatica, flore simplici. *Baub.* pin. 456.

Sambucus palustris. *Dod. pempt.* 846.

Water-Vlier. Belg.

By de Geldersche Toorn, Engelenborgh, in Elderik, Wehl. in 't Graafschap Zutphen; in Tonfel en Hierden buiten Harderwyk; in 's Haagse - bosch; in de Herkeloer - en Salker - Waart; in 't bosch op de Mickelhorst, en te Onnen by Groningen.

Varietas hujus flore globoso pleno, quæ in hortis colitur, vulgo Geldersche - Roos, Sneeuw - ballen, Bal - Roozen vocatur.

S A M B U C U S.

278. *SAMBUCUS* cymis tripartitis, stipulis foliaceis, *Ebulus.*
caule herbaceo. *Sp.* 385. *n.* 1. *Gelr.* 185. *Fris.*

141.

Sambucus humilis f. *Ebulus.* *Baub.* pin. 456.

Comm. boll. 102.

Ebulus. *Dod. pempt.* 381.

Wilde Vlier, Laage Vlier, Haddig. Belg.

Overvloedig langs de weg tusschen Gend en Bemmelmel; te Ogten en Ommeren, en aan den Dyk tusschen Lienden en Kesteren in de Betuwe; in Tonfel en elders buiten Harderwyk; op een braakland by ter Wolde; langs de Trekvaart by Delft; te Asch buiten Buuren; by Leerdam en Heukelum; tusschen Odyk en Werkhoven, om Wyk by Duurstede, en langs de weg by Cothen en Bunnik in 't Sticht van Utrecht; buiten Leeuwaarden, en omtrent Huysum en Oostermeer in Friesland.

Pharm. EBULI rad. cort. interior, herb. bacc.

279. *SAMBUCUS* cymis quinquepartitis, caule arbo- *nigra.*
reo. *Sp.* 385. *n.* 3. *Gelr.* 185. *Fris.* 142.

Sambucus fructu in umbella nigro. *Baub.* pin. 456.

F 2

Comm.

Comm. boll. 102.

Sambucus. *Dod. pempt.* 845.

Oed. dan. t. 545.

Vlier-boom. Belg.

β. *Sambucus laciniato folio.* *Baub. pin.* 456.

In Bosfchen en aan ruige wallen, by vervallene gebouwen, en op kerkboven aan veele plaatsfen; overvloedig in de Duinen by Haarlem, Heemstede, en Katwyk.

Pharm. SAMBUCI cort. interior, flor. bacc. sem.

C O R R I G I O L A.

Geralls. 280. *CORRIGIOLA.* *Sp.* 388. *n.* 1. *Gelr.* 186.

Polygonum littoreum minus, flosculis spadiceo-albicantibus. *Baub. pin.* 284. *prodr.* 131. *Comm. boll.* 90. *Morif. bist.* 2. *p.* 593. *f.* 5. *t.* 29. *f.* 1. *Polygoni-vel Linifolia per terram sparsa, flore scorpioides.* *Baub. bist.* 3. *p.* 379. *Comm. boll.* 91.

Oed. dan. t. 334.

Aan den Oever van den Ouden-Yssel by Keppel; aan de Zandvaart by 't Kraayenest buiten Haarlem; en aan de Bilt buiten Utrecht op zandige gronden.

A L S I N E.

media. 281. *ALSINE petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis.* *Sp.* 389. *n.* 1. *Gelr.* 253. *Fris.* 143.

Alsine media. *Baub. pin.* 250. *Comm. boll.* 7. *Morif. bist.* 2. *p.* 550. *f.* 5. *t.* 23. *f.* 4.

Alsine vulgaris f. Morsus gallinæ. *Baub. bist.* 3. *p.* 363.

Oed. dan. t. 525. 438.

Hoenderbeet, Muur, Vogel-Kruid. Belg.

Erf, Vulgo.

β. *Alsine aquatica major.* *Baub. pin.* 251.

Water-Muur. Belg.

Veel in de Hoven, en aan ruige Wallen en Wegen. f. Aan de Duinkant in stilstaande Wateren en Slooten by Overveen buiten Haarlem, en te Westbroek in 't Sticht van Utrecht.

Pharm. α ALSINES herb.

T E.

T E T R A G Y N I A.

P A R N A S S I A.

282. PARNASSIA. *Sp.* 391. *n.* 1. *Gelr.* 187. *palustris.*
 Gramen parnassi, albo simplici flore. *Baub. pin.*
309. Comm. boll. 55.
 Gramen parnassium. *Dod. pempt.* 564.
Oed. dan. t. 584.
Gras van Parnas. Belg.
In de vochtige landen tusschen 's Heeren-Loo en
Telg; in 't Veen tusschen Hartskamp en Essen
op de Veluwe; op de Heide by Selhem in't Graaf-
schap Zutphen; in de vochtige Duin - valeyen by
's Hage. Lisse; Wyk op Zee, Raaphorst, &c.
ook by de nieuwe Kolk buiten Haarlem; en over-
vloedig in de Velden tusschen Alkmaar en Egmond
op den Hoef.

P E N T A G Y N I A.

S T A T I C E.

283. STATICE scapo simplici capitato, foliis linea- *Armaria*
 ribus. *Sp.* 394. *n.* 1. *Gelr.* 188. *Fris.* 144.
 Caryophyllus montanus major, flore globoso. *Baub.*
pin. 211. *Comm. boll.* 22.
 Gramen polyanthemum majus. *Dod. pempt.* 564.
Bloeyend Zee-gras. Belg.
 β. Caryophyllus montanus minor. *Baub. pin.* 211.
Comm. boll. 22.
Veel by Harderwyk in de Meben; buiten Noerden
aan de booge Zee-kant, naar Huysen en Oude-
naarden; in Zeeland op de stranden; buitep Har-
lingen aan de Zee-dyk, en by Franeker op een
waterachtige plaats.
 284. STATICE scapo paniculato tereti, foliis laevibus *Linnae*
 enerviis, subtus mucronatis. *Sp.* 394. *n.* 2. *Fris.*
 145.

*Limonium maritimum majus. Baub. pin. 192.
Comm. boll. 67.*

Valerianæ rubræ similis. Dod. pempt. 351.

Oed. dan. t. 315.

Limoen-kruid. Belg.

f. *Limonium parvum, bellidis minoris folio. Baub. pin. 192.*

*Overvloedig achter 's Gravezande aan't Zee-strand;
op 't Koe-gras op de Weg naar de Helder; op de
Zeeuwſche Schorren, veel op 't Eyland van Ter-
neuse; en aan de Zee-dyk by Harlingen. β. Aan
de Zwartewaters-dyk by Haſſelt.*

Pharm. BEHEN RUBRI rad.

L I N U M.

*astatissi-
mum.*

285. *LINUM calycibus capsulisque mucronatis, pe-
talis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule
subsolitario. Sp. 397. n. 1. Gelr. 190. Fris. 146.*

Linum arvenſe. Baub. pin. 214.

*Linum ſylveſtre ſativum plane referens. Baub.
hiſt. 3. p. 452. Comm. boll. 67.*

Wild Vlas. Belg.

Onder de Haver en Garſt op verſcheide plaatſen.

Pharm. LINI ſem. far. ol.

*catharti-
cum.*

286. *LINUM foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, caule
dichotomo, corollis acutis. Sp. 401. n. 18.
Gelr. 191.*

Linum pratenſe, ſoſculis exiguis. Baub. pin. 214.

Aſine verna glabra, ſoſculis albis, vel potius

Linum minimum. Baub. hiſt. 3. p. 455.

*Spergula bifolia, lini capitulis. Loef. pruff. 261.
t. 80.*

Purgeer-Vlas. Belg.

*Op vochtige plaatſen langs den Duinkant buiten
's Hage; overvloedig tuiſſchen Velfen en Bever-
wyk; ook in de Salker-waart by Campen.*

Pharm. LINI CATHARTICI berb.

Radiola.

287. *LINUM foliis oppoſitis, caule dichotomo, flo-
ribus tetrandris tetragynis. Sp. 402. n. 19. Gelr.
192. Fris. 147.*

*Radiola vulgaris ſerpillifolia. Raj. angl. 3. p. 161.
t. 15. f. 3.*

Polygonum minimum f. *Millegrana minima*. *Baub. pin.* 282. *Comm. boll.* 90. *Morif. hist.* 2. p. 593.
9. f. t. 29. f. 3.

Oed. dan. t. 187.

Aller kleinft Duizend-graau. Belg.

Op zandige plaatfen, en ook tuffchen de fteenen; veel in 't zand by de Steene-kamer tuffchen Harderwyk en Nykerk; en in Friesland omtrent Garyp en Dragten aan de kanten tuffchen het Koorn.

DROSEREA

288. *DROSEREA* scapis radicatis, foliis orbiculatis. *Sp.* 402. n. 1. *Gelr.* 193. *Frif.* 148.

Ros folis folio rotundo. *Baub. pin.* 357. *Comm. boll.* 98.

Rorida f. *Ros* folis major. *Lob. ic.* 811.

Zonne-dauw. Belg.

Op vochtige Hey-gronden tuffchen Dotichem en Selhem, by Uilenpas, Klein Luiking, en door de gansche Veluwe; op grasige heuveltjes by Naarden; aan de Bilt by Utrecht; by Bergum in Friesland; in 't Heide-veld by Harender-Moollen, ook in 't witte Veen tuffchen Haren en de Waterhuizen buiten Groningen.

Pharm. RORIS SOLIS herb.

Pastoribus Taxandriae invisa planta, quum ovium capita ex usu ejus subito intumescant, pecusque illud dehinc brevi ex hydropo moriatur.

Folia arida liquores igneo colore tingunt.

289. *DROSEREA* scapis radicatis, foliis ovali-oblongis. *Sp.* 403. n. 2. *Gelr.* 194. *Frif.* 149.

Ros folis folio oblongo. *Baub. pin.* 357. *Comm. boll.* 98.

Rorida f. *Solis ros* & *Drosion* recentiorum. *Lob. ic.* 811.

By de voorige; en zeer veel te Hulfen by Nymegen; ook by Gemert en Helmond in de Meyery van 's Bosch.

P O L Y G Y N I A.

M Y O S U R U S.

- minimus.* 290. MYOSURUS. Sp. 407. n. 1. Baub. hist. p. 512.
 Gelr. 195. Fris. 150.
 Holosteo affinis, Cauda muris. Baub. pin. 190.
 Comm. holl. 59.
 Cauda murina. Dod pempt. 112.
 Oed. dan. t. 406.
 Muizen-staart. Belg.
 Op vochtige zandige Velden buiten Harderwyk,
 Hattem, Naarden, Haarlem, Zwol, Fran-
 ker, Groningen, en elders in de voorzomer tus-
 schen 't jonge Koorn.

C L A S S I S VI.

H E X A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

G A L A N T H U S.

291. GALANTHUS. Sp. 413. n. 1.

*myalis.*Leucojum bulbosum trifolium minus. Baub. pin.
56.Leucojum bulbosum triphyllon. Dod. pempt. 230.
Naakte - Mannetjes, Naakte - Naarsjes, Vasten-
avond-zotjes. Vulgo.Groeit tans menigvuldig van zelfs in de afgebouwene
bosschen by Velsen.

N A R C I S S U S.

292. NARCISsus spatha uniflora, nectario campanu- *Pseudo-*
lato erecto crispo, æquante petala ovata. Sp. *Narcissus.*
414. n. 2.Narcissus sylvestris pallidus, calyce luteo. Baub.
pin. 52.

Narcissus luteus sylvestris. Dod. pempt. 227.

Geele Tydeloozen, Sporckelle. Belg.

Te Velsen by de voorgaande. (Ampl. D I. DEUTZ.)
en omtrent Zwol. (BRUMAN. Zuoll. 16.)

A L L I U M.

293. ALLIUM caule planifolio bulbifero, staminibus *carinatum.*
subulatis. Sp. 426. n. 13. Gelr. 197.

F 5

Al-

Allium montanum bicornne angustifolium, flore purpurascēte. *Baub. pin.* 74. *Morif. hist.* 2. p. 386. f. 4. t. 14. f. 5.
In de Salker-Waart.

vineale.

294. *ALLIUM* caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspīdatis. *Sp.* 428. n. 21. *Gelr.* 203. *Fris.* 151.

Allium campestre juncifolium capitatum purpureum majus. *Baub. pin.* 74. *Comm. boll.* 5.

Allium sylvestre tenuifolium. *Dod. pempt.* 683. *Lob. ic.* 156.

Wild- Look, Hond- Look. Belg.

In de Velden buiten Harderwyk, Zwol, Alkmaar; in de Duinen by 's Hage; aan 't eind van den grooten Hout buiten Haarlem, op de weg naar Heemstede; in Friesland op verjcheide plaatsen aan Wallen en in Boschen.

ursinum.

295. *ALLIUM* scapo nudo triquetro, foliis lanceolatis petiolatis, umbella fastigiata. *Sp.* 431. n. 29. *Fris.* 152.

Allium sylvestre latifolium. *Baub. pin.* 74. *Comm. boll.* 5.

Allium ursinum. *Cam. epit.* 330.

Das- Look. Belg.

In de Duinen by 's Hage; buiten Haarlem by 't Huis te Bredenrode agter Bloemendaal; veel omtrent Maarsen; en in Friesland by Balk en Wykel aan dykjes, en kanten van Koorlanden.

ORNITHOGALUM.

luteum.

296. *ORNITHOGALUM* scapo anguloso diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus. *Sp.* 439. n. 1. *Gelr.* 205.

Ornithogalum luteum. *Baub. pin.* 71.

Bulbus sylvestris. *Dod. pempt.* 222.

Oed. dan. t. 368.

Veld- Ajuin, Vogel- Melk. Belg.

In de Moeshoven by Harderwyk, en in de Koorlanden by Zwol.

minimum.

297. *ORNITHOGALUM* scapo angulato diphylo, pedunculis umbellatis ramosis. *Sp.* 440. n. 2.

Or.

Ornithogalum luteum minus. Baub. pin. 71.

Onder 't voorige, dog niet zoo veel.

Simillimum præcedenti, sed Petala acutiora.

298. *ORNITHOGALUM* floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus, filamentis basi dilatatis. *umbellatum.*

Sp. 441. n. 9. Gelr. 616.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium.

Baub. pin. 70. Comm. boll. 83.

Babus leucanthemos minor. Dod. pempt. 221.

Morgen-Sterren. Vulgo.

In de Fortificatien te Nymegen; in 't bosch van Clarenbeek by Arnhem; in 't Koorland te Hierden by Bas-buiten Harderwyk; in den Haaremmer-Hout; op de Graspaden van Zandhorst en Marquette in Kennemerland; langs de kleyweg tuschen Utrecht en Maarssen en by de Hofstede Vegtstroom; by den Voetangel aan den Amstel; ook omtrent Leeuwaarden, Zwol, en elders.

299. *ORNITHOGALUM* floribus secundis pendulis, nectario stamineo campaniformi. *nutans.*

Sp. 441. n. 10. Ornithogalum exoticum magno flore minoriinnato. Baub. pin. 70.

Ornithogalum neapolitanum. Clus. app. 2. p. 9. t. 9.

By Leiden op de booge Morsch en buiten de Hoogewoerds-poort aan den boogen Rbyn-dyk, en op andere plaatsen daar omtrent. (Hortulanus MEERBURG.)

Forsk. olim ex hortis aufuga: ante annum tamen 1771. quo primum Hortulanus MEERBURG hanc plantam offendit, nondum in Horto Academico Leydensi exstiterat.

Flores potius nutantes quam penduli dicendi.

A N T H E R I C U M.

300. *ANTHERICUM* foliis ensiformibus, filamentis *offisfragum.*

lanatis. Sp. 446. Fris. 53.

Narthecium. Moëbr. E. N. C. vol. VI. p. 389. t.

5 f. 1. Gelr. 204.

Pseudo-Asphodelus palustris anglicus. Baub.

pin. 29.

Asphodelus luteus palustris. Dod. pempt. 208. Fig. quoad habitum satis bona, descriptio imperfecta. Oed. dan. t. 42.

Geele Water - Affodillen. Belg.

Overvloedig buiten Harderwyk op de Gagel - Kamp by 's Heeren - Loo; in Friesland op Bergummer Heyde; en elders in de Wouden; ook zeer gemeen in de Veenen by Haren, en elders in de Provintie Groningen en Omlanden.

De hac planta S. PAULLI refert, quod, si pecoribus pabulo intermixta detur, noxam ipsis conciliet, atque ipsa eorum ossa inde emolliantur ita, ut pedibus insistere nequeant, unde illam vocat Gramen ossifragum Norvegicum. Verum nulla apud nos experientia constat, pecori ac seorsim ovibus morbum ex esu huius natum esse; neque floris odor manifeste virosus, ut LINNEO, sed semper gratus ac mel-litus mihi, ut MOEHRINGIO visus est.

A S P A R A G U S.

officinalis. 301. ASPARAGUS caule herbaceo tereti erecto, foliis setaceis, stipulis paribus. Sp. 448. n. 1. Gelr. 206. Asparagus sylvestris tenuissimo folio. Baub pin. 490. Comm. boll. 13.

Aspergie, Coraal - Kruid. Belg.

Op veele plaatsen in de Valeyen der Duinen buiten 's Hage agter Zorgvliet, Haarlem, Alkmaar, en in die van de Helder.

Pharm. ASPARAGI rad. bacc. sem.

C O N V A L L A R I A.

majalis. 302. CONVALLARIA scapo nudo. Sp. 451. n. 1. Gelr. 207. Fris. 154.

Lilium convallium album. Faub. pin. 304. Comm. boll. 67.

Lelie van den Dale, Lely Convaly, Zegeltjes. Belg. May - bloemen. Quibusdam.

In Gelderland op Schaffelaar by Barneveld, op Clarenbeek by Arnhem; in 't Haagse - Bosch; in de Haarlemmer - Hout; op Randenbroek by Amersfoort; in Friesland in Zwartzenburgs - Bosch, by Kuikhorne &c. buiten Groningen op de Mickelhorst op de Cingel en in 't Land
aan

aan de Westkant; en elders op schaduwachtige plaatsen.

Pharm. LILII CONVALLII flor.

303. CONVALLARIA foliis alternis amplexicauli ^{Polygonatum} bus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus sub-^{unifloris.} unifloris. Sp. 451. n. 3. Gelr. 209. Frgr. 50.

Polygonatum latifolium vulgare. Baub. pin. 303. Comm. boll. 90.

Polygonatum, vulgo Sigillum salomonis. Baub. bist. 3. p. 529.

Oed. dan. t. 377.

Salomons-Zegel. Belg.

Fontein-Kruid. Groninganis.

Motte met biggen Drenthinis.

f. Polygonatum latifolium, flore majore odoro. Baub. pin. 303.

In't Bosch by 't Huis de Else en Zuideras buiten Zutphen; in dat van Clarenbeek by Arnhem; in 't Klaverbosch en op Kortenbroek buiten Harderwyk; in't Haagse-Bosch; in de wildernis niet verre van't Huis te Bredenrode; in de Duinen even buiten Overveen by één met Effschen-boomen beplant Boschje; zeldzaam in de Haarlemmer-Hout; te Hardenbroek in 't Sticht van Utrecht; by Onnen en de Mickelhorst buiten Groningen; en elders op schaduwachtige plaatsen. . . Veel in de Duinen by Haarlem.

Pharm. POLYGONATIF. SIGILLI SALOMONIS rad. herb.

304. CONVALLARIA foliis cordatis, floribus tetra-^{bifolia.} dris. Sp. 452. n. 8. Gelr. 208. Fris. 155.

Unifolium. Dod. pempt. 205.

Lilium convallium minus. Baub. pin. 304. Comm. boll. 67.

Oed. dan. t. 152.

Een-blad. Belg.

In Gelderland by Ubbergen, Boedelhof, Uilenpas, en elders in de Bosschen; in 't Haagse-Bosch; in Friesland by het Oranje-Wout, en in een Boschje by Donkerbroek; in 't Cluvings-Bosch voor aan in 't Landschap Drenthe.

HY.

H Y A C I N T H U S.

- non scriptus* 305. HYACINTHUS corollis campanulatis sexpartitis apice revolutis. *Sp.* 453. *n.* 1.
 Hyacinthus, oblongo flore, cæruleus major. *Baub. pin.* 43.
 Hyacinthus non scriptus. *Dod. pempt.* 216.
Wilde Hyacinten. Belg.
In 't Haagse Bosch. (*Cel. SCHWENCKE.*) *In de Boschadien te Velsen.* (*Ampl. D. I. DEUTZ.*)
en te Haarlem in den Ouden - Hout.

A C O R U S.

- Calamus.* 306. ACORUS. *Sp.* 462. *n.* 1. *Gelr.* 210. *Fris.* 156.
 Acorus verus f. Calamus aromaticus officinarum.
Baub. pin. 34. *theatr.* 625. *Comm. boll.* 4.
 Acorum. *Cam. epit.* 5.
Calmus. Belg.
In de oude Graft te Doesburg; in de Berkel by Lochum; in de Slooten en Graften by Wageningen, Maurik, Oen, Welsum, Eiden, Veenendaal, en elders in Gelderland; in de Trekvaarten buiten Delft en 's Hage, tusschen Haarlem en Leiden; by Maarseeveen, Tienhoven in 't Sticht van Utrecht; ook in de Slooten omtrent Wyk by Duurstede; in natte laage moerassige landen en poelen omtrent Oostermeer, Oenkerk, Oudkerk, en elders in de Wouden in Friesland; in 't Horensche-diep, en in een oude Graft aan de Oostkant van Haren buiten Groningen.
 Pharm. ACORI f. CALAMI AROMATICI rad.

J U N C U S.

- acutus.* 307. JUNCUS culmo subnudo tereti mucronato, panicula terminali, involucro diphyлло spinoso. *Sp.* 463. *n.* 1.
 Juncus acutus, capitulis forghi. *Baub. pin.* 12. *theatr.* 174. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 163. *n.* 5.
 Juncus pungens sive acutus, capitulis forghi. *Baub. hist.* 2. *p.* 520. *Morif. hist.* 3. *p.* 232. *f.* 8. *t.* 10. *f.* 15.
 β. Juncus acutus maritimus anglicus. *Raj. hist.* 1303. *Morif. hist.* 3. *p.* 232. *f.* 8. *t.* 10. *f.* 14. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 163. *n.* 1.
Op het Koe gras by de Helder. (*Ampl. D. I. DEUTZ.*)
 308. JUN-

308. JUNCUS culmo nudo stricto, capitulo laterali. *conglomeratus*
Sp. 464. n. 2. Gelr. 617. f. 155.

Juncus laevis, panicula non sparsa. *Baub. pin. 12. theatr. 183. Boerb. lugdb. 2. p. 163.*

Op de Stads-Weide, en andere vochtige gronden omtrent Harderwyk.

309. JUNCUS culmo nudo stricto: panicula laterali. *confusus*.
Sp. 464. n. 3. Gelr. 215. Frisf. 157.

Juncus laevis, panicula sparsa, major. *Baub. pin. 12. theatr. 182. Comm. boll. 61.*

Juncus laevis. *Dod. pempt. 605.*

Onscherpe of Zagte Biezen. Belg.

Russchen Groningans.

Veel op vochtige koude gronden.

Nomen Groningantum convenit cum Anglico.

310. JUNCUS culmo nudo: apice membranaceo in-*inflexus*.
curvo, panicula laterali. Sp. 464. n. 4.

Juncus, acumine reflexo, major. *Baub. pin. 12. prodr. 22. Morisf. bist. 3. p. 233 f. 8. t. 10. f. 25. Boerb. lugdb. 2. p. 164. n. 2.*

f. Juncus acutus, panicula sparsa. *Baub. pin. 12. Comm. boll. 61.*

Tzer - Biezen. Belg.

In koude vochtige Weilanden.

311 JUNCUS culmo nudo, foliis setaceis, capitulis *squarrosus*
glomeratis aphyllis. Sp. 465. n. 7. Gelr. 214. Frisf. 158.

Gramen junceum maritimum. *Lob. ic. 18.*

Gramen junceum, foliis & spica junci. *Baub. pin. 5. theatr. 78. Morisf. bist. 3. p. 228. f. 8. t. 9. f. 13. Comm. boll. 50.*

Oed. dan. t. 430.

In 't Veen tusschen Uilenpas en Hummel in 't Graafschap Zutphen; te Hulsen by Nymegen; in de buitendykse landen aan de Ykant. In Friesland, menigvuldig in de Wouden.

Synonymum l. B. a COMMELINO additum pertinet ad Juncum bulbosum.

312. JUNCUS foliis nodoso-articulatis, petalis obtu-*articulatus*
lis. Sp. 465. n. 8. Gelr. 213. Frisf. 159.

v. Gra-

- α. Gramen junceum, folio articulato, aquaticum.
Baub. pin. 5. prodr. 12. theatr. 76. Comm. boll. 50.
- β. Gramen junceum folio articulato, cum utriculis.
Baub. prodr. 12. Scheuch. gram. 333.
- γ. Gramen junceum capsulis triangulis, cauliculis tenuibus, foliis ad nodos et panicularum divaricationes oblongis. *Raj. hist. 1307.*
- δ. Gramen junceum, capsulis triangulis, minimum.
Raj. hist. 1307. Moris. hist. 3. p. 227. f. 8. t. 9. f. 3.
- ε. Gramen junceum minimum, capitulis foliaceis.
Moris. hist. 3. f. 8. t. 9. f. 4.
- ζ. Gramen junceum, folio articulato, sylvaticum.
Baub. pin. 5. theatr. 75. Moris. hist. 3. p. 227. f. 8. t. 9. f. 1. Comm. boll. 50.
- α. Gemeen in natte Weilanden op veele plaatsen. β. Veel aldaar in den Herfst na den Hooityd. γ. Veel in de Weilanden by Rotterdam. δ. en ε. Overvloedig te Huisen by Nymegen in eene vogtige Weide onder de groote boomen; met de *Drosera longifolia*, *Carex dioica*, *pulicaris*, &c. ζ. Tusschen Franeker en klein Lancum in Sloots-wallen, en aan de Ryd-weg van Donkerbroek naar Makkinga; in de Zalliker-Waart in Overysfel, en te Overveen by Haarlem achter Rampen-Laan, aan het opgaan van de Duinen op donkere en vochtige plaatsen.

Varietas β ab insectis causatur. γ est vivipara, in qua loco florum variis in locis foliorum fasciculi nascuntur, adeoque diversa a varietate ε. optimeque describitur a RAJO. δ. et ε quandoque vix uncias duas altitudine aequat. ε utriculis differt a δ. sicuti β. ab α. Varietas ζ. sylvatica ab Jll. HALLERO pro distincta specie habetur, nec sine ratione, gaudet enim petalis obtusis, foliisque teretibus, cum aquatica α. β. γ. δ. ε. petala habent mucronata, foliaque magis compressa; adeoque differentia specifica ab Jll. LINNEO data soli ζ. convenit, aquaticis vero differentia specifica Funci nodosi. *Sp. 466. n. 9.*

caulosus.

313. JUNCUS foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. *Sp. 466. n. 10. Frisf. 160.*

Jun-

Juncus parvus cum pericarpis rotundis. *Baub. bist.* 2. p. 522. *quoad iconem, non vero synonyma.*
Gramen junceum polytachion. C. B. *Comm. boll.* 50.

Gramen junceum, junci sparsa panicula. *Morif. bist.* 3. p. 227. f. 8. t. 9. f. 11. opt.

Gesn. Schmied. 12. t. 5. f. 13. *Oed. dan. t.* 431.

In de Waterachtige Hooilanden, aan de kanten van de Haarlemmer-Meyr, by den Overtoom; en van de Maas by Rotterdam; in Friesland zoo wel op de Klei als in de Wouden, in natte laagten en aan de kanten der Slooten.

314. *JUNCUS culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus.* *Sp.* 466. n. 11. *Gelr.* 212. *Frif.* 161. *Lufonius.*

Holosteum. *Lob. ic.* 18.

Gramen nemorosum, calyculis paleaceis. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 100. *Comm. boll.* 53. *Morif. bist.* 3. p. 228. f. 8. t. 9. f. 14.

Padde-Gras. Belg.

Op vochtige Moschachtige plaatsen in Gelderland, Utrecht, Overysfel; in de Duin-Valeyen in Holland; in de Wouden aan de kanten van Koornvelden, en vochtige gruppels in Friesland.

315. *JUNCUS foliis planis pilosis, corymbo ramoso.* *pilosus.* *Sp.* 468. n. 15. *Frif.* 162.

Gramen nemorosum hirsutum latifolium majus. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 101. *Morif. bist.* 3. p. 225. f. 8. t. 9. f. 1.

Oed. dan. t. 441.

β. *Gramen hirsutum latifolium minus.* *Baub. theatr.* 102.

Hairig of Ruig Bosch-Gras. Belg.

In Friesland in de Wouden, en op de Kley in de Boffchen.

316. *JUNCUS foliis planis subpilosis, corymbis folio brevioribus, floribus fasciculatis.* *Sp.* 468. n. 16. *niveus.*

Gramen hirsutum angustifolium minus, paniculis albis. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 106. *Morif. bist.* 3. f. 8. t. 9. f. 39.

Op de Heide by Nymegen. (D. RAINVILLE.)

98 HEXANDRIA MONOGYNIA.

- campestris.* 317. *JUNCUS* foliis planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque. *Sp.* 468. *n.* 17. *Gelr.* 211.
Gramen hirsutum, capitulis psyllii. *Baub. pin.* 7.
theatr. 103. *prodr.* 15. *Comm. boll.* 53. *Morif. hist.* 3. *p.* 225. *f.* 8. *t.* 9. *f.* 4.
Klein Hairig - Gräs. Belg.
In den Enck by Harderwyk; op het groote Veld aan den Haarlemmer - Hout, en in de Weilanden omtrent Zwol.

B E R B E R I S.

- vulgaris.* 318. *BERBERIS* pedunculis racemosis. *Sp.* 471. *n.* 1.
Berberis dumetorum. Baub. pin. 454. *Comm. boll.* 15.
Spina acida sive Oxyacantha. Dod. pempt. 750.
Berberisse. Belg.
Op de Velfer - Heide; in de Duinen by Overveen, en buiten 's Gravenhage naar Wassenaar; aan de Heereweg by Haren, en by de Mickelhorst buiten Groningen.
Pharm. BERBERIDIS bacc. sem. succ.

P E P L I S.

- Portula.* 319. *PEPLIS* floribus apetalis. *Sp.* 474. *n.* 1. *Fris.* 163.
Glaux aquatica, folio subrotundo. Loef. pruss. 106. *t.* 20.
Alfine palustris minor serpillifolia. Baub. pin. 251. *prodr.* 118.
Oed. dan. t. 64.
In menigte langs 't Maasstrand achter 's Gravezande; in natte gruppels en stilstaande Slooten omtrent 't Wyfel, Augustinisga, Ureterp en Sygerswolde in Friesland; te Heemze in Overysfel; en elders.
Frequentissime apetala est.

T R I G Y N I A.

R U M E X.

- Sanguin.* 320. *RUMEX* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Sp.* 476. *n.* 2. *Gelr.* 218.

La-

Lapathum folio acuto rubente. *Baub. pin. 115.*

Comm. boll. 64.

Lapathum rubens. *Dod. pempt. 650. Cam. epit. 229.*

Bloed-kruid, Draken-bloed. Belg.

Komt van zelfs voort in de Moes-boven.

Pharm. LAPATHI SANGUINEI rad.

321. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *crispus.*

Sp. 476. n. 3. Fris. 164. Gelr. 219. B.

Lapathum folio acuto crispo. *Baub. pin. 115.*

Lapathum acutum crispum. *Tabern. ic. 436.*

β. Lapathum folio longissimo crispo. *Boerb. lugdb. 2. p. 85. n. 10.*

Op veele plaatsen aan wallen en wegen.

322. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis: subunica granifera, foliis radicalibus panduriformibus. *pulcher.*

Sp. 477. n. 6.

Lapathum ramis procumbentibus, feminis involucro dentato, foliis inferioribus instar fidium.

Morif. bist. 2. p. 580. Boerb. lugdb. 2. p. 85. n. 6.

Lapathum pulchrum bononiense sinuatum. *Baub.*

bist. 2. p. 988. Raj. bist. 1. p. 174.

† *Volgens BOERHAAVE.*

323. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminate. *acutus.*

Sp. 478. n. 11. Gelr. 217. Fris. 165.

Lapathum folio acuto plano. *Baub. pin. 115.*

Lapathum acutum f. Oxylapathum. *Baub. bist. 2. p. 85.*

Patigb of Peerdick. Belg.

Zuiker wortel in de Dortsche en Krimpener-Waarden.

Koesen, Koesjes-bladen, Leeken. Rusticis, quo nomine & reliqua Lapatha appellant.

Ridders Groningans.

β. Lapathum minimum. *Baub. pin. 115. Comm. boll. 64.*

Veel op vochtige zandige gronden. β. Op steenachtige en dorre gronden.

Pharm. LAPATHI ACUTI rad. herb.

324. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis den- *obtusius.*

tatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenulatis. *Sp.* 478. *n.* 12. *Fris.* 166.

Lapathum sylvestre, folio subrotundo, seminis involucris dentatis. *Morif. hist.* 2. p. 580. *Boerb. lugdb.* 2. p. 85.

Lapathum folio minus acuto. *Baub. pin.* 111. *Comm. boll.* 64.

Lapathum. *Cam. epit.* 228.

Overvloedig op zandige gronden, en in de Moes-boven buiten Haarlem, Zwol, Franeker, &c.

aquaticus. 325. *RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis.* *Sp.* 479. *n.* 14. *Gelr.* 219. *Fris.* 197.

Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Baub. pin.* 116. *Comm. boll.* 63.

Hippolapathum. *Dalech. hist.* 604. *Cam. epit.* 232.

Herba britannica. *Munt. brit.* t. 1.

Groot Water-Patigh. Belg.

Water-Ridders. Groninganis.

8. *Lapathum aquaticum minus.* *Baub. pin.* 116. *Baub. hist.* 2. p. 987. *Comm. boll.* 64.

Klein Water-Patigh. Belg.

Aan de kanten der Slooten en Graften op veele plaatsen. 8. Veel aan de kanten der Slooten en Beekjes buiten Haarlem, Utrecht, Zwol, en elders.

Pharm. LAPATHI AQUATICI rad.

Cl. BOEHMER flor. lips. 576. *varietatem. β. pro distincta specie habet.*

terrestris. 326. *RUMEX floribus hermaphroditis, foliis cordato-hastatis, caule tereti.* *Sp.* 480. *n.* 20.

Acetosa rotundifolia hortensis. *Baub. pin.* 114.

Morif. hist. 2. p. 583. *f. 5. t. 28. f. 9.*

Oxalis rotundifolia. *Dod. pempt.* 649.

Spaansche-Zuuring. Vulgo.

Overvloedig aan de Muur van 't Huis te Bronkhorst in 't Graafschap Zutphen.

Acetosa. 327. *RUMEX floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis.* *Sp.* 483. *n.* 24. *Gelr.* 220. *Fris.* 168.

Acetosa pratensis. *Baub. pin.* 114. *Comm. boll.* 4.

Oxalis vulgaris, folio oblongo. *Baub. hist.* 2. p. 989.

Veld.

- Veld. Zuuring of Zurkel. Belg.*
Veel in de Weilanden.
 Pharm. ACETOSA Rad. herb. sem.
328. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. *Sp.* 481. n. 25. *Gelr.* 221. *Jngr.* 54. *Fris.* 169. *Acetofella.*
Acetosa arvensis lanceolata. Baub. pin. 114. *Comm. boll.* 4.
Oxalis ovina. Tabern. ic. 440.
Schaaps - Zuuring of Zurkel. Belg.
 6. *Acetosa lanceolata angustifolia repens. Baub. pin.* 114. *prodr.* 55.
Veel op hooge zandige Velden en Zaai-landen. β. Te Heemze in Overysfel.

T R I G L O C H I N.

329. TRIGLOCHIN capsulis trilocularibus sublinearibus. *Sp.* 482. n. 1. *Gelr.* 222. *Fris.* 170. *calustre.*
Gramen junceum spicatum, sive Triglochin. Baub. pin. 6. *theatr.* 81. *Comm. boll.* 51.
Oed. dan. t. 411.
Nier-Gras, Zee-Gras met airen. Belg.
By de Waterkanten op den Hack en 't Nieuwe-land achter 's Gravezande; aan de Duinen van Heemstede; in de Wei-landen by Haarlem, Zandhorst; ook zeer gemeen in die van de Provincien Friesland en Groningen.
330. TRIGLOCHIN capsulis sexlocularibus ovatis. *maritimum.*
Sp. 483. n. 2. *Gelr.* 223. *Fris.* 171.
Gramen spicatum alterum. Eaub. pin. 6. *theatr.* 82. *Comm. boll.* 51.
Oed. dan. t. 306.
By 't voorige op veel plaatsen, en aan de Zee-kant by de Beeken buiten Harderwyk.

P O L Y G Y N I A.

A L I S M A.

331. ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtusis. *Plantago.*
trigonis. Sp. 486. n. 1. *Gelr.* 224. *Fris.* 172.
 G 3 *Plan-*

Plantago aquatica latifolia. Baub. pin. 19. Comm. boll. 88.

Plantago aquatica. Cam. epit. 264.

Oed. dan. t. 561.

Water - Weegbree. Belg.

In stilstaande zoete Wateren en Slooten op veele plaatsen.

ranunculoides. 332. *ALISMA foliis lineari-lanceolatis, fructibus globofo - squarrosis. Sp. 487. n. 6. Gelr. 225.*

Fris. 173.

Plantago aquatica angustifolia. C. B. Comm. boll. 89.

Plantago aquatica humilis angustifolia. Baub. hist. 3. p. 788. Lob. ic. 300.

Oed. dan. t. 122.

Klein Water - Weegbree. Belg.

Klein Lepelblad. Groningans.

Overvloedig in de Trekvaart tusschen Haarlem, Leiden en Utrecht; by en in Water-plaatsen, en uitgeveende en andere moerige landen in Friesland omtrent Tjetjerk, Hardegaryp, Bergum &c. in de Slooten en Griffen tusschen Deventer en Zwol; in de Slooten langs den dyk tusschen Haren en de Waterhuizen buiten Groningen.

Synonymum C. Baub. est varietas Alismatis Plantaginis.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

ÆSCULUS.

333. ÆSCULUS floribus heptandris. Sp. 488. n. 1. *Hippo-Castanea*.
Gelr. 226.

Castanea folio multifido. *Baub.* pin. 419. *Clus.*
bist. 1. p. 7.

Castanea equina, folio multifido. *Baub.* *bist.* 1.
 p. 128.

Paarde-Castanie-boom. Belg.

Veel in de Steden, en by Adelyke Huizen.

Pharm. CASTANEE EQUINÆ fruct.

Incola est Asia septentrionalis, indeque Ao. 1550.
in Europam translata, ubi hodie vulgaris. Cetero-
quin nulla hujus Classis planta apud nos indigena.

C L A S S I S VIII.

O C T A N D R I A

M O N O G Y N I A.

O E N O T H E R A.

- biennis.* 334. *OENOTHERA* foliis ovato-lanceolatis planis,
 caule muricato-villoso. *Sp.* 492. n. 2. *Gelr.*
 229.
Lyfimachia lutea corniculata. *Baub.* pin. 245.
Comm. holl. 70. *Moris. hist.* 2. p. 271. f. 3. t.
 11. f. 7.
Hyoscyamus virginianus. *Alp. exot.* 325. t. 324.
Oed. dan. t. 416.
Geboornde geele Wederik. Belg.
St. Teunis-bloem. Vulgo.
Overvloedig op Karmelstein te Lienden in de Betu-
we; in de Fortificatien om Zutphen; op Uilen-
pas; by Emaus of Bloembleek buiten Arnhem;
op de Kerke-Kamp buiten Harderwyk; en in de
Duinen op veele plaatsen.

E P I L O B I U M.

- angustifoli-* 335. *EPILOBIUM* foliis sparsis lineari-lanceolatis,
um. floribus inæqualibus. *Sp.* 493. n. 1. *Gelr.* 230.
Fris. 174.
Lyfimachia Chamænerion dicta angustifolia. *Baub.*
pin. 245. *Comm. holl.* 70.
Oed. dan. t. 289.
Aan de kanten der Graften en Slooten op schaduw-
ach-

achtige plaatsen.

336. *EPILOBIUM* foliis oppositis lanceolatis ferratis *hirsutum*.
decurrenti - amplexicaulibus. *Sp.* 494. n. 3.

Gelr. 231. *Frgr.* 57. *Fris.* 175.

Lyfimachia filiquosa hirsuta, magno flore. *Baub.*
pin. 245. *Comm. boll.* 70. *Morif. bist.* 2. p. 270.
f. 3. *t.* 11. *f.* 3.

Oed. dan. t. 326.

Als de voorguande.

337. *EPILOBIUM* foliis oppositis ovatis dentatis. *Sp. montanum*.
494. n. 4. *Gelr.* 232.

Lyfimachia filiquosa glabra major. *Baub pin.*
245. *Comm. boll.* 70.

Pseudo-Lyfimachium purpureum primum. *Dod.*
pempt. 85.

Op vochtige zandgronden by Harderwyk, Haarlem,
Utrecht, Zwol, en elders; in de Duinen by 's Ha-
ge; in de Boffchen by Leeuwaarden en Franeker;
aan de kanten van Graften en Slooten by Haren
buiten Groningen.

338. *EPILOBIUM* foliis lanceolatis denticulatis: imis *tetragonum*
oppositis, caule tetragono. *Sp.* 494. n. 5.

Lyfimachia filiquosa glabra minor. *Baub. pin.* 303
Comm. boll. 70.

Lyfimachia minor. *Tabrn. ic.* 854.

In de vochtige Duin valeyen. (COMM.)

339. *EPILOBIUM* foliis oppositis lanceolatis integer- *palustre*.
rimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Sp.*
495. n. 6. *Gelr.* 233. *Fris.* 176.

Lyfimachia filiquosa glabra angustifolia. *Baub.*
pin. 245.

Oed. dan. t. 347.

In de Sytel by Harderwyk; in de Nunspeeter-
beek tuffchen Harderwyken Elburg; in de Veen-
landen by de Wildervank, by Haren; in de
Pekelder-Veenen, en elders in de Provintie Gro-
nningen; ook in de Hoven tuffchen het geboomte op
veele plaatsen.

340. *EPILOBIUM* foliis oppositis ovato-lanceolatis *alpinum*.
integerrimis, filiquis sessilibus, caule repente.

G 5

Sp.

Sp. 495. *n.* 7. *Fris.* 177.

Chamænerion alpinum, alpinæ foliis. *Scheuch.*
alp. 132. 332.

Oed. dan. t. 322.

Aan ruige Wallen omtrent Baccaveen en Sygers-
Wolde in Friesland. (MEESE.)

C H L O R A.

perfoliata. 341. *CHLORA* foliis perfoliatis. *Syst. edit.* 13. *p.* 299.

Gentiana perfoliata. *Sp.* 335. *n.* 28.

Centaurium luteum perfoliatum. *Baub. pin.* 278.

Moris. bist. 2. *p.* 565. *f.* 5. *t.* 26. *f.* 1. 2.

Veel omtrent de Stad Brielle, en op Staalduin bui-
ten 's Hage.

V A C C I N I U M.

Myrtillus. 342. *VACCINIUM* pedunculis unifloris, foliis ferra-
tis ovatis deciduis, caule angulato. *Sp.* 498. *n.*
I. Gelr. 236. *Fris.* 178.

Vaccinia. *Dod. pempt.* 768.

Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigrican-
te. *Baub. pin.* 470. *Comm. boll.* 116.

Bosch-bessen, Wald-bessen, Kraakel-beziën, Postel-
beziën. Belg.

Bleeken. Groninganis.

Overvloedig in de meeste Bosschen op de Veluwe ;
in 't Bosch by Amerongen in 't Sticht van
Utrecht ; in Friesland by het Heereveen, Drag-
ten, Gorradyk, &c. op 't witte Veen by Haren,
en op 't Heyde-veld by Haarender-moolen buiten
Groningen.

uliginosum. 343. *VACCINIUM* pedunculis unifloris, foliis inte-
gerrimis obovatis obtusis lævibus. *Sp.* 499. *n.* 3.
Ingr. 58.

Vitis idæa foliis subrotundis exalbidis. *Baub. pin.*
470.

Vitis idæa II. Clus. bist. 1. *p.* 61. *t.* 62.

Oed. dan. t. 321.

Stronk-beziën. Varseveldensibus.

Overvloedig in 't Veen by Varseveld in 't Graaf-
schap Zutphen.

Floret Junio.

Bac-

Baccæ in aliis fruticibus ovatæ, in aliis tetragonæ.
Hæ baccæ Russorum palato placent, sed largius co-
mestæ capitis dolorem inferunt, unde ipsis FIANI-
ZA id est ebrîæ audiunt.

344. *VACCINIUM* racemis terminalibus nutantibus, *Vitis idæa.*
 foliis obovatis revolutis integerrimis subtus
 punctatis. *Sp. 500. n. 10. Gelr. 237. Fris. 179.*
Vaccinia rubra. Dod. pempt. 770.
Vitis idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis
rubris. Baub. pin. 470.
Oed. dan. t. 40.
Roode Kraakel-bezien. Belg.
Vosse-bessen. Rusticis Velaviæ.
Aan het Elspeeter, Wifelse, Sourensche en andere
Boschen op de Veluwe; ook by 't Vaccinium Myr-
tillus in Friesland en buiten Groningen.
 III. *HALLERUS* (*Bibl. bot. tom. 2. p. 309.*) mira-
 tur plantam hanc in *Gelria*, regione maritima,
 habitare; ast *sylvæ illæ satis longe a mari dissitæ*
sunt.

345. *VACCINIUM* foliis integerrimis revolutis ovatis, *Oxycoctos.*
 caulibus repentibus filiformibus nudis. *Sp. 500.*
n. 11. Gelr. 602. Fngr. 59.
Vaccinia palustris. Dod. pempt. 770.
Vitis idæa palustris. Baub. pin. 471. Comm. boll.
116.
Oed. dan. t. 80.
Veen-bessen, Kroosfen. Belg.
In 't Veen tusschen Hummel en Uilenpas; in de
Veenen by Meydrecht, Groningen, en elders.

E R I C A.

346. *ERICA* antheris aristatis, corollis campanulatis *vulgaris.*
 subæqualibus, calycibus duplicatis, foliis op-
 positis sagittatis. *Sp. 501. n. 1. Gelr. 235. Fris.*
180.
Erica vulgaris glabra. Baub. pin. 485. Comm. boll.
34.
Heide. Belg.
 3. *Erica vulgaris glabra, flore albo. Tourn. inf. 602.*
Overvloedig op de Veluwe; buiten Naarden, Amers-
foort; en door de gebeele Woud-kant in Fries-
land. 347. E-

- arborea.* 347. *ERICA* antheris aristatis, corollis campanulatis, stylo exserto, foliis ternis, ramulis incanis. *Sp.* 502. n. 9. *Gelr.* 618.
Erica maxima alba. *Baub.* pin. 485. *Comm. boll.* 34.
Erica coris folio I. *Clus. hist.* 1. p. 41.
Veel op de booge Veluwe.
- Tetralix* 348. *ERICA* antheris aristatis, corollis ovatis, stylo incluso, foliis quaternis ciliatis, floribus capitatis. *Sp.* 502. n. 8. *Gelr.* 234. *Fris.* 181.
Erica ex rubro-nigricans scoparia. *Baub.* pin. 486.
Erica brabantica, folio coridis hirsuto quaterno.
Baub. hist. 1. p. 358.
Oed. dan. t. 81.
Dop-Heide, Fyne Heide. Vulgo.
Overvloedig op de Veluwe, en in 't Graaffschap
Zutphen, ook in Friesland en buiten Groningen
op vochtige Hei-gronden.
Corolla est plerumque purpurea, nonnumquam alba
reperitur.
- cinerea.* 349. *ERICA* antheris cristatis, corollis ovatis, stylo subexserto, foliis ternis, stigmate capitato. *Sp.* 501. n. 4.
Erica humilis, cortice cinereo, arbuti flore. *Baub.* pin. 486. *Comm. boll.* 34.
Erica coris folio VI. *Clus. hist.* 1. p. 43.
Oed. dan. t. 38.
Buiten Naarden, en voorby de Bilt buiten Utrecht
aan 't opgaan van de Heide.
- mediterranea.* 350. *ERICA* antheris mucicis exsertis, corollis ovatis, stylo exserto, foliis quaternis patentibus, floribus sparsis. *Mant.* 229.
Erica maxima purpurascens, longioribus foliis.
Baub. pin. 485. *Comm. boll.* 34.
Erica coris folio II. *Clus. hist.* 1. p. 42.
Erica foliis corios quaternis, flore purpurascente.
Baub. hist. 1. p. 356.
Op veele plaatsen op de Veluwe, als ook buiten
Utrecht, Amersfoort, en Zwol.
Olim Ericam multifloram LINN. probac planta habui
ob synonyma hujus eo relata, & baud conveniens
nomen triviale huic datum.

D A P H N E.

351. *DAPHNE* floribus sessilibus ternis caulinis, foliis *Mezerium*.
 lanceolatis deciduis *Sp.* 509. *n.* 1.
 Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis
 Laureola fœmina. *Baub. pin.* 462.
 Chamelæa germanica. *Dod. pempt.* 364.
 Peper-boompje. Vulgo.
 Overvloedig in 't *Bojch* by 't *Huis de Eese*, en in 't
Klembroekse-Bosch by *Olthuisen aan de Toldyks-*
straat in 't Graaffschap Zutphen.
 Pharm. MEZERÆI bacc.

T R I G Y N I A.

P O L Y G O N U M.

352. *POLYGONUM* caule simplicissimo monostachyo, *Bistorta*.
 foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Sp.* 516.
n. 2.
 Bistorta major, radice minus intorta. *Baub. pin.*
 192. *Comm. boll.* 16.
 Bistorta. *Cam. epit.* 683.
 Oed. dan. t. 421.
 Nater - wortel, Slangen - wortel, Adder - wortel,
 Harts - tong met bloemen. Belg.
 Op *Essenburg* by *Harderwyk*; aan den *Dyk tusschen*
Muiden en Weesp; te *Neer-Langbroek in 't*
Sticht van Utrecht; aan de *Westkant van de*
Mickelhorst aan 't Poppe-laantje buiten Gronin-
gen.
 Pharm. BISTORTÆ rad.
353. *POLYGONUM* floribus pentandris semidigynis, *amphibium*.
 spica ovata. *Sp.* 517. *n.* 6. *Gelr.* 238. *Frng.* 61.
Fris. 182.
 Potamogeton salicis folio. *Baub. pin.* 93. *Comm.*
boll. 93.
 Potamogeton. *Dod. pempt.* 582.
 Oed. dan. t. 282.
 Fontein - kruid. Belg.
 Roowillig. Quibusdam.
 f. Persicaria foliis salicinis. *Comm. boll.* 86.

Aan

Aan de kanten van en in stilstaande zoete Wateren en Vyvers, veel by Harderwyk en Twello op de Veluwe, en elders. β. In de Weiden by Harderwyk, Haarlem, Utrecht, &c.

Mire variat hæc planta a loco; in aquis si crescat, stamina semper corolla breviora sunt.

Hydropiper 354. *POLYGONUM* floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *Sp.* 517. *n.* 9. *Gelr.* 239. *Jagr.* 61. *Fris.* 183.

Persicaria urens f. *Hydropiper*. *Baub.* pin. 101. *Comm. boll.* 87.

Hydropiper. *Dod. pempt.* 607.

Water - Peper. Belg.

Veel op vochtige zand gronden, en in de Slooten langs de Weiden.

Pharm. PERSICARIÆ ACRIIS f. *URENTIS* herb.

Persicaria. 355. *POLYGONUM* floribus hexandris digynis, spicis ovata-oblongis; foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. *Sp.* 518. *n.* 10. *Gelr.* 240. *Jagr.* 61. *Fris.* 184.

Persicaria mitis. *Baub. hist.* 3. p. 779.

Persicaria mitis maculosa & non maculosa. *Baub.* pin. 101. *Comm. boll.* 86.

Persik - Kruid, Wilde - Wilge. Belg.

Rits. Rusticis.

β. *Persicaria mitis, floribus candidis.* *Tourn. inst.* 509.

γ. *Persicaria minor.* *Baub. pin.* 101. *Comm. boll.* 87. *Morif. hist.* 2. p. 589. f. 5. t. 29. f. 5.

Veel by de Wegen, en in de Hoven, en Bouwlanden.

Pharm. PERSICARIÆ herb.

cyticulare. 356. *POLYGONUM* floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Sp.* 519. *n.* 15. *Gelr.* 241. *Fris.* 185.

Polygonum latifolium. *Baub. pin.* 281. *Comm. boll.* 90.

Polygonum f. *Centipodia.* *Baub. hist.* 3. p. 374. *Weg - gras, Kreupel - gras, Varkens - gras, Duizend - knoop.* Belg.

β. *Polygonum brevi angustoque folio.* *Baub. pin.* 281.

γ. Po-

- γ. *Polygonum oblongo angusto folio.* *Baub. pin.* 281.
 δ. *Polygonum angustis foliis, calycibus purpurascens.* *Dill. giff. app.* 65.
Veel by de Wegen, en op ruwe plaatsen.
 Pharm. *POLYGONI herb.*

357. *POLYGONUM foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtusatis.* *Sp.* 522. n. 25. *Gelr.* *Convolvulus.*
 242. *Fris.* 187.
Convolvulus minor, semine triangulo. *Baub. pin.*
 295. *Comm. boll.* 28.
Convolvulum nigrum. *Dod. pempt.* 396.
Zwarte Winde, Wilde Boekweit. Belg.
In Bouwlanden, Moeshoven, en Heggen.

C L A S S I S IX.

E N N E A N D R I A.

H E X A G Y N I A.

B U T O M U S.

umbellatus. 358. BUTOMUS. *Sp.* 582. *n.* 1. *Gelr.* 244. *Fris.* 188.
Juncus floridus major. *Baub. pin.* 12. *Comm. holl.*
 61.

Gladiolus aquatilis. *Dod. pempt.* 600.

Water - Lisch. Belg.

Zwaane - bloem. Vulgo.

β. *Butomus flore albo.* *Tourn. inst.* 271. *Boerb. lugdb.*
 1. p. 299.

γ. *Butomus flore saturate purpureo.* *Boerb. lugdb.* 1.
 p. 299.

*Aan de kanten der Slooten en Graften op veele
 plaatsen.*

C L A S S I S X.

D E C A N D R I A

M O N O G Y N I A.

M O N O T R O P A.

359. MONOTROPA floribus lateralibus octandris : *Hypopitys*.
terminali decandro. *Sp.* 555. n. 1.

Orobanche quæ Hypopitys dici potest. *Baub. pin.*
88. *prodr.* 34.

Orobanche Hypopitys lutea. *Mentz. pug.* 3. f. 2.

Orobanche flore brevior duplici, verbasculi
odore. *Morif. bist.* 3. p. 504. f. 12. t. 16. f. 20.

Oed. dan. t. 232.

In het Dennen-bosch by Uilenpas in 't Graaffschap
Zutphen.

Legi dicto loco hanc plantam florentem mense Julio
1777. *Characterem genericum optime descripsit*
Cel. DILLENIIUS nov. gen. p. 134. t. 7. *Num-*
rum autem petalorum & staminum in hac planta
sæpe variare recte notarunt Cl. WILlich obs. p.
37. & *Ill. HALLERUS flor. helv. 1. p.* 427.

A N D R O M E D A.

360. ANDROMEDA pedunculis aggregatis, corollis *Polifolia*.
ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis.

Sp. 564. n. 5.

Polifolia. Buxb. cent. 5. p. 28. t. 55. f. 1.

Erica humilis, rosmarini foliis, unedonis flore,
capsula cistoide. Pluk. alm. 136. t. 175. f. 1.

H

Op

Op vochtige plaatsen te Zuideras, in 't Graaffschap Zutphen.

Pedunculi apud nos communiter uniflori, uti in Linn. Lapp. t. 1. f. 2.

P Y R O L A.

rotundifolia 361. PYROLA staminibus adscendentibus, pistillo declinato. *Sp. 567. n. 1.*

Pyrola rotundifolia major. Baub. pin. 191. Comm. holl. 94.

Pyrola. Dod. pempt. 138.

Oed. dan. t. 110.

Winter-groen. Belg.

Overvloedig in de Duin-valeyen van Holland en Zeeland; ook in 't Bosch op Uilenpas; en by Bergum in Friesland.

Pharm. PYROLÆ herb.

uniflora. 362. PYROLA scapo unifloro. *Sp. 558. n. 6. Jngr. 66.*

Pyrola rotundifolia minor. Baub. pin. 191. Boerb. lugdb. 1. p. 278.

Pyrola minima alpina. Baub. hist. 3. p. 536.

Oed. dan. t. 8.

† *Juxta BOERHAAVIUM, a me in Belgio non visa, sed copiose in sylvis vastissimis Russiæ.*

D I G Y N I A.

S A X I F R A G A.

tridactylites. 363. SAXIFRAGA foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso. *Sp. 578. n. 32. Gelr. 247.*

Sedum tridactylites tectorum. Baub. pin. 285. Comm. holl. 104. Moris. hist. 3. p. 479. f. 12. t. 9. f. 31.

Paronychia altera. Dod. pempt. 113.

Veel op vochtige gronden en oude muuren te Deutchem, Harderwyk, Hattem, Haarlem, Utrecht, en elders; overvloedig in de Duinen by Overveen.

364. SAX-

364. SAXIFRAGA foliis caulinis linearibus integris *hypnoides*.
 trifidisve, stolonibus procumbentibus, caule
 erecto nudiusculo. *Sp.* 579. *n.* 37. *Gelr.* 248.
Sedum alpinum trifido folio. *Baub. pin.* 284. *Morif.*
bist. 3. *p.* 479. *f.* 12. *t.* 9. *f.* 26.
Oed. dan. t. 348.
Op de Heide tusschen Harderwyk en Ermello.

S C L E R A N T H U S.

365. SCLERANTHUS calycibus fructus patulis. *Sp. annuus.*
580. n. 1. Gelr. 246.
Knawel. Dod. pempt. 115.
Polygonum angustissimo & acuto, vel gramineo
folio, minus repens. Baub. pin. 281. Comm.
boll. 90.
Oed. dan. t. 504.
Engelsche - Steenbreek. Belg.
 β. *Polygonum gramineo folio, majus erectum. Baub.*
pin. 281.
In de zandige Koorlanden by Harderwyk, Haarlem,
Alkmaar; ook in de Duinen; als mede in 't zand
by Groningen.
Magna varietas in hac planta a loco. Vid. Dill. giff.
87. 236. & Linn. b. Cliff. 166.
366. SCLERANTHUS calycibus fructus clausis. *Sp. perennis.*
580. n. 2.
Knawel incanum, flore majore, perenne. Raj.
angl. 3. p. 160. t. 5. f. 1.
Polygonum cocciferum. Baub. pin. 281.
Oed. dan. t. 563.
Overvloedig in de Duinen by 's Hage tusschen Bac-
kershagen en Langenhorst. (MEERBURG.)

G Y S O P H I L A.

367. GYSOPHILA foliis linearibus planis, caule di- *rigida.*
 chotomo, pedunculis bifloris, petalis emargi-
 natis. *Sp.* 583. *n.* 10.
Lychnis sylvestris minima, exiguo flore. Baub.
pin. 206. prodr. 103. Boerb. lugdb. 1. p. 214. n. 60.
Tunica minima. Dalech. bist. 1191.
 BOERHAAVIUS ut indigenam notat, LINNÆUS
 suspicatur in Belgio habitare.

S A P O N A R I A.

- officinalis.* 368. *SAPONARIA* calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Sp.* 584. *n.* 1. *Gelr.* 245.
Saponaria major lævis. *Baub.* *pin.* 206.
Saponaria vulgaris. *Cam. epit.* 152.
Oed. dan. t. 543.
Zeep-kruid. Belg.
 6. *Lychnis*, seu *Saponaria* flore pleno. *Tourn. inst.* 336. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 212. *n.* 36.
 7. *Lychnis Saponaria* concava anglica. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 212. *n.* 37.
Veel aan den Dyk te Ysendoorn, Tuil, en Waardenburg in de Betuwe, en te Wamel over Tiel; aan de Wegen by Zutphen en Doesburg; in 't Fosc van Clarenbeek by Arnhem; aan 't voetpad by den grooten Boeren-Hol buiten Cuilenburg; ook by Everdingen; buiten 's Hage langs den weg naar Scheveningen; aan den Duinkant buiten Haarlem by Overveen, en achter 't Huis te Bredenrode; ook tusschen Velsen en Beverwyk by de Hofstede Westerhout.
Pharm. SAPONARIÆ rad. herb.

D I A N T H U S.

- prolifer.* 369. *DIANTHUS* floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis obtusis muticis tubum superantibus. *Sp.* 587. *n.* 4.
Armeria prolifera. *Lob. ic.* 449.
Caryophyllus sylvestris prolifer. *Baub. pin.* 209.
Segu. ver. 26. *t.* 7. *f.* 1.
Oed. dan. t. 221.
Op Zuideras in 't Graafschap Zutphen; aan den Berg by Arnhem, en elders.
arenarius. 370 *DIANTHUS* caulibus subunifloris, squamis calycinis ovatis obtusis, petalis multifidis, foliis linearibus. *Sp.* 589. *n.* 13. *Gelr.* 619.
Caryophyllus sylvestris humilis, flore unico. *Baub. pin.* 209.
Armerius flos tertius. *Dod. pempt.* 176.
Wilde Duizend-Schoon. Belg.
In de Allee van den Kranenborg en elders by Zwol.

T R I G Y N I A.

C U C U B A L U S.

371. *CUCUBALUS* calycibus campanulatis, petalis di-^{baccifer.}
stantibus, pericarpis coloratis, ramis divarica-
tis. *Sp.* 592. n. 1. *Gelr.* 620.
Lychnanthus volubilis. *Gmel. act. petr.* 1759. vol.
xiv. p. 525. t. 17. f. 1.
Alfine scandens baccifera. *Baub. pin.* 250.
Alfine repens. *Dod. pempt.* 403.
In 't Bosch van den Uilenpas.
372. *CUCUBALUS* calycibus subglobosis glabris reti-^{Behen.}
culato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis
subnudis. *Sp.* 591. n. 2. *Fris.* 189.
Lychnis sylvestris, quæ Behen album vulgo.
Baub. pin. 205.
Papaver ipomeum. *Lob. ic.* 340.
Wit-Been of Behen. Belg.
*Aan de Stadswal te Franeker, en by het Heeren-
veen, op vochtige ruige plaatsen. (MEESE.)
Buiten Boemendaal by Haarlem gevonden door
Æg. de KOKER.*
373. *CUCUBALUS* floribus dioicis, petalis linearibus ^{Orites.}
indivisis. *Sp.* 591. n. 12.
Lychnis viscosa, flore muscoso. *Baub. pin.* 206.
Sesamoides magnum salmanticum. *Clus. bist.* 1.
p. 295.
Oed. dan. t. 518.
*In de Duinen by 's Hage dicht by Langenhorst, en
overvloedig buiten Haarlem by Bloemendaal, en
elders.*

S I L E N E.

374. *SILENE* petalis bifidis, floribus lateralibus se-^{nutans.}
cundis cernuis, panicula nutante. *Sp.* 596. n. 8.
Lychnis montana viscosa alba latifolia. *Baub. pin.*
205.
Lychnis viscosa, folio otitidis. *Loef. pruff.* 150. t. 40.
Oed. dan. t. 242.
β. *Ocymoides minus f. album.* *Dalech. bist.* 683.

In de Duinen by 's Hage en Catwyk. (MEERBURG.)
β. ook aldaar, en in de Duinen tusschen Velsen
en Beverwyk by de Hofstede Westerhout, en
daar omtrent (D. FABRICIUS SIX.)

Varietas β. folia multo angustiora habet, hinc pro
diversa specie recensita a Tournefortio.

conoides. 375. *SILENE calycibus fructus globosis acuminatis*
striis triginta, foliis glabris, petalis integris.
Sp. 598. n. 15.

Lychnis sylvestris latifolia caliculis turgidis striatis.
Baub. pin. 205.

Lychnis sylvestris flore albo, cauliculis striatis.
Comm. boll. 69.

Lychnis sylvestris 2. Clus. hist. 8. p. 288.

Langs den Weg van 't Kraayenest naar de Duinen.

pendula. 376. *SILENE calycibus fructiferis pendulis inflatis:*
angulis decem scabris. Sp. 599. n. 19.

Lychnis supina ficula, calyce amplissimo striato.
Tourn. inst. 336.

Viscago hirsuta ficula, lychnidis aquaticæ facie
supina. Dill. elth. 421. t. 312. f. 404.

In de Duinen by Catwyk en Noordwyk. (MEERBURG.)

Rarioribus Belgii stirpibus merito adnumeranda.

S T E L L A R I A.

nemorum. 377. *STELLARIA foliis cordatis petiolatis, panicula*
pedunculis ramosis. Sp. 603. n. 1. Gelr. 621.
Fris. 190.

Alfne altissima nemorum. Baub. pin. 251. Comm.
boll. 6. Moris. hist. 2. p. 550. f. 5. t. 23. f. 1.
Boerb. lugdb. 1. p. 208.

Oed. dan. t. 271.

Groote Bosch-Muur. Belg.

Wilde-Rogge. Groninganis.

Op schaduwachtige plaatsen by Uilenpas, Harder-
wyk, Haarlem, Alkmaar, Heerenveen, Oran-
jewoud; in 't Klaverbosch by Harderwyk;
overvloedig in 't Goreght buiten Groningen; en
elders.

foliosa. 378. *STELLARIA foliis lanceolatis ferrulatis, petalis*
bi-

bifidis. *Sp.* 603. n. 4. *Gelr.* 252. *Jngr.* 70.
Fris. 192.

Caryophyllus arvensis glaber, flore majore. *Baub.*
pin. 210. *Comm. boll.* 22.

Holosteum. *Lob. ic.* 46.

Oogentrooft - Gras. Belg.

Overvloedig in 't Klaverbosch by Harderwyk; in't
Haagse-Bosch; in den Haarlemmer-hout; in
de Salkerwaart; te Utrecht by de Malibaan; in
Friesland by het Oranjewoud; en elders.

379. *STELLARIA foliis linearibus integerrimis, flori-* *graminea.*
bus paniculatis. *Sp.* 604. n. 5. *Gelr.* 251. *Fris.*
193.

Caryophyllus arvensis glaber, flore minore. *Baub.*
pin. 210. *Comm. boll.* 22.

Gramen floridum minus. *Tabern. ic.* 232.

Klein Oogen-trooft-Gras. Belg.

In de Zaaï-landen, en ook by de voorgaande.

380. *STELLARIA foliis lanceolatis, petalis biparti-* *aquatica.*
tis, calycem longitudine æquantibus. *Pollich.*
palat. 429.

Alfine foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petio-
lis unifloris. *Hall. bist.* 881.

Alfine hyperici folio. *Vaill. par.* 9. *Tourn. inst.*
242. *Boerb. lugdb.* 1. p. 209. n. 12. *Lind. al-*
fat. 112.

Alfine aquatica, folio gratiolæ, stellato flore.
Dill. giff. 58.

† *Volgens BOERHAAVE.*

Hanc in LINNEANIS scriptis non reperi.

A R E N A R I A.

381. *ARENARIA foliis ovatis acutis carnosiss.* *Sp. peploides.*
605. n. 1. *Gelr.* 622. *Fris.* 194.

Alfine littoralis, foliis portulacæ. *Baub. pin.* 251.

Alfine maritima, foliis portulacæ. *Loef. pruss.*
12. t. 2.

Anthyllis maritima lentifolia. *Baub. pin.* 282.
Comm. boll. 11.

Zee-Porcelyn. Vulgo.

Veel aan 't Zee-strand by Harderwyk; in de Dui-
nen agter Bergen en Wummenum buiten Alk-

maar, en op verscheide andere plaatsen; in Friesland by Koebool, Dyks-hoek, en elders; te Delfzyl aan den Dollart.

- erinervia.* 382. *ARENARIA* foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. *Sp.* 605. *n.* 4. *Gelr.* 255. *Jngr.* 71.
Alfne plantaginis folio. *Baub. bist.* 3. *p.* 364.
Oed. dan. t. 329.
 Aan de Heggen en in de Boschen op verscheide plaatsen.

- Serpillifolia* 383. *ARENARIA* foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. *Sp.* 606. *n.* 6. *Gelr.* 254. *Fris.* 195.
Alfne minor multicaulis. *Baub. pin.* 250. *Comm. boll.* 7.
Alfne minor. *Fuchsf. bist.* 23.
Kleine - Muur. Belg.
 β. *Alfne minor, lini capitulis.* *Baub. pin.* 251. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 209. *n.* 3.
 In de Hoven en Moes-tuinen.

- rubra.* 384. *ARENARIA* foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. *Sp.* 606. *n.* 8. *Gelr.* 256. *Fris.* 196.

- campestris. α.* *Spergula purpurea.* *Baub. bist.* 3. *p.* 722.
Alfne Spergulæ facie minor, sive spergula minor,
flosculo subcæruleo. *Baub. pin.* 251. *prodr.* 119.
Boerb. lugdb. 1. *p.* 209. *n.* 7.
Polygonum foliis gramineis, spergulæ capitulis.
Loef. pruss. 203. *t.* 63.

- marina.* β. *Alfne spergulæ facie media.* *Baub. pin.* 251. *Comm. boll.* 8. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 209. *n.* 6.
Spergula marina. *Dalech. bist.* 1385. *Baub. bist.* 3. *p.* 723.

- Zee-Spurrie.* Belg.
 α. Te Heemze in Overysfel aan de kanten der Bouwlanden, alwaar weinig gras is; aan de dykes in 't Goreght, en aan de kanten der Zaailandden by Groningen; ook buiten Francker, en elders. β. op 't Koegras by de Helder, en langs de Zeekant by Harderwyk, Muiderberg, &c.

- striata.* 385. *ARENARIA* foliis linearibus erectis oppressis, calycibus oblongis striatis. *Sp.* 608. *n.* 14.

Al-

Alfine folio cali, flore magno albo purpurascente.

Boerb. lugdb. 1. p. 209. n. 10.

Auricula muris, pulchro flore, folio tenuissimo.

Baub. bist. 3. p. 361.

† *Volgens BOERHAAVE.*

P E N T A G Y N I A.

S E D U M.

386. *SEDUM* foliis planiusculis ferratis, corymbo *Telephium.*
foliofo, caule erecto. *Sp. 616. n. 2. Gelr. 266.*

Frif. 197.

Telephium vulgare. *Laub. pin. 287. Comm. holl. 109.*

Telephium alterum f. *Crassula. Dod. pempt. 130.*

Anacamperos vulgo *Faba crassa. Baub. bist. 3. p. 681.*

Smeer-Wortel, Groot Breuk-kruid, Woud-kruid, Donder-Boonen, Wolfs-Boonen. Belg.

St. Fans-kruid. Groningans.

Op de Wallen te Zutphen, aan de dykjes by Uilenpas, Twello, in 't Clarenbeeksche-Bosch, en elders in Gelderland; aan de dykjes by Velsen; in Friesland omtrent Bergum, Oostermeer, Heerenveen en elders in de Wouden, aan dykjes, ruige wegen en onbebouwde stukken lands; op boscbagtige plaatsen by de Mickelhorst, by Onnen, en elders in 't Goreght.

Pharm. CRASSULÆ herb.

387. *SEDUM* foliis planis, caule ramoso, floribus pa- *Cepæa.*
niculatis. *Sp. 617. n. 8.*

Cepæa. Baub. pin. 288. Cam. epit. 673. Clus. bist. 2. p. 68. Comm. holl. 23.

Wilde Porcelyn. Belg.

Langs de Zee-kusten van Holland, veel op 't Koe-gras omtrent de Helder, en aan de Muiderberg. (HALL. Elem. Physiol. tom. 7. p. 172.)

388. *SEDUM* foliis subulatis quinquafariam confertis *rupestre.*
basi solutis, floribus cymosis. *Sp. 613. n. 11. Gelr. 267.*

Sedum minus luteum, folio acuto. Baub. pin. 282.

Morif. bist. 3. p. 471. f. 12. t. 6. f. 6.

Tripmadam. Vulgo.

Op de Muuren te Arnhem en Harderwyk; langs de Maas dyken; aan de Kerk te Wyk by Duurstedede; op de daken der huizen te Amerongen, en aan de Wal om 't Huis te Beverwaard in 't sticht van Utrecht; overvloedig aan een dykje agter Stelpen, aan de westkant van de Heereweg, en agter Haren by Voorveld buiten Groningen.

album.

389. *SEDUM foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa. Sp. 619. n. 13. Gelr. 269.*

Sedum minus teretifolium album. Baub. pin. 283.

Comm. boll. 104. Morif. bist. 3. p. 472. f. 12. t. 7. f. 23. & 24.

Oed. dan. t. 66.

Klein Huis- Look. Belg.

Schot-kruid. Groningans.

Op oude Daken en Muuren.

Pharm. SEMPERVIVI MINORIS herb.

acre.

390. *SEDUM foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. Sp. 619. n. 15. Gelr. 268. Fris. 198.*

Sempervivum minus vermiculatum acre. Baub. pin. 283. Comm. boll. 104.

Illecebra f. Sempervivum tertium. Dod. pempt. 129.

Muur-Peper. Belg.

Berg-Knop. Vulgo.

Aan den Dyk by Arnhem; op de Heide by Zelhem in 't Graaffschap Zutphen; op de Stads-muuren te Tiel, Harderwyk, Utrecht, Wyk by Duurstedede; in de Duinen en aan de kanten der Zandige Bouwlanden by Haarlem, Alkmaar, Naarden, en elders. Menigvuldig langs de gansche Friessche Zee-kust, en op veele andere plaatsen binnen-dyks.

Pharm. ILLECEBRÆ MINORIS herb.

OXALIS.

Acetofella. 391. OXALIS scapo unifloro, foliis ternatis obcorda-

datis, radice dentata. *Sp.* 620. *n.* 1. *Gelr.* 264.
 Trifolium acetosum vulgare. *Baub. pin.* 330. *Comm.*
boll. 112. *Morif. hist.* 2. *p.* 184. *f.* 2. *t.* 17. *f.* 1.
Klaver - Zuuring, Koekkoeks - brood. Belg.

- β. Trifolium acetosum vulgare, flore purpurascence.
Morif. hist. 2. *p.* 183. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 319.
In de Koorn-landen en Moeshoven; ook in 't Haag-
se-Bosch.
 Pharm. ACETOSELLÆ herb.

392. OXALIS pedunculis umbelliferis, caule ramoso *corniculata*
 diffuso. *Sp.* 623. *n.* 11. *Gelr.* 265. *Fris.* 200.
 Oxys lutea. *Baub. hist.* 2. *p.* 388. *Boerb. lugdb.* 1.
p. 319.
 Trifolium acetosum corniculatum. *Baub. pin.*
 330. luteum minus repens, etiam procumbens.
Morif. hist. 2. *p.* 183. *f.* 2. *t.* 17. *f.* 2.
Koekkoeks - brood. Belg.
In de Moeshoven, en in de Boffchadie by Uilenpas.

A G R O S T E M M A.

393. AGROSTEMMA hirsuta, calycibus corollam *Githago.*
 aequantibus, petalis integris nudis. *Sp.* 624. *n.* 1.
Gelr. 262. *Fris.* 201.
 Nigellastrum. *Dod. pempt.* 173.
 Lychnis segetum major. *Baub. pin.* 204. *Comm.*
boll. 69.
Oed. dan. t. 576.
Koorn - Roozen of Nagel - bloemen. Belg.
Bol of Bolderik. Rusticulis.
In de Zaaialanden onder 't Koorn op verscheide plaat-
sen.

L Y C H N I S.

394. LYCHNIS petalis quadrifidis fructu, subrotundo. *Flos cucull.*
Sp. 625. *n.* 2. *Gelr.* 263. *Fris.* 202.
 Caryophyllus pratensis, flore laciniato simplici,
f. Flos cuculi. *Baub. pin.* 213. *Comm. boll.* 22.
Oed. dan. t. 590.
Koekkoeks - bloem, Kraaye - Bloem. Belg.
Pinxter - bloemen. Groningans.
 β. Lychnis pratensis, flore laciniato albo simplici.
Tourn. inst. 336.

Zeer

Zeer veel in de Hooy-en Wey-Landen. β. aan de Sloot omtrent den Tryfelberg by Hattem; ook by Groningen.

- dioica.* 395. *LYCHNIS floribus dioicis. Sp. 626. n. 6. Gelr. 249. Frisf. 203.*
α. Lychnis sylvestris f. aquatica purpurea simplex. Baub. pin. 204. Comm. boll. 69.
Ocimoides purpureum multis. Baub. bist. 3. p. 343.
β. Lychnis sylvestris alba simplex. Baub. pin. 204. Comm. boll. 69.
By de wegen op schaduwachtige plaaten by Vanenburg, Ouden-Aller, in Hierden, en elders in Gelderland, by Haarlem, Velsen; in 't Haagse-Bosch; by Utrecht; op den Rhenensc-Berg; en veele andere plaatsen. β. Langs de Duinen en aan zandige wegen.
Variat etiam α corollæ colore rubro, pallido, albicante, &c.

C E R A S T I U M.

- vilgatum.* 396. *CERASTIUM foliis ovatis, petalis calyci æqualibus, caulibus diffusis. Sp. 627. n. 2.*
Alfine hirsuta magno (parvo potius) flore. Baub. pin. 251. Comm. boll. 7.
Auricula muris quorundam, flore parvo, vasculo longo. Baub. bist. 3. p. 359.
In de Hoven, en langs de Wegen by Harderwyk, Hattem, Haarlem, Utrecht, Zwol, en elders.
- viscosum.* 397. *CERASTIUM erectum villoso-viscosum. Sp. 627. n. 3. Gelr. 260.*
Alfine hirsuta altera viscosa. Baub. pin. 251. Comm. boll. 7.
Alfine spuria quarta. Dod. pempt. 31.
Ruig Muur. Belg.
Langs de Wegen en in de Hoven.
- semidecandrum.* 398. *CERASTIUM floribus pentandris, petalis emarginatis. Sp. 627. n. 4. Gelr. 261.*
Alfine hirsuta minor. Baub. pin. 211.
Myosotis arvensis hirsuta minor. Tourn. inst. 245. Vaill. par. 142. t. 30. f. 2.

Veel

*Veel op Zandige plaatsen by Harderwyk.
Tempore vernali inprimis conspicitur.*

399. CERASTIUM foliis lineari-lanceolatis obtusis *arvensis*.
glabris, corollis calyce majoribus. *Sp.* 628. *n.*
6. *Gelr.* 259 *Fris.* 205.
Caryophyllus holosteus arvensis hirsutus, flore
majore. *Baub. pin.* 210. *Comm. boll.* 22.
Auricula maris, pulchro flore albo. *Laub. bist.* 3.
p. 360.
Kleine witte Ginoffelen, Ruig Oogen-troost-Gras.
Belg.
Scheele Oogen. Vulgo.
In den Enck en elders by Harderwyk; langs de
zandige Wegen en Akkers by Velsen; aan de dyk-
jes omtrent Oudega en Rotteval in Friesland.

S P E R G U L A.

400. SPERGULA foliis verticillatis, floribus decan- *arvensis*.
dris. *Sp.* 630. *n.* 1. *Gelr.* 257. *Fris.* 206.
Spergula. Dod. pempt. 537.
Alfine Spergula dicta major. Baub. pin. 250. *Comm.*
boll. 8.
Spurrie. Belg.
Water-Gal. Groninganis.
β. *Spergula pentandra. Sp.* 630. *n.* 2. *Fris.* 307. *Belg.*
378.
Alfine spergulæ facie minima, flosculis albis.
Comm. boll. 8.
Overvloedig op de Akkers van 't Duin, en in de
zandige Bouw-landen by Arnhem, Harderwyk,
Haarlem, Alkmaar; in Gooiland; in de Wou-
den in Friesland; in 't Goreght by Groningen;
en elders. . . Overvloedig agter den Hoef en Ber-
gen buiten Alkmaar; in 't Bentveld by Haarlem;
en elders.
Ill. LINNÆUS (Mant. p. 390) recte monet Sper-
gulam arvensẽ & pentandram meras esse varietat-
es.
401. SPERGULA foliis oppositis subulatis lævibus, *nodosa*.
caulibus simplicibus. *Sp.* 630. *n.* 3. *Gelr.* 258.
Alfine nodosa germanica. Baub. pin. 251. *prodr.*
118.

Ara-

Arenaria. *Baub. bist.* 3. p. 720. f. 721. *Comm.*
boll. 12.

Polygonum, foliis gramineis, alterum. *Loef. pruss.*
 204. t. 64.

Oed. dan. t. 96.

Zand - kruid. Belg.

In de Duin - Valeyen by 's Hage, Raaphorst, Westerhout, Heemstede; ook op vochtige plaatsen omtrent Hattem en Zwol; in 't Veenland by Haren buiten Groningen.

C L A S S I S XI.

D O D E C A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

L Y T H R U M.

402. LYTHRUM foliis oppositis cordato - lanceolatis, *Salicaria*.
 floribus spicatis dodecandris. *Sp.* 640. n. 1.
Gelr. 270. *Fris.* 208.

Lyfimachia spicata purpurea. *Baub.* pin. 246. *Comm.*
boll. 70.

Pseudo-Lyfimachium purpureum alterum. *Dod.*
pempt. 86.

Partyke. Belg.

Katte - Staarten. Groninganis.

Veel aan de Water - kanten.

403. LYTHRUM foliis alternis linearibus, floribus *Hyssopifolia*.
 hexandris. *Sp.* 642. n. 8. *Gelr.* 271.
Salicaria hyssopi folio latiore. *Tourn. inst.* 253.

Hall. jen. 147. t. 6.

Hyssopifolia f. *Gratiola* minor angustioribus fo-
 liis. *Baub. prodr.* 108.

Hyssopifolia. *Baub. pin.* 218.

In Overysfel te Westerholte in de laagte omtrent
't huis van de groote Kerk.

MEESE cum *præcedenti* crescere dicit. *Cl. BOEHMER*
Flor. Lips. 540. modo stamina 4. aliquando, ut
III. HALLERUS, 5. vel 6. vidit.

D I G Y N I A.

A G R I M O N I A.

Eupatoria. 404. *AGRIMONIA* foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hispidis. *Sp.* 648. *n.* 1. *Gelr.* 272. *Frif.* 210.

Eupatorium veterum f. *Agrimonia*. *Baub. pin.* 321. *Comm. boll.* 36.

Eupatorium. *Fuchf. hist.* 244. *Cam. epit.* 756.

Oed. dan. t. 588.

Agrimony, *Lever-kruid.* Belg.

Veel in de Betuwe en 't Graaffchap Buuren; in de Weiden omtrent den Yssel; aan den Dyk by Wageningen en de Poll; in 't Ribben-Boschje by Harderwyk; aan den Dyk by Gouda; in de grasige Valeyen der Duinen buiten 's Hage, Haarlem en Alkmaar; aan de Wegen om Utrecht en Wyk by Duurstede; by Balk en Veenhuisen in Friesland; by Zwol; te Hemmen en Haren by Groningen; en elders.

Pharm. AGRIMONIE herb.

T R I G Y N I A.

R E S E D A.

Luteola. 405. *RESEDA* foliis lanceolatis integris basi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis. *Sp.* 643. *n.* 1. *Gelr.* 309.

Luteola herba salicis folio. *Baub. pin.* 100. *Comm. boll.* 69.

Luteola herba. *Dod. pempt.* 80.

Wouww. Belg.

Aan den Weg tusschen Zutphen en Doesburg; op de Wal te Tiel en Bommel, langs de Wegen by 's Hage; in de Duinen niet verre van Wyk op Zee; aan den Dyk tusschen Naarden en Muiden; by 't Casteel Duurstede; te Groningen by Ebbinge-poort onder aan de Wal by 't Boterdiep; en elders.

406. R E-

406. *RESEDA* foliis omnibus trifidis: inferioribus pin. *luteo*.
 natis. *Sp.* 645. *n.* 8. *Gelr.* 310.
Reseda vulgaris. *aub.* pin. 10. *Comm. boll.* 58.
Reseda lutea. *Baub. hist.* 3. p. 467.
 Om Arnhem by 't Slakke-gat; te Hattem op de Ho-
 moets-poort; aan de Dyken by Amsterdam; in
 't Haagfche - Bosch; aan de Duinkant buiten
 Haarlem; en elders.

E U P H O R B I A.

407. *EUPHORBIA* dichotoma, foliis crenulatis subro- *Chamae*.
tundis glabris, floribus solitariis axillaribus,
 caulibus procumbentibus. *Sp.* 452. *n.* 25.
Chamae. *Baub. pin.* 293. *Clus. hist.* 2. p. 187.
 † Volgens BOERHAAVE.
 408. *EUPHORBIA* umbella trifida: dichotoma, in- *Peplus*.
 volucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis
 petiolatis. *Sp.* 653. *n.* 31. *Gelr.* 303. *Fris* 211.
Peplus f. *Esula* rotunda. *Baub. pin.* 292. *Comm.*
boll. 86.
Peplus. *Fuchs. hist.* 603. *Dod. pempt.* 375
Duivels - Melk, Hexe - Melk, Kroontjes - kruid,
Kleine Spurge. Belg.
 In de Zaaï-landen, Moes-hoven, en by de Wegen.
 409. *EUPHORBIA* umbella trifida: dichotoma, in- *exigua*.
 volucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Sp.* 654.
n. 34. *Gelr.* 304.
Tithymalus f. *Esula* exigua. *Baub. pin.* 291. *Comm.*
boll. 110. *Morif. hist.* 3. p. 339. *f.* 10. *t.* 2. *f.* 5.
Oed. dan. t. 592.
 In de Koorn-landen by Bunnik, Odyk in de Pro-
 vintie Utrecht; by Zwol; en elders.
 410. *EUPHORBIA* umbella quinquesida: bifida, in- *Pithyusa*.
 volucellis ovatis mucronatis, foliis lanceolatis:
 infimis involutis retrorsum imbricatis. *Sp.* 656.
n. 41.
Tithymalus foliis brevibus aculeatis. *Baub. pin.*
 292.
Pithyusa. *Dalech. hist.* 1652.
 In de Duinen. (LINN.)

Paralias. 411. EUPHORBIA umbella subquinquefida: bifida, involucellis cordato reniformibus, foliis sursum imbricatis. Sp. 657. n. 43. Gelr. 306.

Tithymalus maritimus. Baub. pin. 291. Dod. pempt. 370. f. 1. 2. Comm. boll. 110.

Tithymalus paralias. Cam. epit. 962.

Zee-Wolfs-Melk Belg.

by Zandvoort op de Zee-duinen.

helioscopia. 412. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ferratis. Sp. 658. n. 46. Gelr. 302. Frisf. 212.

Tithymalus helioscopius. Baub. pin. 291. Dod. pempt. 371. Lob. hist. 192. Comm. boll. 111.

Morif. hist. 3. p. 359. f. 10. t. 2. f. 9.

Zonnewendend Wolfs-Melk of Kroontjes - kruid. Belg.

In de Zaaï-landen by het Huis te Marquette; te Salk in Overysel; en in Friesland op veele plaatsen onder 't Koorn.

platyphyllos 413. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis carina pilosis, foliis ferratis lanceolatis, capsulis verrucosis. Sp. 660. n. 53.

Tithymalus arvensis latifolius germanicus. Baub. pin. 291.

Tithymalus platyphyllos. Fuchf. hist. 813.

† Volgens BOERHAAVE.

Esula. 414. EUPHORBIA umbella multifida: bifida, involucellis subcordatis, petalis subbicornibus, ramis sterilibus, foliis uniformibus. Sp. 660. n. 54. Gelr. 305. app. p. 249.

Tithymalus foliis pini, forte dioscoridis Pityusa.

Baub. pin. 292. Comm. boll. 110.

Esula minor. Dod. pempt. 374.

Kleine Esula of Wolfs-Melk, Kleine Spurge Belg. Overvloedig in de Velden, en aan aen Dyk langs den Ysel in Gelderland en Overysel.

Pharm. ESULE MINORIS rad.

Cyparissias. 415. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus, foliis se-

DODECANDRIA TRIGYNIA. 131

sericeis; caulinis lanceolatis. *Sp.* 661. n. 55.
Gelr. 624

Tithymalus cyparissius. Baub. pin. 291.

Tithymalus cyp. effusus Tabern. hist. 990.

Omtrent de Waart te Salk by Campen.

416. *ELPHORBIA umbella multifida: subtrifida: palustris.*
bifida. involucellis ovatis, foliis lanceolatis,
ramis sterilibus. *Sp.* 662. n. 57. *Gelr.* 307.

Tithymalus palustris f. uticosus. Baub. pin. 292.
Comm. boll. 110. *Morif. hist.* 3. p. 341. f. 10.
t. 2 f. 1.

Esula major. Dalech. hist. 1653. *Dod. pempt.* 374.

Groot Wolfs-Melk, Groote Spurge, Duivels-Melk.
Belg.

Aan de Slooten by Nymegen en Doesburg; in 't
Bosch van den Uilenpas; in de Riet-landen aan
den Hoogendyk tusschen Amsterdam en Muiden;
en in sommige slooten in Friesland; en elders.

Pharm. ESULÆ MAJORIS rad.

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM.

417. *SEMPERVIVUM foliis ciliatis, propaginibus pa-* *tescentibus. Sp.* 664. n. 3. *Gelr.* 273.

Sempervivum majus alterum f. Barba jovis. Dod.
pempt. 127.

Sedum majus vulgare. Baub. pin. 283. *Comm. boll.*
104.

Huis-look, Donderbaart. Belg.

Op de Daken en Muuren van oude Huizen.

Pharm. SEMPERVIVI MAJORIS berb.

C L A S S I S XII.

I C O S A N D R I A

M O N O G Y N I A.

P R U N U S.

- Padus.* 418 PRUNUS floribus racemosis, foliis deciduis basi
subtus biglandulosis Sp. 677. n. 1. Gehr. 277.
Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli.
Faub. pin. 451.
Pseudo-Ligusticum. Dod. pempt. 777.
Oed. dan. t. 205.
Zwarte Vogel-Kars, Hondskars. Belg.
Wilde Syringe. Vulgo.
By Harderwyk in den Enk, aan 't eind van de
Zandsteeg, aan de kant van de hooge Sydel, en
op andere vochtige plaatsen.
- avium.* 419. PRUNUS umbellis sessilibus, foliis ovato-lance-
olatis conduplicatis subtus pubescentibus. Sp.
680. n. 10
Cerasus sylvestris, fructu rubro. *Baub. hist.* 1. p.
220
Wilde Karsen-boom. Vulgo.
In 't Bosch van den Uilenpas.
- domestica.* 420. PRUNUS pedunculis subsolitariis, foliis lance-
olato ovatis convolutis, ramis muticis. Sp.
680. n. 11. Gehr. 275. *Fris.* 213.

Pru.

Prunus. *Baub. pin.* 443.

Pruna *majora dulcia & parva atro-cærulea.*

Baub. pin. 442. *n.* 23.

Wilde kleine zwart blauwe Pruim. Belg.

*In Friesland omtrent Bergum, 't Wyfel, Kooten,
en Drogeham in ruige Wallen, Kreupelbosjes,
en op sommige afgelegene plaatsen.*

Pharm PRUNI fruct.

Multæ hujus in hortis coluntur varietates.

421. *PRUNUS pedunculis solitariis, foliis lanceolatis spinosis.*
glabris, ramis spinosis. Sp. 681. *n.* 13 *Gelr.*
274. Fris. 214.

Prunus sylvestris. Baub. pin. 444. *Dod. pempt.*
753. Comm. boll. 93.

Slee-doorn, Slee-pruim. Belg.

Slyen Groningans.

*Veel buiten Tiel, Harderwyk, Zwol, Naarden
omtrent Cralo; Haarlem agter Overveen; in 't
Haagse-Bosch; by Doorn in 't Sticht van U-
trecht; in Friesland by de voorige, als nog te
Say-huysum by Haule, en omtrent Donkerbroek;
menigvuldig aan de dykjes door t geheele Goreght
by Groningen; en op meer plaatsen aan de wegen
tusschen kreupelhout.*

*Pharm PRUNI SYLVESTRIS flor. fructus, quo-
rum succus Acacia germanica.*

D I G Y N I A.

C R A T Æ G U S.

422. *CRATÆGUS foliis obtusis subtrifidis ferratis. Sp. Oxyacanthæ.*
683. n. 8. *Gelr.* 278. *Fris.* 215.

*Mespilus, apii folio, sylvestris spinosa f. Oxy-
acantha. Baub. pin.* 454. *Comm. boll.* 74.

Oxyacantha f Spina acuta. Dod. pempt. 751.

Haage-doorn. Belg.

Fructus vulgo Haag-appels, Spinne-koorns.

*In de Wildernissen op veele plaatjen, ook in de Dui-
nen by Overveen en Westerhout, en op het
Hoogevelde by den Haarlemmer hout.*

Flores sapius monogyni, quam digyni.

T R I G Y N I A.

S O R B U S.

- aucuparia.* 423. *SORBUS* foliis pinnatis utrinque glabris. *Sp.* 683.
n. 1. *Gelr.* 279. *Fris.* 216.
Sorbus sylvestris, foliis domesticæ similis. *Baub.*
pin. 415. *Comm. boll.* 107.
Sorbus aucuparia. *Baub. hist.* 1. p. 62.
Lyfter - Beziën - boom, *Sorbe - boom*, *Qualster - boom.*
Belg.
Quetze - beyen - boom. *Groninganis.*
In 't Haagse - Bosch, *in de Duinen niet verre van*
Wassenaar; *veel aan de dykjes in 't Gorecht*
buiten Groningen; *en elders aan de Wegen op*
schaduwachtige plaatsen, *en aan de kanten der*
Boemgaarden.

P E N T A G Y N I A.

P Y R U S.

- communis.* 424. *PYRUS* foliis ferratis lævibus, floribus corym-
 bosis. *Sp.* 686. *n.* 1. *Gelr.* 282. *Fris.* 217.
Pyrus sylvestris. *Baub. pin.* 439. *Dod. pempt.* 799.
Comm. boll. 94.
Wilde Peere - boom. *Belg.*
In 't Salker - bosch tusschen Campen en Salk aan den
Yssel; *ook van zelf uit 't zaad in de Ent - boven.*
- Malus.* 425. *PYRUS* foliis ferratis, umbellis sessilibus. *Sp.*
 689. *n.* 2. *Gelr.* 281. *Fris.* 218.
Malus sylvestris. *Baub. pin.* 435. *Dod. pempt.* 790.
Comm. boll. 71.
Wilde Appel - boom. *Belg.*
By de voorige; *ook aan de Heereweg agter Helpen*,
agter Haren, *en aan de Weg naar Onnen buiten*
Groningen.

S P I R Æ A.

- Filipendula.* 426. *SPIRÆA* foliis pinnatis: foliolis uniformibus fer-
 ra.
 ra.

ICOSANDRIA PENTAGYNIA. 135

ratis, caule herbaceo, floribus corymbosis. *Sp.*

702. n. 9

Filipendula vulgaris. Baub. pin. 163. Loerb. lugdb.

1. p. 43.

Filipendula. Cam. epit. 608. Dod. pempt. 56.

Roode Steen-breek, Drop-wortel. Belg.

Op een Waard aan de Leek tusschen Wyk by Duurstede en Schalkwyk.

Pharm FILIPENDULÆ rad. herb.

427. *SPIRÆA foliis pinnatis: impari majore lobato, Ulmaria.*
floribus cymosis. Sp. 702. n. 10. Gelr. 284.

Frif. 219.

Barba capræ floribus compactis. Baub. pin. 164.

Comm. boll. 15

Regina prati. Dod. pempt. 57.

Oed. dan. t. 547.

Geiten-baard, Reinette. Belg.

Veel op vochtige schaduwwachtige plaatsen.

P O L Y G Y N I A.

R O S A.

428. *ROSA germinibus globosis pedunculisque glabris, Eglanteria*
caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, fo-
liolis acutis. Sp. 703. n.

Rosa sylvestris, foliis odoratis. Baub. pin. 483.

Comm. boll. 99.

Rosa eglanteria. Talern. ic. 1087.

Wilde Rooze-boom, Eglantier, of Neglantier. Belg.

By Velsen aan de kanten der Akkers.

429. *ROSA germinibus globosis glabris, pedunculis spinosissimis*
hispidis, caule petiolisque aculeatissimis. Sp.

705. n. 14.

Rosa campestris spinosissima, flore albo odorato.

Baub. pin. 483. Comm. boll. 99.

Rosa dunensis. Dod. pempt. 182.

Oed. dan. t. 398.

Duin-Roos. Belg.

Te Maurik op den Bikkelenberg in de Betuwe; in de Duinen aan de Weg tusschen Haarlem en Zand-

voort, en in die agter Westerhout.

canina. 430. *ROS A* germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Sp.* 704. n. 10. *Gelr.* 285. *Fris.* 220.

Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato. *Baub.* pin. 483.

Rosa canina vulgo dicta. *Dod.* pempt. 187.

Honds - Roos. Belg.

Wipe - doorn. Harderovicenis.

Veel aan de kanten der Akkers in de Betuwe, ook by Harderwyk; in Twente by Enschede; in Friesland omtrent Eeſtrum, Drogeham, Kooten, en elders; in 't Goreght, en menigvuldig aan de Ooftkant van Haren buiten Groningen.

Pharm. CYNOSBATI fruct. *Bedeguar.*

R U B U S.

caus. 431. *RUBUS* foliis quinato - pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Sp.* 706. n. 1. *Gelr.* 288

Rubus idæus spinosus. *Baub.* pin. 479. *Comm.* boll. 99.

Rubus idæus. *Dod.* pempt. 743.

Framboizen, Braamboozen. *Hinne Beziën.* Belg.

Heining - Bessen. *Veenendalensibus.*

Veel by de Wegen te Venendaal op de Veluwe; en in 't Loſch by de Mickelhorſt buiten Groningen.

Pharm. RUBI IDÆI bacc.

cæſius. 432. *RUBUS* foliis ternatis subnatis: lateralibus bilobis, caule aculeato tereti. *Sp.* 707. n. 4. *Gelr.* 287.

Rubus repens, fructu cæſio. *Baub.* pin. 479.

Rubus minor. *Dod.* pempt. 742.

Flaauwe Brummelen. *Gelris*

Tuſſchen Nykerk en de Beerekamp; ook by Uilenpas, Zuideras, Oen, en elders in Gelderland.

fruticosus. 433. *RUBUS* foliis quinato - digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Sp.* 707. n. 5. *Gelr.* 286. *Fris.* 221.

Rubus vulgaris, ſive Rubus fructu nigro. *Baub.* pin. 479. *Comm.* boll. 99.

Ru-

Rubus. *Dod. pempt. 743. Cam. epit. 751.*

Braam-beziën. Belg.

Brummels. Vulgo.

Tonbeyen. Frislijs.

Langs de Wegen in Gelderland, Utrecht, Overysel, Twente; overvloedig in de Haarlemmerhout en 't Haagse-Bosch; langs de Duinkant in Holland; door de gantsche Woudekant in Friesland; en in 't Goreghe buiten Gröningen.

Pharm. RUBI VULGARIS bacc.

FRAGARIA.

431. FRAGARIA flagellis reptantibus. *Sp. 708. n. 1. vef. a.*

Gelr. 289. Frif. 222.

Fragaria vulgaris. Baub. pin. 326. Comm. boll. 78.

Aard-beziën. Belg.

♀. FRAGARIA fructu albo. *Baub. pin. 326.*

In verscheide Ofschadien in Gelderland, Overysel, Friesland; aan de Duinkant van Holland; aan de dykjes by Haren buiten Gröningen.

Pharm. FRAGARIÆ rad. herb. fruct.

Varietatem olim etiam legi in peribolo turris Harde-rovicene, e seminibus a vento vel avibus ibi procul dubio adlatis enatam.

POTENTILLA.

435. POTENTILLA foliis pinnatis serratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Sp. 710. n. 2. Gelr.*

290. Frif. 223.

Potentilla. Baub. pin. 321. Comm. boll. 93.

Argentina. Dod. pempt. 600.

Oed. dan. t. 544.

Zilverfchoon, Zilver kruid, Blik, Ganferik Belg.

Menigvuldig aan de Wegen en Paden, en in de Weilanden.

Pharm. ARGENTINÆ f. ANSERINÆ herb.

436. POTENTILLA foliis pinnatis, caule dichotomo *supina.*

decumbente. Sp. 711. n. 9.

Pentaphyllum supinum quorundam, potentillæ facie. Clus. hist. 2. p. 107.

Quinquefolio fragifero affinis. Baub. pin. 326.

Comm. boll. 94.

Op zandige dorre plaatsen in de Duinen en omtrent den Haaleminel-hout, en buiten Utrecht achter de Bilt.

- argentea.* 437. *POTENTILLA* foliis quinatis cuneiformibus incisifidis subtus tomentosis, caule erecto. *Sp.* 712. n. III. *Gelr.* 292. *Fris.* 224.

Quinquefolium folio argenteo Baub. pin. 325.

Pentaphyllum minus. Cam. epit. 760.

In de Duinen by Raphorst en Westerhout; te Heemze by de Kalfsboom in Overysfel; in Friesland op verscheide plaatjen in de Wouden in Boschen, laage gruppels en Heivelden.

- serena.* 438. *POTENTILLA* foliis radicalibus quinatis acute serratis retusis; caulinis ternatis, caule declinato. *Sp.* n. 15.

Quinquefolium minus repens luteum. Baub. pin. 325.

Pentaphyllum f. Quinquefolium minus. Tabern. ic. 123.

Oed. dan. t. 114.

In de Landen by den Essenburg buiten Harderwyk.

- repens.* 439. *POTENTILLA* foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Sp.* 714. n. 22. *Gelr.* 291. *Fris.* 225.

Quinquefolium majus repens. Baub. pin. 325. *Comm. boll.* 94.

Quinquefolium majus. Dod. pempt. 116.

Vyf-vinger-kruid. Belg.

Veel op de Stads wey by Harderwyk; in de Duin-valeyen van Holland, en in de Wouden in Friesland.

Pharm. PENTAPHYLLI rad.

T O R M E N T I L L A.

- erecta.* 440. *TORMENTILLA* caule erectiusculo, foliis sessilibus. *Sp.* 716. n. 1. *Gelr.* 293. *Fris.* 226.

Tormentilla sylvestris. Baub. pin. 326. *Comm. boll.* 111.

Tormentilla. Cam. epit. 685.

Oed. dan. t. 589.

Tormentille, ook Zeven-blad. Belg.

Mass.

Meer-wortel *Ruricolis Gelriæ*:

Veel op de Heide in Gelderland; in de Duin-valeyen, en op zandige gronden by Haarlem, Naarden, Utrecht, Zwol; in de Wouden in Friesland; en elders.

Pharm. FORMENTILLÆ rad. herb.

Radice hujus plantæ rustici utuntur ad mictum cruentum pecorum curandum, quæ tunc ipsis dicuntur aan 't Meer te staan, unde ratio denominationis.

G E U M.

441. GEUM floribus erectis, fructibus globosis villosis: *urbanum*. aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. Sp. 716. n. 2. *Gelr.* 295. *Fris.* 227.

Caryophyllata vulgaris. *Baub. pin.* 321. *Comm. boll.* 21.

Caryophyllata. *Dod. pempt.* 137.

Nagel-kruid, Gezegend-kruid. Belg.

Op schaduwachtige plaatsen in Gelderland, Utrecht, Overysiel, Friesland; in den Hout by Haarlem en Alkmaar; in 't Haagse-bosch en aan den Weg naar Scheveningen; te Groningen op de Stads-wal tusschen de Ebbinge-en Heensilpoort, ook aan de Heereweg aan de dykjes, dog weinig.

Pharm. CARYOPHYLLATÆ rad.

442. GEUM floribus nutantibus, fructu oblongo: *arivale*. flis plumosis tortis. Sp. 717. n. 3. *Fris.* 228.

Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Baub. pin.* 32.

Caryophyllata septentrionalium. *Lob. ic.* 694.

Nagel-kruid met neergebogene bloemen. Belg.

In de ruige Laanen en Eoffchen in Friesland. (MEESE.)

C O M A R U M.

443. COMARUM. Sp. 718. n. 1. *Gelr.* 294. *Fris.* 229. *palustre*.

Quinquefolium palustre rubrum. *Baub. pin.* 326. *Comm. boll.* 95.

Pentaphyllum f. Heptaphyllum majus rectum rubrum palustre. *Morif. hist.* 2. p. 189. f. 2. t. 19. f. 4.

Wa-

Water-Vyf-vinger-kruid. Belg.

Kroosfen. Vulgō.

By Halfen buiten Nymegen; in 't Veen by Uilen-
pas; aan de Stads wey by Harderwyk; en elders
in Gelderland in stilstaande Slooten en moerassige
Landen; ook by Kraalingen buiten Rotterdam;
by Overveen buiten Haarlem; by Maarseveen
in 't Sticht van Utrecht; by Zwol; in veele
Woudplaatsen in Friesland; en door gantsch Gro-
ningen.

C L A S S I S XIII.

P O L Y A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

C H E L I D O N I U M.

444. CHELIDONIUM pedunculis umbellatis. Sp. 723. *majus*.
n. 1. Gelr. 300. Frisf. 230.

Chelidonium majus vulgare. Raub. pin. 144. Comm.
boll. 25. Morisf. bist. 2. p. 257. f. 3. t. 11. f. 2.

Oed. dan. t. 5. 12.

Stinkende Gouwe, Oogen-klaar, Schel-kruid Belg.

β. Chelidonium majus vulgare, folio magis dissecto.

Boerb. lugdb. t. 1. p. 305. n. 5.

Veel onder de Heggen op ruwe plaatsen.

Pharm. CHELIDONII MAJORIS rad. berb.

P A P A V E R.

445. PAPAVER capsulis clavatis hispidis, caule fo- *Argemone*.
liso multifloro. Sp. 725. n. 2. Gelr. 623. Frisf.

231. Argemone capitulo longiore Baub. pin. 172. Lob.
ic. 276.

Argemone capitulo tenuiore longiore hirsuto.
Morisf. bist. 2. p. 278. f. 3. t. 14. f. 10.

Wilde Ruige-bastard-Heul Belg.

Op de Akkers in Hierden buiten Hardewyk, in
Bronckhorst, en elders in Gelderland; by het
Dorp Heemskerk in Kennemerland; en by Pie-
ters-

142 POLYANDRIA MONOGYNIA.

tersbierum in Friesland.

- Rheas.* 446. *PAPAYER* capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incis. *Sp.* 726. *n.* 6. *Gelr.* 299. *Fris.* 232.
Papaver erraticum majus. *Baub.* *pin.* 171. *Comm.* *boll.* 85.
Papaver erraticum *Dod. pempt.* 447.
Klap-Roozen, Koorn-Roozen, Koorn-Heul, Kolle-bloemen, Kanker-bloemen. *Belg.*
Honds-Roozen. *Ultrajectinis.*
Overvloedig in de Koorn-landen.
Pharm. PAPAVERIS RHÆADOS flor.

- Annisferum* 447. *PAPAYER* calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incis. *Sp.* 726. *n.* 7. *Gelr.* 298.
Papaver hortense femine nigro. *Baub.* *pin.* 170.
Zwarte-Heul of Slaap-bol. *Belg.*
In de Bouwlanden, tusschen 't Koorn, by Zwol, Uilenpas, en elders.
Pharm. PAPAVERIS NIGRI sem.

N Y M P H Æ A.

- Lutea.* 448. *N Y M P H Æ A* foliis cordatis integerrimis, calyce pentaphyllo majore. *Sp.* 729. *n.* 1. *Gelr.* 295. *Fris.* 233.
Nymphæa lutea major. *Baub.* *pin.* 193 *Comm.* *boll.* 81.
Nymphæa lutea. *Dod. pempt.* 585. *Cam. epit.* 635.
Geele Plompen. *Belg.*
Geele Pompe-bloemen. *Groninganis.*
β. *Nymphæa lutea minor, magno flore.* *Baub.* *pin.* 193. *Boerb. lugdb.* *p.* 281.
Op veele plaatsen in staande Wateren. &c. By Oldbroek, en in den Ouden Yssel in Gelderland; ook by Rotterdam, Gouda, Schoonhoven, Leerdam, en elders.
Pharm. N Y M P H Æ L U T E E flor.

- alba.* 449. *N Y M P H Æ A* foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido *Sp.* 729 *n.* 2. *Gelr.* 297. *Fris.* 234.
Nymphæa alba major. *Baub.* *pin.* 193. *Comm.* *boll.* 80.
Nymphæa alba. *Dod. pempt.* 585.

Wit-

POLYANDRIA MONOGYNIA. 143

*Witte Plompen, Water Rozen, Water-Plompen,
Witte Water-Kruiken, Meerbladeren. Belg.*

Witte Pompe bloemen. Groningans.

- β. *Nymphæa alba minor. Baub. pin. 193. Baub. bist.
3. p. 773. Comm. boll. 81.*

Leuconymphæa minor Boerb. lugdb. 1. p. 281.

Kleine witte Plompen. Belg.

*By de voorgaande, maar niet zo menigvuldig. C.
Tusschen Muiden en Naarden, binnendyks in de
Lraaken.*

Pharm. *NYPHÆÆ ALBÆ rad. herb. flor.*

T I L I A.

450. *TILIA floribus nectario destitutis. Sp. 733. n. 1. europæ.
Gehr. 301. Fris. 235.*

*Tilia fœmina, folio majore. Laub. pin. 426.
Comm. boll. 110.*

Oed. dan. t. 553.

Lindeboom Wyfke. Belg.

- β. *Tilia mas, foliis ulmi. Baub. pin. 426. Comm.
boll. 110.*

Lindeboom Manneke. Belg.

*Op veele plaatsen aan de Wegen, en in de Steden en
Dorpen.*

Pharm. *TILIÆ flor.*

C I S T U S.

451. *CISTUS herbaceus exstipulatus, foliis opposi-
tis lanceolatis trinerviis, racemis ebracteatis.
Sp. 741. n. 22.*

*Cistus flore pallido, macula nigro-rufescente
insignito. Baub. pin. 465. Comm. boll. 27.*

*Helianthemum flore maculoso. Col. ecpbr. 2. p.
78. t. 77.*

Op Vlieland by de Kerk.

*Primum ibi hæc rarissima Belgii planta lecta a Cl.
BREYNIO.*

T R I G Y N I A.

D E L P H I N I U M.

452. *DELPHINIUM nectariis monophyllis, caule Consolida,
sub.*

- subdiviso. Sp. 748. n. 1. Gelr. 3. 1.
Consolida regalis arvensis. Baub. pin. 142. Comm.
 boll. 27.
Flos regius sylvestris. Dod. pempt. 252.
Wilde Ridderspooren, Calketrip. Belg.
In de Koorn-velden op sommige plaatsen; veel te
Maurik in de Betuwe.
 Pharm. CALCATRIPE s. CONSOLIDÆ RE-
 GALIS. herb. flor.

P E N T A G Y N I A.

A Q U I L E G I A.

- vulgaris.* 453. *AQUILEGIA nesiariis incurvis.* Sp. 752. n. 1.
 Gelr. 312.
Aquilegia sylvestris. Baub. pin. 144. Comm. boll.
 12.
Aquileja. Dod. pempt. 180.
Wilde Aguilley of Akkeley. Belg.
In de Laan voor Uilenpas, en in de Koorn-velden
by Utrecht.
 Pharm. AQUILEGIÆ flor. sem.

H E X A G Y N I A.

S T R A T I O T E S.

- Aloides.* 454. *STRATIOTES foliis ensiformi-triangularis ciliato-*
aculeatis. Sp. 754. n. 1. Gelr. 313. Fris. 236.
Aloë palustris. Baub. pin. 286. Comm. boll. 6.
Sedum aquatile s. Stratiotes potamicos. Dod.
 pempt. 588. & 589.
Oed. dan t. 337.
Ruiters-kruud, Water-Ruiters, Krabben-Klauw.
 Belg.
Stikel-Kreusen. Groninganis.
Scheeren, Kaarten. Rusticis.
Zeer gemeen in veel Sloten in de Betuwe en in de
Grist tusschen Nymegen en Arnhem; in den
Ouden Yssel by Uilenpas; in de Sloten by Gou-
da; Oudewater, Haastrecht, Haarlem, buiten
's Hage

's Hage langs den weg naar Wassenaar; in de Graaffschappen Cuilenburg, Leerdam, Bauren; by Wyk te Duurstede, Veenendaal, Hardenbroek, Maarssen, Zuilen, Abcoude, Lopik, en elders in de Proventie Utrecht; in de Wouden en op de Kley in Friesland; ook veel in de Provincie Overysfel en Groningen, en by Zwartsluis in Drenthe.

Herba pabulo mixta remedium in Coryza equorum.
(de Droe.)

P O L Y G Y N I A.

A N E M O N E.

455. ANEMONE pedunculo involucrato, petalis *Pulsatilla* rectis, foliis bipinnatis. *Sp.* 759. n. 5.

Pulsatilla folio crassiflore & majore flore. Baub pin.

177. *Helw puls.* 62. t. 8.

Pulsatilla. Cam epit. 398. *Dod. pempt.* 433.

Oed. dan. t. 153.

Wildemans - kruid. Belg.

Te Brun-berg buiten Zutphen; en op den Paasch-beuvel by ter Borch. (Ill. Baro de ROUWENOORT.)

456. ANEMONE feminibus acutis, foliolis incisis, *nemorosa* caule uniflora. *Sp.* 762. n. 15. *Gelr.* 314.

Anemone nemorosa, flore majore. Baub. pin. 176.

Comm. boll. 10.

Anemone V. Dod. pempt. 435.

Oed. dan. t. 549.

Bosch - Haanevoet. Belg.

Melk - wortel. Groninganis.

Wind - bloem. Vulgo.

- β. *Anemone nemorosa, flore majore ex purpura rubente. Baub. pin.* 176.

- γ. *Anemone nemorosa, flore pleno albo. Baub. pin.* 176.

Op schaduwachtige plaatsen buiten Harderwyk omtrent 's Heeren - Loo; in de Haarlemmer - Hout; in 't Hangse - Bosch; by Mickelhorst, Hemmen, Haren buiten Groningen; en elders.

- ranunculoides.* 457. *ANEMONE* seminibus acutis, foliolis incisis, petalis subrotundis, caule subbifloro *Sp.* 762. n. 17. *Jngr.* 86. *Fris.* 237.
Ranunculus nemorosus luteus. *Baub.* pin. 178. *Comm. boll.* 96.
Ranunculus phragmites luteus nemorosus. *Baub. hist.* 3 p. 413.
Oed. dan. t. 140.
In den Aarden-hout by Haarlem omtrent de plaats Nulzenburg; in 't Haagse-Bosch; in Friesland omtrent Franeker, Orangewoud en Klein Katlyk op schaduwachtige plaatsen.

C L E M A T I S.

- Vitalba.* 458. *CLEMATIS* foliis pinnatis: foliolis cordatis scandentibus. *Sp.* 766. n. 8. *Gelr.* 315.
Clematis sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 300.
Vitalba. *Dod. pempt.* 405.
Lynen. Belg.
Overvloedig te Persingen by Nymegen; in de Heggen te Bronkhorst in 't Graafschap Zutphen; aan den Yssel-dyk by Terwolde op de Veluwe; en in de Herkeloer-waart in Overysfel.

T H A L I C T R U M.

- foetidum.* 459. *THALICTRUM* caule paniculato filiformi ramossimo. *Sp.* 768. n. 2.
Thalictum minimum foetidissimum. *Baub. pin.* 337. *prodr.* 147. *Baub. hist.* 3. p. 488. *Morif. hist.* 3. p. 325. *f. 9. t. 20. f. 13.*
Agter het Jooden Kerkhof by 's Gravenhage. (Cel. SCHWENCKE.)
- minus.* 460. *THALICTRUM* foliis sexpartitis, floribus cernuis. *Sp.* 769. n. 6. *Gelr.* 625.
Thalictum minus. *Baub. pin.* 337. *Dod. pempt.* 58.
Thalictum alpinum minus saxatile, rutæ folio, staminibus luteis. *Segu. ver.* 476. t. 11.
In de Salker-waart by Campen; en de Weiden langs den Yssel by Zutphen; overvloedig by den Steenoven aldaar.
- flavum.* 461. *THALICTRUM* caule folioso fulcato, panicula

mul.

multiplaci erecta. Sp. 770. n. 10. Gelr. 316.
Fris. 238.

Thalictrum majus, filiqua angulosa aut striata.
Baub. pin. 336. Comm. boll. 109.

Thalictrum magnum. Dod. pempt. 58.

Water-Ruit. Poel-Ruit, Heilblad, Valsch-Rbarber. Belg.

Te Eghteld in de Betuwe aan den voet van den Dyk;
by Harderwyk in de Ooster-Mehen, aan 't
einde van de Weysteeg, en aan de looge Sydel
over de eerste Moolen; buiten Wageningen aan
den Dyk by de Tol-boom; aan den Weg tusschen
Diemen en Abkoude; in de Weilanden aan de
Muider-Dyk; aan de Kaade buiten de Leuter-
poort te Wyk by Duursteede; in Friesland
tusschen Tjerjerk, en 't Huis ter Heide, en elders
in de Wouden aan de kanten der Slooten en We-
gen, en in sommige Bosschen; ook in de Salker-
waart.

A D O N I S.

462. Adonis floribus pentapetalis, fructibus ovatis. aestivalis.
Sp. 771. n. 1.

Adonis sylvestris, flore phoeniceo, ejusque foliis
longioribus. Baub. pin. 178. Boerb. lugdb. 1.
p. 35.

Adonis flore pallido. Cam. epit. 648.

Adonis-bloem, Bruinnetkens. Belg.

Komt van zelf voort onder het Koorn.

R A N U N C U L U S.

463. Ranunculus foliis ovato-lanceolatis peti- *Flammula.*
olatis, caule declinato. Sp. 773. n. 1. Gelr.
317. Fris. 239.

Ranunculus longifolius palustris minor. Baub. pin.
186. Comm. boll. 96.

Flammula Ranunculus. Dod. pempt. 432.

Oed. dan. t. 572.

Kleine Egel-Koolen. Belg.

Egel-gras. Rusticis.

In vochtige Wei-landen, en Moerassige plaatsen.

Ruricolæ Gelriæ adfirmant oves ex esu hujus plantæ
hydropicos (gellig) fieri & exinde mori; minus
autem boves adfici.

Lingua. 464. *RANUNCULUS* foliis lanceolatis, caule erecto.
Sp. 773. *n.* 3. *Gelr.* 318. *Fris.* 240.
Ranunculus longifolius palustris major. *Baub. pin.*
 34. *Comm. boll.* 96.

Lingua Plinii. *Dalech. hist.* 1037.

Egel. Koolen. Belg.

*In de Slooten te Persingen, Ommeren, Ryswyk
 in de Betuwe; in de Kolken aan den Ouden Ys-
 sel; in de Slooten by Buuren; en in die van de
 Sillik by Haarlem; in de Graften van 't Huis te
 Brederode; in de Slooten by Utrecht; in moeras-
 sige en laage landen omtrent Tjetjerk, Bergum
 en Augustinisga in Friesland; in de Slootea en
 Griften tusschen Deventer en Zwol; ook op ver-
 scheide plaatsen in de Provintie Groningen en
 Omlanden.*

Fiscaria. 465. *RANUNCULUS* foliis cordatis angulatis petio-
 latis, caule unifloro. *Sp.* 774. *n.* 9. *Gelr.* 319.
Jngr. 88. *Fris.* 241.

Chelidonia rotundifolia minor. *Baub. pin.* 309.
Comm. boll. 25.

Chelidonium minus. *Fuchf. hist.* 866. *Dod. pempt.*
 49.

Oed. dan. t. 499.

Speen-kruid, Kleine Gouwe. Belg.

Haane-klootjes. *Arnhemensibus.*

β. *Chelidonia rotundifolia minor, folio maculoso.*
Baub. pin. 309.

γ. *Chelidonia rotundifolia major.* *Baub. prodr.* 137.

δ. *Chelidonium minus, flore pleno.* *Boerb. lugdb.* 1.
p. 29.

*Overvloedig op vochtige schaduwachtige plaatsen, in
 de Bosschen, Hoven, en onder de Heggen.*

Pharm. CHELIDONII MINORIS. rad. herb.

*Varietati γ. Perianthium frequentissime pentaphyl-
 lum, atque cauliculi ramosi.* *BOERH.*

Sceleratus. 466. *RANUNCULUS* foliis inferioribus palmatis:
 summis digitatis, fructibus oblongis. *Sp.* 776.
n. 15. *Gelr.* 320. *Fris.* 242.

Ranunculus palustris, apii folio lævis. *Baub. pin.*
 180. *Comm. boll.* 96.

Ranunculus sylvestris. *Dod. pempt.* 426.

Oed. dan. t. 570.

Wa-

Water - Haanevoet. Belg.

Jeuk - kruid. Rusticis.

Overvloedig in Slooten, stilstaande Wateren, en vochtige Wei-landen.

In partibus nudis, quas attingit, pruritus concitat, easque exulcerat.

467. *RANUNCULUS* calycibus retroflexis, pedunculis ^{bulbosus.} fulcatis, caule erecto multifloro, foliis compositis. *Sp.* 778. n. 25. *Gelr.* 322.

Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotunda. *Baub.* pin. 179. *Comm. boll.* 95.

Ranunculus tuberosus. *Dod. pempt.* 431.

Oed. dan. t. 551.

St. Anthonis Raapje. Belg.

In de Velden langs den Yssel, en op 't Bergje in de groote Laan by den Haarlemmer-Hout.

468. *RANUNCULUS* calycibus patulis, pedunculis ^{repens.} fulcatis, stolonibus repentibus, foliis compositis. *Sp.* 779. n. 26. *Gelr.* 323. *Fris.* 243.

Ranunculus pratensis repens hirsutus. *Baub.* pin. 179. *Comm. boll.* 95.

Ranunculus hortensis. 1. *Dod. pempt.* 425.

Kruipend - Haanevoet of *Haanepoot.* Belg.

♀. *Ranunculus pratensis erectus dulcis.* *Baub.* pin. 179. *Boerb. lugdb.* 1. p. 31.

γ. *Ranunculus hortensis inclinatus.* *Baub.* pin. 179. *Boerb. lugdb.* 1. p. 31.

Ranunculus repens, flore pleno. *Baub. hist.* 3. p. 420

In de Hoven en Velden op schaduwachtige plaatsen.

469. *RANUNCULUS* calycibus patulis, pedunculis ^{polyanthem.} fulcatis, caule erecto, foliis multipartitis. *Sp.* 779. n. 27.

Ranunculus polyanthemus simplex. *Lob. ic.* 666. *Boerb. lugdb.* 1. p. 31. n. 10.

Ranunculus sylvestris. *Tabern. ic.* 42. *hist.* 117.

In vette Weiden in de Betuwe.

Facile confunditur cum sequente.

470. *RANUNCULUS* calycibus patulis, pedunculis ^{acris.} teretibus, foliis tripartito-multifidis: summis

linearibus. *Sp.* 779. *n.* 28. *Gelr.* 324. *Jngr.* 89.
Fris. 244.

Ranunculus pratensis erectus acris. *Baub.* *pin.* 178.
Comm. boll. 95.

Ranunculus hortensis. 2. *Dod. pempt.* 426.

Veld - Haanevoet of *Haanepoot*, *Eoter - bloem.*
Belg.

♀. *Ranunculus pratensis erectus acris*, in folii medio
maculatus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 30.

γ. *Ranunculus hortensis erectus*, flore pleno. *Baub.*
pin. 179. *Boerb. lugdb.* 1. p. 31.

Overvloedig in de *Wei-landen.* γ. te *Zaaphen*,
buiten de *Nieuwstads-poort.*

lanuginosus. 471. *RANUNCULUS calycibus patulis*, pedunculis
teretibus, caule petiolisque hirsutis, foliis tri-
fidis lobatis crenatis holosericeis. *Sp.* 779. *n.* 29.

Ranunculus magnus valde hirsutus, flore luteo.
Baub. bist. 3. p. 417. *Boerb. lugdb.* 1. p. 31.
n. 8.

Oed. dan. t. 397.

† Volgens *BOERHAAVE.*

arvensis. 472. *RANUNCULUS* feminibus aculeatis, foliis su-
perioribus decompositis linearibus. *Sp.* 780. *n.*
31. *Gelr.* 321. *Fris.* 245.

Ranunculus arvensis echinatus. *Baub.* *pin.* 179.
Comm. boll. 95.

Ranunculus sylvestris. 3. *Dod. pempt.* 427.

Oed. dan. t. 219.

Akker - Haanevoet. Belg.

In de *Zaai-landen* en *Koorn-akkers.*

muricatus. 473. *RANUNCULUS* feminibus aculeatis, foliis sim-
plicibus lobatis obtusis glabris, caule diffuso.
Sp. 783. *n.* 32. *Fris.* 246.

Ranunculus palustris echinatus. *Baub.* *pin.* 180.
prodr. 95. *Baub. bist.* 3. p. 842.

In *Friesland* het meeste op de *Kley* in laagten, en
aan uitwateringen (*MEESE.*)

parviflorus 474. *RANUNCULUS* feminibus muricatis, caule
diffuso. *Sp.* 780. *n.* 33.

Ranunculus hirsutus annuus, flore minimo. *Raj.*
angl. 3. p. 248. *t.* 12. *f.* 1. *Boerb. lugdb.* 1. p.
31. *n.* 15. Ra-

Ranunculus arvensis annuus hirsutus, flore omnium minimo. Moris. hist. 2. p. 440. f. 4. t. 28. f. 21.

† Volgens BOERHAAVE.

475. *RANUNCULUS* foliis subrotundis trilobis inter-hederaceis, gerrimis, caule repente. *Sp. 781. n. 37. Gelr. 325.*

Ranunculus aquaticus hederaceus luteus. Baub. pin. 180. Comm. boll. 96. Moris. hist. 2. p. 441. f. 4. t. 29. f. 29.

Oed. dan. t. 321.

In een Beekje aan de laage Sydel by Harderwyk; aan de Duinkant in stilstaande ondiepe Wateren, by den Aardenhout buiten Haarlem; in de Slooten by Groningen.

Corolla huic est alba, non lutea, ut C. Baubini synonymum dicitur.

476. *RANUNCULUS* foliis submersis capillaceis, aquatilis, emersis peltatis. *Sp. 781. n. 38. Fris. 247.*

a. *Ranunculus* foliis inferioribus capillaceis, superioribus peltatis. *Linn. lapp. 234. Gelr. 326.*

Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis imis capillaribus, supremis reniformibus orbicularibus palmatis. Hall. hist. 1163.

Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo. Baub. pin. 180. Comm. boll. 96.

Ranunculus aquatilis. Dod. pempt. 587.

Oed. dan. t. 376.

f. *Ranunculus* foliis omnibus capillaceis circumscriptioe rotundis. *Linn. b. Cliff. 231. Gelr. 327.*

Millefolium aquaticum cornutum majus. Baub. pin. 141.

Millefolium aquaticum cornutum. Baub. prodr. 72. Baub. hist. 3. p. 784. quoad iconem. Comm. boll. 76.

γ. *Ranunculus* caule fluitante, petiolis unifloris, foliis capillaribus, laciniis divergentibus. *Hall. hist. 1162.*

Ranunculus aquatilis omnino. Baub. hist. 3. p. 781.

Ranunculus trichophyllos aquaticus medio luteus. Col. ecphr. 1. p. 315. t. 316.

- Millefolium aquaticum*, foliis abrotani, ranunculi flore & capitulo. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 75.
- g. *Ranunculus* foliis omnibus capillaceis circumscriptione oblongis. *Roy. lugdb.* 492. *Gelr.* 328.
- Ranunculus* caule fluitante, petiolis unifloris, foliis capillaceis longissimis, laciniis parallelis. *Hall. bist.* 1161.
- Ranunculo* f. *Polyanthemo* aquatili albo affine *Millefolium* maratriphyllum fluitans. *Baub. bist.* 3. p. 782.
- Millefolium aquaticum*, foliis foeniculi, ranunculi flore & capitulo. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 75.
- α. Overvloedig in de Graften en Slooten om Harderwyk; aan de Duinkant in stilstaande ondiepe Wateren by den Aardenhout; en in de Slooten aan den Oosterweg te Haren en Hemmen buiten Groningen. β. Op veele plaatsen in de Vyvers. γ. In de Beekjes by Hoophuizen omtrent Harderwyk, en langs de Duinkant. δ. In den Yssel op verscheide plaatsen, en overvloedig in de Rivier 't Spaarne op den inham by 't Huis te Heemstede.
- III. HALLERUS varietates has pro distinctis speciebus habet, sed CEL. LUDWIG (*Epist. erud. ad Hall.* vol. 11. p. 165.) recte monet folia superiora subrotunda, si sub aquis immersa manent, capillacea fieri, si vero rapido flumine feruntur, ita elongari, ut peucedani foliis similia sint. *Millefolium aquaticum cornutum* *Baub.* bis occurrit in hoc Elencho, quippe quo ad descriptionem & iconem *Baub. prodr.* 73. t. 73. est hujus plantæ varietas. β. Quo ad descriptionem vero *Baub. bist.* est *Ceratophyllum demersum*.

C A L T H A.

- palustris. 477. *CALTHA*. *Sp.* 784. n. 1. *Gelr.* 329. *Fris.* 248. *Caltha palustris*, flore simplici. *Baub. pin.* 276. *Comm. boll.* 19.
- Caltha palustris*. *Dod. pempt.* 598.
- Boter-bloem, Dotter-Bloem. Belg.
- Kleine Pompe-bleemen. Groningans.

Veel

Veel in vochtige Wei-landen in de Betuwe, en omtrent Harderwyk, 's Hage, Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Leeuwaarden, Zwol; in de Bergermeer by Alkmaar; in 't Gorecht by Groningen.

Petalorum numerus in hac planta inconstans, frequentissime 5 adfunt, rarius 6 vel 7. rarissime 8.

C L A S S I S XIV.

D I D Y N A M I A.

G Y M N O S P E R M I A.

A J U G A.

- reptans.* 478. A J U G A glabra, folionibus reptantibus. *Sp.* 785.
n. 4. *Gelr.* 330. *Fris.* 249.
 Contolida media pratensis cærulea. *Baub. pin.* 260.
Comm. holl. 27.
 Bugula. *Dod. pempt.* 135.
 Zenegroen, Ingroen. Belg.
 Veel in de Wei-landen; in de pannen en laagten
 der Duinen; en ook by de Wegen.
 Pharm. BUGULÆ herb. flor.
 Variat interdum corollâ albâ & carnêâ.

T E U C R I U M.

- Scordonia.* 479. T E U C R I U M. foliis cordatis ferratis petiolatis,
 racemis lateralibus secundis, caule erecto. *Sp.*
 789. *n.* 18. *Gelr.*
 Scordium alterum, five Salvia agrestis. *Baub. pin.*
 247. *Comm. holl.* 103.
 Salvia agrestis five Sphacelus. *Dod. pempt.* 291.
Oed. dan. t. 485.
 Wilde-Salie. Belg.
 Op zandige plaatsen omtrent Uilenpas, Arnhem,
 Biloen, Harderwyk, en elders in Gelderland;
 Overvloedig in de Duinen by 's Hage, Raaphorst,
 Ben-

Bennenbroek, Heemstede, Hillegom, Wyk op Zee, agter den Ardenhout en by Hartecamp buiten Haarlem; aan den Weg tusschen Lisse en de Leidsche-Vaart; ook omtrent Zwol, en aan den Lerg by Amerongen in 't Sticht van Utrecht.

Pharm. SALVIÆ AGRESTIS herb.

480. TEUCRIUM foliis oblongis sessilibus dentato-ferratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso. *Sp.* 790. n. 20.

Scordium. *Baub.* pin. 247. *Cam. epit.* 588. *Dod. pempt.* 126. *Comm. holl.* 103.

Oed. dan. t. 593.

Water- Look. Belg.

Aan de Slooten in 't Graaffschap Zutphen omtrent Zevenaar; en in de vochtige Duin-Valeyen tusschen de Sillik en 't Dorp Lisse.

Pharm. SCORDII herb.

481. TEUCRIUM foliis cuneiformi-ovatis incisis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus subpilosis. *Sp.* 790. n. 22. *Fris.* 250.

Chamædrys major repens. *Baub.* pin. 248. *Dod. pempt.* 43. *Moris. hist.* 3. p. 422. f. 11. t. 22. f. 11. *Boerb. lugdb.* 1. p. 182.

Gamander, *Batbengel.* Belg.

- β. *Chamædrys minor repens.* *Baub.* pin. 248. *Dod. pempt.* 43. *Comm. holl.* 24. *Moris. hist.* 3. p. 422. f. 11. t. 22. f. 12.

In 't Haagse-Bosch, en in Friesland by Bergum, Heerenveen, Dragten, &c. op Heide-velden, en in zonnige Bosschen.

Pharm. CHAMÆDRIOS herb.

H Y S S O P U S.

482. HYSSOPUS spicis secundis, foliis lanceolatis. *officinalis.* *Sp.* 796. n. 1. *Gelr.* 335.

Hyssopus officinarum cærulea seu spicata. *Baub.* pin. 217.

Hyssopus vulgaris. *Dod. pempt.* 287.

Tzoo. Belg.

Te Harderwyk op de muur van 't Choor der vervallen Broederen Kerk, en eertyds op de muur van 't Huis

te

te Bronkhorst in 't Graaffschap Zutphen.

Pharm. HYSSOPI herb.

*Qui viderit binis illis in locis magna in copia e muris
crescentem banc plantam; vix dubitaret eam esse
veram Hyssopum Hebræorum. Conf. Epb. Nat.
Cur. Vol. 1. Obs. DXX. nisi obstaret observatio
Cl. FR. HASSELQUIST de Bryo truncatulo. Linn.
Suec. 2. 1001.*

N E P E T A.

Cataria. 483. *NEPETA* floribus spicatis: verticillis subpedi-
cellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-fer-
ratis. *Sp.* 796. n. 1.

Mentha cataria vulgaris & major. Baub. pin. 220.

Comm. boll. 74.

Cataria herba. Dod. pempt. 99.

Oed. dan. t. 580.

Katte - kruid, Nipt. Belg.

*In de Duinen by Overveen, en groeit ook van zelf
in de Zaai-landen en Hoven.*

Pharm. *NEPETÆ* herb.

S I D E R I T I S.

hirsuta. 484. *SIDERITIS* foliis lanceolatis obtusis dentatis
pilosus, bracteis dentato-spinosis, caulibus hir-
tis decumbentibus. *Sp.* 803. n. 10.

Sideritis hirsuta procumbens. Baub. pin. 233.

Comm. boll. 105.

Herba judaica. Dod. pempt. 93.

Glis - kruid. Belg.

By de Wegen en Paden.

M E N T H A.

Sylvestris. 485. *MENTHA*. spicis oblongis tomentosis ferratis
sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Sp.*
804. n. 1. *Gelr.* 341.

Mentha sylvestris folio longiore. Baub. pin. 227.

Comm. boll. 74. *Morif. bist.* 3. p. 368. f. 11. t. 6. f. 6.

Oed. dan. t. 484.

Wilde Munte. Belg.

Aan de kanten der Zaai-landen op veele plaatsen.

Pharm.

Pharm. MENTHÆ SYLVESTRIS herb.

486. MENTHA spicis oblongis, foliis subrotundis *rotundifolia.*
rûgosis crenatis sessilibus: Sp. 805. n. 3.

Mentha sylvestris, rotundiore folio. Baub. pin.

227.

Menthastrum, folio rugoso rotundiore, spontaneum, flore spicato odore gravi. Baub. hist. 3. p. 219.

In de laage vochtige pannen der Duinen buiten 's Hage
(Cel. SCHWENCKE.)

- 487 MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis ferratis *aquaticis.*
petiolatis, staminibus corolla longioribus.
Sp. 805. n. 3. Gelr. 342. Frisf. 251.

Mentha rotundifolia palustris, seu aquatica major.
Baub. pin. 227. Comm. boll. 73. Morisf. hist. 3. p. 370. f. 11. t. 7. f. 6.

Water - Munte, Bruin - beilig. Belg.

Aan de kanten der Slooten en Graften, en in vochtige Duin - Valeyen.

Pharm. MENTHÆ AQUATICÆ herb.

488. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis *arvensis.*
cutis ferratis, staminibus corollam æquantibus.
Sp. 806. n. 9. Gelr. 343. Frisf. 252.

Mentha palustris, folio oblongo. C. B. Comm. boll. 73.

Mentha arvensis verticillata hirsuta. Baub. hist. 3. p. 217. Morisf. hist. 3. p. 369. f. 11. t. 7. f. 5.

Calamintha arvensis verticillata. Baub. pin. 229.

Oed. dan. t. 512.

Veld - Munte. Belg.

Kruis en Munt. Groningans.

Aan de Slooten by Uilenpas, Zwol, Campen; aan de Duinkant van Holland; in Friesland op de Kley en in de Wouden overvloedig aan de Wegen, en kanten van Koorn-landen, op dykjes en aan ruige Wallen, en aan Slooten; ook in de Koorn-landen en boven van 't Goreght buiten Groningen.

489. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis *Pulegiæ.*
obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus re-

pen-

158 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

pentibus, staminibus corolla longioribus. *Sp.*
807. *n.* 12. *Gelr.* 344.

Pulegium latifolium. *Baub.* *pin.* 222.

Pulegium. *Fuchf. hist.* 199. *Dod. pempt.* 282.

Poley. Belg.

Op vochtige plaatsen aan de Waal by Wamel over
Thiel; en in de Thieler-waard; omtrent den
Yssel by Gorfel, Uilenpas, en elders in 't Graaf-
schap Zutphen; ook by Salk in Overysfel.

Pharm. PULEGII LATIFOLII herb.

G L E C O M A.

hederacea. 490. GLECOMA foliis reniformibus crenatis. *Sp.* 807.
n. 1. *Gelr.* 338. *Jngr.* 92. *Fris.* 253.

Hedera terrestris vulgaris. *Baub.* *pin.* 306. *Comm*
boll. 57. *Morif. hist.* 3. p. 409. f. 11. t. 21. f. 1.

Hondsdras, Aard-Veil, Onder-bave. Belg.

Kruip door den tuin. Hortulanis.

β. *Hedera terrestris minor. & elegantior.* *Baub.* *pin.*
306. *Comm. boll.* 57.

Klein Hondsdras, Belg.

Overvloedig langs de wegen en paden. β. Op voch-
tige gronden omtrent oude boomen.

Pharm. HEDERE TERRESTRIS herb.

L A M I U M.

Oryala. 491. LAMIUM foliis cordatis inæqualiter arguteque
ferratis, corollis fauce inflata, calycibus colo-
ratis. *Sp.* 808. *n.* 1.

Lamium maximum sylvaticum alterum. *Baub.*
pin. 231.

Galeopsis maxima pannonica. *Clusf. hist.* 2. p. 35.
In de Salker-waart in Overysfel.

laxigatum. 492. LAMIUM foliis cordatis rugosis, caule lævi,
calycibus glabris longitudine corollæ. *Sp.* 808. *n.* 3.

Lamium purpureum non foetens, folio oblongo.
Baub. *pin.* 231. *Boerb. lugdb.* 1. p. 157.

Galeopsis flore purpurascente majore, folio non
maculato. *Baub. hist.* 3. p. 321.

† Volgens BOERHAAVE.

album. 493. LAMIUM foliis cordatis acuminatis ferratis pe-
ti-

tiolatis, verticillis vigintifloris. *Sp.* 809. n. 5.
Gelr. 307. *Fris.* 254.

Lamium album non foetens, folio oblongo. Baub.
pin. 251. *Comm. boll.* 63.

Urtica iners sive Lamium primum. Dod. pempt. 153.
Oed. dan. t. 591.

Doove Netelen, Hond-Netelen. Belg.

Suiker-Netel. Buuranis.

Melk-bloem. Westfrisiis.

β. *Lamium urticae folio, flore purpureo spicato.*
Comm. boll. 63.

By de Wegen en in de Hoven. β. op het Kraaijenest
langs den weg naar Heemstede, en om Utrecht.

Pharm. URTICÆ MORTUÆ herb. flor.

494. *LAMIMUM foliis cordatis obtusis petiolatis. Sp. purpureum*
809. n. 6. Gelr. 346. *Jngr.* 93. *Fris.* 255.

Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo,
sive Galeopsis. dioscoridis. Baub. pin. 230.
Comm. boll. 62.

Urtica iners altera. Dod. pempt. 153.

Oed. dan. t. 523.

Stinkende Doove Netelen. Belg.

ε. *Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo*
minus. Boerb. lugdb. i. p. 157.

γ. *Lamium album foetidum, folio subrotundo. Baub.*
pin. 251. *Boerb. lugdb. i. p.* 157.

δ. *Lamium album foetidum, folio subrotundo minus.*
pin. 251. *Boerb. lugdb. i. p.* 157.

By de Wegen, en in de Hoven.

495. *LAMIMUM foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis. Sp.* 809. n. 7. *Gelr.* 345. *Fris.* 256. *amplexi-
caule.*

Lamium, folio caulem ambiente, minus. Baub.
pin. 232. *Comm. boll.* 63.

Morsus gallinae, folio hederulae, alter. Lob. ic.
463.

Hoender-beet. Belg.

β. *Lamium, foliis caulem ambientibus, majus. Baub.*
pin. 232. *Boerb. lugdb. i. p.* 158.

In de Zaay-landen en Moeshoven; veel by Arnhem.

G A L E O P S I S.

496. *GALEOPSIS internodiis caulinis aequalibus: Ladamun.*
ver-

verticillis omnibus remotis, calycibus inermibus.
Sp. 810. n. 1. Gelr. 348. Fris. 257.

Sideritis arvensis angustifolia rubra. Baub pin 232.

Ladanum segetum, flore rubro quorundam. Baub. hist. 3. p. 855.

Op de Akkers langs de Duinen, en in de Koornvelden op verscheide plaatsen.

Tetrabit. 497. *GALEOPSIS internodiis caulinis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguis, calycibus subpungentibus. Sp. 810. n. 2. Gelr. 349. Fris. 258.*

β. *Cannabina flore purpurascente. Boerb. lugdb. 1. p. 159.*

Cannabis sylvestris quorundam urticae inerti affinis. Baub. hist. 3. p. 854.

Urtica aculeata, foliis ferratis. Baub. pin. 232. Comm. boll. 116.

γ. *Cannabina flore albo. Boerb. lugdb. 1. p. 159.*

δ. *Galeopsis corolla flava: labio inferiore maculato. Linn. lapp. 193.*

Cannabina flore magno luteo, labiis purpureis. Boerb. lugdb. 1. p. 159.

Urtica aculeata, foliis ferratis altera. Baub. pin. 232. Comm. boll. 117.

Urtica mortua quarta. Dod. pempt. 153.

Geele Doove Netelen, Leeuwebekken. Groningans. In de Koorn-landen. β. Buiten Haarlem, aan de Duinkant, en by Zwol. γ. & δ. veel by Utrecht, Harderwyk, Zwol, in 't Haagse-Bosch; in de Wouden in Friesland; aan de dykjes by Haren buiten Groningen; en elders.

Galeobdolon. 498. *GALEOPSIS verticillis sexfloris: involucri tetraphyllo. Sp. 810. n. 3. Gelr. 354.*

Galeopsis f. Urtica iners, flore luteo. Baub. hist. 3. p. 323. Boerb. lugdb. 1. p. 162.

Lamium folio oblongo luteum. Baub. pin. 231.

In de Bosschadien by Uilenpas, Zwol, in Friesland by Bergum; en in 't Haagse-Bosch.

S T A C H Y S.

Sylvatica. 499. *STACHYS verticillis sexfloris, foliis cordatis*
 pé-

petiolatis Sp. 811. n. 1. Gelr. 350. Frisf. 259.
Lamium maximum sylvaticum foetidum. Baub.
pin. 231.

Urtica heraclea. Tabern. ic. 536.
In 't Bosch van Ouden-Aller op de Veluwe; in 't
Haagse-Bosch; in Boschen en aan ruige Wallen,
en aan de Wegen omtrent Dragten, Oudega en
Rotteval in Friesland; te Zwol op de Wal; in de
Salkerwaard; op den Dyk naar Paterwolde, by
de Mickelhorst, en elders buiten Groningen; en
op veele andere plaatsen in de Boschen en Heggen.

500. *STACHYS verticillis subsexfloris, foliis lineari-palustris.*
lanceolatis semiamplexi caulibus sessilibus. Sp.
811 n. 2. Gelr. 351. Frisf. 260.

Stachys palustris foetida. Baub. pin. 236.

Stachys aquatica. Tabern. ic. 577.

Aan de kanten der Slooten by 's Hage, Zandhorst;
op veele plaatsen in Friesland; aan de Griffen
tusschen Deventer en Zwol; in 't Veenland by 't
Cluivings-bosch in 't Landschap Drenthe.

501. *STACHYS verticillis sexfloris, foliis obtusis nu-*
diusculis, corollis longitudine calycis, caule
debili. Sp. 814. n. 1. (Gelr. 339.)

Sideritis alpine trixaginis folio. Baub. pin. 233.
prodr. 111

Oed. dan. t. 587.

5. *Lamium paludosum belgicum, melissæ folio.*
Herm. lugdb. 35. t. 353.

In een Koorn-land by Marquette; in 't Zand achter
den Kranenborgh, en in de Hoven by Zwol.

B A L L O T A.

502. *BALLOTA foliis cordatis indivisis ferratis, caly-*
cibus acuminatis. Sp. 814. n. 1. Gelr. 352.
Frisf. 261.

Ballote f. Marrubium nigrum. Dod. pempt. 90.

Marrubium nigrum foetidum. Baub. pin. 230.
Comm. holl. 72.

Zwarte Mulrove, Stinkende Andoorn. Belg.

Veel by de wegen en op ruwe plaatsen omtrent Har-
derwyk, Muiderberg, 's Hage, Utrecht, Zwol;

in Friesland omtrent Sumeer, Bergum, Gorradyk, en elders.

- alba.* 503. *BALLOTA* foliis cordatis indivisis ferratis, calycibus subtruncatis. *Sp.* 814 *n.* 2.
 Ballote flore albo. *Tourn. inst.* 185. *Boerb. lugdb.* 1. p. 175.
 Ballote. *Cam. epit.* 572.
 † Volgens BOERHAAVE.

M A R R U B I U M.

- vulgare.* 504. *MARRUBIUM* dentibus calycinis fetaceis uncinatis. *Sp.* 816. *n.* 5. *Gelr.* 353.
Marrubium album vulgare. *Baub. pin.* 230. *Comm. boll.* 72. *Morif. bist.* 3. p. 376. *f.* 11. *t.* 9. *f.* 1.
Malrove, Witte Andoorn. Belg.
Tusschen Maas en Waal over Tiel; op verscheide plaatsen buiten Zutphen, en in de Duinen; aan de Weg tusschen Rotterdam en Schiedam; en tusschen Deventer en Twello.
Pharm. MARRUBII berb.

L E O N U R U S.

- Cardiaca.* 505 *LEONURUS* foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Sp.* 817. *n.* 1. *Gelr.* 315.
Marrubium Cardiaca dictum. *Baub. pin.* 230. *Comm. boll.* 72. *Morif. bist.* 3. p. 378. *f.* 11. *t.* 9. *f.* 18.
Herts-ge-span. Belg.
Op Steenachtige ruwe plaatsen, en by de Wegen.

O R I G A N U M.

- vulgare.* 506. *ORIGANUM* spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Sp.* 824. *n.* 7. *Gelr.* 335.
Origanum sylvestre. *Baub. pin.* 223. *Dod. pempt.* 285.
Wilde Orego, Wilde Majolein. Belg.
Overvloedig tusschen Nymegen en Gend; tusschen Zutphen en Doesburg; by 't Dorp Voorst op de Veluwe; aan den Rhyndyk in de Betuwe; in de Duinen achter Zorgvliet; aan de Wegen om Wyk by

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 163

by Duurstede ; in de Herkelocr - en Salker -
 Waart : en elders.

Pharm ORIGANI VULGARIS herb.

T H Y M U S.

507. THYMUS floribus capitatis , caulibus repenti- *Serpyllum.*
 bus , foliis planis obtusis basi ciliatis. *Sp.* 825.

n. 1. *Gelr.* 332 *Fris.* 262.

Serpyllum vulgare minus. *Baub. pin.* 220. *Comm.*
boll. 105.

Serpyllum vulgare. *Dod. pempt.* 277.

Quendel, Wilde Thym. Belg.

β. *Serpyllum* vulgare , flore albo. *Tourn. inst.* 197.

Op zandige dorre gronden en Hei- velden in 't Graaf-
 schap Zutphen ; op de Veluwe ; te Wamel over
 Tiel ; buiten 's Hage , Haarlem , Rhenen ,
 Zwol ; in Friesland omtrent Bergum , Heeren-
 veen , en andere Woud- plaatsen ; buiten Gronin-
 gen by Harender- Moolen , &c. β. Op de Heide
 by Elspeet , en in de Laan voor Uilenpas.

Pharm. SERPILLI herb.

508. THYMUS floribus verticillatis , pedunculis uni- *Acinos.*
 floris , caulibus erectis subramosis , foliis acutis

ferratis. *Sp.* 826 *n.* 4. *Gelr.* 333. *Fris.* 263.

Clinopodium arvense ocymi facie. *Baub. pin.* 225.

Acinos multis *Baub. bist.* 3. p. 295.

Op zandige plaatsen omtrent den Ouden- Yssel in 't
 Graafschap Zutphen ; in de Duinen niet verre
 van Westerhout , en by Oevenen ; in Friesland
 op verscheide plaatsen op bezaaide en beplante gron-
 den ; in de Herkelocrsteeg in Overysfel.

M E L I S S A.

509 MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis *Nepeta.*
 folio longioribus , caule adscendente hirsuto.

Sp. 828. *n.* 4. *Gelr.* 337.

Calamintha pulegii odore. *Baub. pin.* 228 *Comm.*
boll. 19.

Pulegium sylvestre , five *Calamintha* altera. *Dod.*
pempt. 98.

Wilde Poley. Belg.

Veel in braakleggende Koorn- velden by Uilenpas ,

164 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Utrecht, de Bilt, Zeist; in de Duinen buiten's Hage, en aan de Weg in 't groot Bentveld by Haarlem, en elders.

S C U T E L L A R I A.

galericulata 510. SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Sp.* 835. *n.* 5. *Gelr.* 357. *Frif.* 264.

Lyfimachia cærulea galericulata, vel Gratiola cærulea. *Baub. pin.* 246. *Comm. boll.* 71.

Lyfimachia galericulata. *Dalech. bist.* 1060.

Glid - kruid. Belg.

β. Cassida palustris vulgatio, flore albo. *Tourn. inst.* 182. *Boerb. lugdb.* 1. p. 177.

By de wegen en paden, veel aan de Sypel by Harderwyk, en op Princen-Loo; in de Duin-valleyen achter Zorgvliet; in Friesland by Langweer en Orange-woud; aan de dykjes by Haren buiten Groningen.

P R U N E L L A.

vulgatis. 511. PRUNELLA foliis omnibus ovato-oblongis ferratis petiolatis. *Sp.* 837. *n.* 1. *Gelr.* 356. *Frif.* 265.

Brunella major, folio non dissecto. *Baub. pin.* 260. *Comm. boll.* 17.

Brunella. *Dod. pempt.* 136.

Brinelle. Belg.

β. Brunella major, folio non dissecto, flore albo. *Baub. pin.* 261. *Boerb. lugdb.* 1. p. 169.

In de Velden en Wei-landen.

Pharm. BRUNELLÆ herb.

laciniata. 512. PRUNELLA foliis ovato-oblongis petiolatis: supremis quatuor lanceolatis dentatis. *Sp.* 837. *n.* 2.

Brunella folio laciniato. *Baub. pin.* 261. *Comm. boll.* 17.

Brunella II non vulgaris. *Clus. bist.* 2. p. 43.

Bentveld - kruid. Vulgo.

In het Bent-veld buiten Haarlem.

ANGIOSPERMIA.

RHINANTHUS.

513. RHINANTHUS corollis labio superiore com- *Crista galli*
presso brevior. *Sp.* 840. n. 3. *Gelr.* 361. *Fris.* 266. *lis.*

Pedicularis pratensis lutea, vel Crista galli. *Baub.*
pin. 163. *Comm. boll.* 86. *Morif. bist.* 3. p. 426.
f. 11. *t.* 23. *f.* 1.

Geele Ratelen of Haane-Kammen. Belg.

Horde. Rusticis.

Overvloedig in de Hooi-landen.

EUPHRASIA.

514. EUPHRASIA foliis ovatis lineatis argute denta- *officinatis.*
tis. *Sp.* 841. n. 2. *Gelr.* 364. *Fris.* 267.

Euphrasia officinarum. *Baub. pin.* 233. *Comm. boll.*
36. *Morif. bist.* 3. p. 430. *f.* 11. *t.* 24. *f.* 1.

Oogen-troost. Belg.

- β. Euphrasia ramosa pratensis, flore albo. *Boerb.*
lugcb. 1. p. 236.

Overvloedig op vochtige zandige plaatsen in de Tie-
lerwaard; in 't Graafschap Zutphen; op de Ve-
luwe; in 't Haagse-bosch, en daaromtrent in
de Duinen; te Heiloo buiten Alkmaar, by Haar-
lem, Utrecht; in Friesland in de Wouden en
op de Kley omtrent Tjum, Spannum, &c. te
Haren buiten Groningen; en elders.

Pharm. EUPHRASIAE herb.

515. EUPHRASIA foliis linearibus: omnibus ferratis. *Odontites.*
Sp. 841. n. 4. *Gelr.* 365. *Fris.* 268.

Euphrasia pratensis rubra. *Baub. pin.* 234. *Comm.*
boll. 36. *Morif. bist.* 3. p. 431. *f.* 11. *t.* 24. *f.*
10.

Tweede Oogen-troost. Belg.

Overvloedig op vochtige Zand-gronden aan de we-
gen en kanten van Koorn-landen by Uilenbus,
Enghuizen, Oldbroek, en elders in Gelderland;

166 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

op Staalduin buiten 's Hage; ook by Loosduinen, Monfter, Haarlem, Utrecht, Franeker, Zwol, en elders.

M E L A M P Y R U M.

arvenfe. 516. MELAMPYRUM spicis conicis laxis: bracteis dentato-setaceis coloratis. *Sp.* 842. *n.* 2. *Gelr.*

367.

Melampyrum purpurascente coma. *Baub.* *pin.* 224. *Comm. boll.* 72.

Triticum vaccinum. *Dod. pempt.* 541.

Paards-bloemen. Belg.

Overvloedig in de Koorn-velden by Uilenpas, Steenderen, Bronkhorst, en elders in 't Graaffschap Zutphen; ook by Thiel, Utrecht en Zwol.

pratenfe. 517. MELAMPYRUM floribus secundis lateralibus; foliorum conjugationibus remotis, corollis clausis. *Sp.* 843. *n.* 4. *Gelr.* 368. *Fris* *p.* 87.

Melampyrum luteum latifolium. *Baub.* *pin.* 243. *Comm. boll.* 73. *Morif. bist.* 3. *p.* 429. *f.* 11. *t.* 23. *f.* 3.

Geele Paards-bloemen. Belg.

Hengel. Rusticis.

Overvloedig in de Poßchen, en op ſchaduwachtige plaatfen in Gelderland, Utrecht, Friesland en Overyfel; ook in 't Haagse-bosch.

Oves ex esu hujus pinguescere testantur Rustici.

L A T H R Æ A.

Squamaria. 518. LATHRÆA caule simplicissimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido. *Sp.* 844. *n.* 4.

Orobanche, radice dentata, major. *Baub.* *pin.* 88.

Orobanche, radice dentata altius radicata, foliis & floribus albo purpureis *Mentz. pug. t.* 3. *f.* 3. *Morif. bist.* 3. *p.* 523. *f.* 12. *t.* 6. *f.* 14

In Delfland langs den Dyk tuffchen Monfter en de Hey. (Cel SCHWENCKE.)

P E D I C U L A R I S.

palustris. 519. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus cristatis calloso-punctatis, corollis labio obliquis. *Sp.*

Sp. 845. n. 1.

Pedicularis pratensis rubra elatior. Raj. hist. 700.

Pedicularis danica maxima. Lob. illustr. 147.

Oed. dan. t. 225.

Luis-kruid. Belg.

Op de Stads-weide by Harderwyk.

520. *PEDICULARIS* caule ramoso, calycibus oblongis angulatis laevibus, corollis labio cordato.

Sp. 845. n. 2. *Gelr.* 362. *Fris.* 269.

Pedicularis pratensis purpurea. Baub. pin. 163.

Comm. boll. 86.

Fistularia. Dod. pempt. 556.

Rode Raatelen, Pyp-kruid. Belg.

In vochtige zandige Wei-landen en Hei-velden op verscheide plaatsen; ook in de Veen-landen by Amsterveen.

A N T I R R H I N U M.

521. *ANTIRRHINUM* foliis cordatis quinquelobis *Cymbalaria* alternis, caulibus procumbentibus. *Sp.* 851. n.

1. *Gelr.* 358.

Cymbalaria. Baub. pin. 306. *Cam. epit.* 860.

Aan de Muuren te Nymegen, Bommel, Zutphen, Arnhem, Delft, Haarlem, Schoonhoven, Vianen, Utrecht, Ysselstein; aan de Grotten op Rosendaal buiten Arnhem; aan de ingewaterde Muuren der Bruggen by 's Hage; aan een brug te Neer-Langbroek, aan de Sluis te Vreeswyk, en aan de broeibakken op Hardenbroek in 't Sticht van Utrecht.

522. *ANTIRRHINUM* foliis ovatis alternis, caulibus *spurium* procumbentibus. *Sp.* 851. n. 3. *Gelr.* 604.

Elatine folio subrotundo. Baub. pin. 252. *Comm. boll.* 32.

Veronica femina. Dod. pempt. 42.

Te Elderik en Wehl by 't Graafschap Zutphen; in 't Haagse-Bosch; in de Beuwlonden by Haarlem, Utrecht en Zwol.

523. *ANTIRRHINUM* foliis plerisque alternis lanceolatis obtusis, caule ramosissimo diffuso. *Sp.*

852. n. 7. *Gelr.* 359.

Anti rhinum arvense minus. *Baub. pin. 212. Comm. boll. 11.*

Anti rhinum tertium. *Cam. epit. 922.*

Oed. dan. t. 502.

Klein Veld- Orant. Belg.

In de Koorn-landen en Hoven by Harderwyk, Velsen, Utrecht, Zwol, en elders.

Linaria. 524. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Sp. 858 n. 33. Gelr. 360. Fris. 270.*

Linaria vulgaris lutea, flore majore. Baub. pin. 212. Comm. boll. 67.

Ofyris. Fuchs-bist. 513. Cam. epit. 930.

Vlas-kruid, Wild Vlas. Belg.

Overvloedig langs de Duinen, en op veele plaatsen langs de wegen.

Pharm. LINARIÆ berb.

Orontium. 525. ANTIRRHINUM corollis ecaudatis, floribus subspicatis, calycibus corolla longioribus. *Sp. 860. n. 36. Gelr. 603.*

Antirrhinum arvense majus. Baub. pin. 212.

Antirrhinum sylvestre, Phyteuma. Dod. pempt. 182.

Orant, Knappers, Leeuwenbek, Kalfs-jruit. Belg.

By Keppel in 't Graafschap Zutphen, en op de Akkers langs de Duinen by s Hage.

SCROPHULARIA.

nodosa. 526. SCROPHULARIA foliis cordatis trinervatis, caule obtusangulo. *Sp. 854. n. 2. Gelr. 370. Fris. 271.*

Scrophularia nodosa foetida. Baub. pin. 235.

Comm. boll. 103. Moris. bist. 2. p. 482. f. 5. t. 8. f. 3.

Scrophularia. Cam. epit. 136. Dod. pempt. 50.

Groot Speen-kruid. Belg.

Helm-kruid. Quibusdam.

Aan ruige wallen en wegen by Tiel, te Maurik in de Betawe; te Zutphen op de Wal; by Wilp op de Veluwe; rondsom Arnhem; in 't Haagse-Bosch; in de Haarlemmer-Hout; omtrent het Orange-woud in Friesland; en elders.

Pharm.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 169

Pharm. SCROPHULARIÆ NODOSÆ f. FOETIDÆ
rad. herb.

527. SCROPHULARIA foliis cordatis obtusis petio-^{aquatica.}
latis decurrentibus, caule membranis angulato,
racemis terminalibus. Sp. 864. n. 3. Gelr. 626.

Fris. 272.

Scrophularia aquatica major. Baub. pin. 235.

Comm. boll. 104.

Betonica aquatilis. Dod. pempt. 50.

Oed. dan. t. 507.

St. Anthonis-kruid, Beek-schuim, Water-Speen-
kruid, Water-Betonie. Belg.

Aan de kanten van de Wei-steeg by Harde wyk;
aan de Slooten in de Tielerwaard; by Uilenpas
in 't Graaffschap Zutphen; by Overveen buiten
Haarlem; omtrent Kooten en Drogeham in
Friesland; in 't Haagse-Bosch; en op andere
vochtige plaatsen.

Pharm. BETONICÆ AQUATICÆ herb.

D I G I T A L I S.

528. DIGITALIS calycinis foliolis ovatis acutis, ^{purpurea.}
corollis obtusis: labio superiore integro. Sp.
866. n. 1. Gelr. 371.

Digitalis purpurea, folio aspero. Baub. pin. 243.

Digitalis purpurea. Dod. pempt. 168.

Oed. dan. t. 74.

Vingerboed-kruid. Belg.

In de Diergaarde van Billion, en aan den weg by
Middagten, Rhederoort, en elders tusschen
Arnhem en Dieren; te Lichtevoorde en Varfe-
veld in 't Graaffschap Zutphen; in een bosch
tusschen 't Huis ter Heide en Bergum in Fries-
land.

L I M O S E L L A.

529. LIMOSELLA. Sp. 881. n. 1. Gelr. 627.

Plantaginella palustris. Baub. pin. 190. Comm. boll.

89. Moris. bist. 3 p. 605 f. 15. t. 2. f. 1.

Alfne palustris exigua, flosculis albis, foliis lan-
ceolatis plantaginellæ aquaticæ instar. Mentz.

pug. 2. t. 7. f. 6. Comm. boll. 8.

L 5

Plan-^{aquatica.}

170 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

Plantago aquatica minima. *Clus. hist.* 2. p. 110.
Boerb. lugdb. 1. p. 45.

Spergula perpusilla, lanceolatis foliis. *Loef. pruss.*
 261. t. 81.

Oed. dan. t. 69.

In de vochtige Valeyen op Vlieland, en buiten Haarlem; en in een vochtig Valeykje omtrent Veldwyk buiten Harderwyk.

O R O B A N C H E.

major. 530 *OROBANCHE* caule simplicissimo pubescente, staminibus subexsertis. *Sp.* 882. n. 2. *Gelr.* 368.
Orobanche major garyophyllum olens. *Baub. pin.* 87. *Comm. boll.* 84.

Limodorum five *Orobanche.* *Dod. pempt.* 552.

Brem - Raap, Smeer - kruid. Belg.

In de Zaaï-landen op de wortels van verscheiden gewassen, veel by Hulsen buiten Nymegen; by Uilenpas en Rhenen op de wortels van de Brem, en in de Duinen buiten Haarlem en Alkmaar.

ramosa. 531. *OROBANCHE* caule ramoso, corollis quinquefidis. *Sp.* 882. n. 4. *Gelr.* 369.
Orobanche ramosa. *Baub. pin.* 88. *Comm. boll.* 84.

Orobanche. *Cam. epit.* 311.

β. *Orobanche ramosa*, floribus cæruleis. *Baub. pin.* 88. *Boerb. lugdb.* 1. p. 240.

γ. *Orobanche ramosa*, floribus subalb. dis. *Baub. pin.* 88. *Boerb. lugdb.* 1. p. 240.

In de Duinen tusschen de Helm, en by Heemstede.

C L A S S I S X V.

TETRADYNAMIA.

S I L I C U L O S A.

M Y A G R U M.

532. MYAGRUM filiculis biarticulatis monospermis, *perenne*.
foliis extrorsum sinuatis denticulatis. *Sp.* 893.

n. 1. (*Gelr.* 404.)

Rapistrum monospermum. *Baub. pin.* 95. *prodr.*
37. *t.* 37.

Aan de Zeekant by Harderwyk.

533. MYAGRUM filiculis obovatis pedunculatis poly-*sativum*.
spermis. *Sp.* 894. *n.* 6. *Gelr.* 372.

Myagrum sativum. *Baub. pin.* 109.

Camelina f. Myagrion. *Dod. pempt.* 532.

Vlas-Dotter. Belg.

Uit en tuit Vulgo.

Komt van zelf voort uit 't Zaad, onder 't Vlas; en
word veel gezaait in Twello by Deventer.

D R A B A.

534. DRABA scapis nudis, foliis subferratis. *Sp.* 890. *verna*.
n. 2. *Gelr.* 381. *Fris* 273.

Bursa pastoris minor, loculo oblongo. *Baub. pin.*

108. *Comm. boll.* 18 *Morif. bist.* 2. *p.* 305. *f.* 3.

t. 20. *f.* 6.

Paronychia vulgaris. *Dod. pempt.* 112.

A-

Alysson vulgare, polygoni folio, caule nudo.
Tourn. inst. 217. *Boerb. lugdb.* 2. p. 4. n. 9.

Vroegeeling. Belg.

2. Alysson vulgare, polygoni folio, loculo rotundo.
Boerb. lugdb. 2. p. 4. n. 10.

3. Alysson vulgare, polygoni folio trifido. *Boerb. lugdb.* 2. p. 4. n. 11.

Veel in de Duinen, en op dorre zandige plaatsen.

L E P I D I U M.

petraeum. 535. *LEPIDIUM* foliis pinnatis integerrimis calyce minoribus. *Sp.* 899. n. 7.

Nasturtium alpinum tenuissime divisum. Baub. pin. 105.

Nasturtium pumilum vernal. Baub. pin. 105.
Boerb. lugdb. 2. p. 8.

Cardamine pusilla saxatilis montana discoides. Col. ecphr. 1. p. 274. t. 273.

† *Volgens BOERHAAVE.*

latifolium. 536. *LEPIDIUM* foliis ovato-lanceolatis integris serratis. *Sp.* 899. n. 11.

Lepidium latifolium. Baub. pin. 97. *Comm. boll.* 65.

Lepidium plinii. Dod. pempt. 716.

Oed. dan. t. 557.

Peper-kruid. Belg.

In sommige Moes-boven; in de Zee-Duinen by de Vuurbaak van Wyk op Zee; en omtrent de kanten van sommige Slooten by Haarlem.

rudérale. 537. *LEPIDIUM* floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integerrimis. *Sp.* 900 n. 14. *Gehr.* 374. *Jngr.* 102. *Fris.* 274.

Nasturtium sylvestre, osyridis folio. Baub. pin. 105. *Comm. boll.* 80. *capsulis minimis. Moris. hist.* 2. p. 301. f. 3. t. 19. f. 7.

Oed. dan. t. 184.

Klein Bezem-kruid. Belg.

Buiten Arnhem by de wegen; by Amsterdam aan de Dyken; in Friesland aan de Westkant van Stavoren dicht aan Zee, by Vulnis-boopen.

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 173

T H L A S P I.

538. *THLASPI* siliculis orbiculatis, foliis oblongis *arvense*.
dentatis glabris. *Sp.* 901. *n.* 2. *Gelr.* 378. *Fris.*

p. 87.

Thlaspi arvense, siliquis latis. *Baub.* *pin.* 105.
Comm. boll. 109.

Thlaspi latius. *Dod. pempt.* 712.

Boere-Kers, *Vissel-kruid*. Belg.

In de Zaaï-landen en Moesboven; veel op den Haek
achter 's Gravezande.

Pharm. THLASPIOS sem.

539. *THLASPI* siliculis subrotundis, foliis sagittatis *campestre*.
dentatis incanis. *Sp.* 902. *n.* 6. *Gelr.* 379.

Thlaspi arvense, vaccariæ folio incano, majus.

Baub. pin. 106. *Comm. boll.* 109.

Thlaspi latifolium. *Fuchs. bist.* 306.

Boere-Kers. Belg.

Tusschen Amersfoort en Nykerk, en by Zwol.

Pharm. THLASPIOS sem.

540. *THLASPI* siliculis obcordatis, foliis radicali- *Bursa pas-*
bus pinnatifidis. *Sp.* 903. *n.* 10. *Gelr.* 380. *Fris.* *toris.*

275.

Bursa pastoris. *Dod. pempt.* 103.

Bursa pastoris major, folio sinuato. *Baub. pin.* 108.

Comm. boll. 18.

Tasjes - kruid, *Beursjes - kruid*, *Harders - Tasjes*.
Belg.

Moeders - Tasjes. *Ultrajectinis.*

- β. *Bursa pastoris major*, folio non sinuato. *Baub. pin.*
108. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 9.

- γ. *Bursa pastoris major*, folio sinuato eleganti instar
coronopi repentis. *Baub. pin.* 108. *Boerb. lugdb.*
2. *p.* 9.

- δ. *Bursa pastoris major media.* *Baub. pin.* 108. *Boerb.*
lugdb. 2. *p.* 9.

By de Wegen en in de Hoven.

Pharm. BURSE PASTORIS berb.

C O C H L E A R I A.

541. *COCHLEARIA* foliis radicalibus cordato-subro- *officinalis.*
tundis, caulinis oblongis subsinuatis. *Sp.* 903.

n. 1.

174 TETRADYNAMIA SILICULOSA.

n. 1. *Gelr.* 375. *Fris.* p. 87.

Cochlearia folio subrotundo. *Baub. pin.* 110. *Comm. boll.* 27.

Cochlearia. *Dod. pempt.* 591.

Oed. dan. t. 135.

Lepel-blad of Lepel-kruid. Belg.

ß. *Cochlearia major batavica erecta*, folio oblongo.
Boerb. lugdb. 2. p. 10.

Overvloedig aan de Dyken van het Y buiten Amsterdam en by Sparendam; en aan de Hierder beek by Harderwyk; veel ten westen de Leinmer aan de Zee-dyk; en langs de Duinen aan de Zee-kant by Scheveningen.

Pharm. COCHLEARIE herb. sem.

anglica. 542. *COCHLEARIA* foliis omnibus ovato-lanceolatis. *Sp.* 903. n. 2.

Cochlearia folio sinuato. *Baub. pin.* 110. *Comm. boll.* 27.

Cochlearia britannica. *Dod. pempt.* 594.

Oed. dan. t. 329.

Engelsch Lepel-blad. Belg.

Buiten Amsterdam aan het Y buiten Harderwyk; en by Scheveningen by de voorige aan het Zee-strand.

senica. 543. *COCHLEARIA* foliis hastato-angulatis: omnibus deltoideibus. *Sp.* 903. n. 3.

Cochlearia aremorica. *Tourn. inst.* 215.

Cochlearia hederæ folio. *Morif. bist.* 2. p. 308.
f. 3. t. 20. f. 3. *Boerb. lugdb.* 2. p. 10.

Thlaspi hederaceum. *Lob. ic.* 615.

Oed. dan. t. 100.

† Volgens BOERHAAVE.

Coronopus. 544. *COCHLEARIA* foliis pinnatifidis, caule depresso.
Sp. 904. n. 5. *Fris.* 276.

Ambrosia campestris repens. *Baub. pin.* 138.

Cornu cervi alterum repens. *Dod. pempt.* 110.

Oed. dan. t. 110.

Kruipend Harts-boorn, Zwynen-Kers, Varkens-Kers. Belg.

Overvloedig even buiten Franeker aan den Leeuwaarder Trekweg, en elders aan de wegen.

Pharm. CORONOPUS SYLVESTRIS herb.

545. Co-

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 175

545. *COCHLEARIA* foliis radicalibus lanceolatis cre- *Armoracia*
natis, caulinis incis. *Sp.* 904. n. 6 *Gelr.* 376.
Raphanus rusticus. *Baub.* pin. 96. *Comm. boll.* 97.
Morif. bist. 2. p. 237. f. 3. t. 7 f. 2.
Meer-Edik, Peper-Wortel, Meer-Radys. Belg.
Op 't Bouwland by Uilenpas.
Pharm. RAPHANI RUSTICANI rad.

I B E R I S.

546. *IBERIS* herbacea, foliis sinuatis, caule nudo *nudicaulis*.
simplici. *Sp.* 907. n. 12. *Gelr.* 377. *Fris.* 277.
Bursa pastoris minor, foliis incis. *Baub.* pin. 108.
Comm. boll. 18.
Bursa pastoris minor. *Dod. pempt.* 103.
Oed. dan. t. 323.
Klein Tasjes-kruid. Belg.
In de Duinen, en op oude muuren en dorre steenach-
tige plaatsen, veel buiten Harderwyk by s' Hee-
ren-Loo; buiten Haarlem op den weg naar Sparen-
dam; buiten Alkmaar op de booge landen en krof-
ten naar Heiloo; in Friesland aan de dykjes en
wegen by Balk, Bergum en 't Heerenveen.

S I L I Q U O S A.

C A R D A M I N E.

547. *CARDAMINE* foliis pinnatis incis. stipulatis, *impatiens*.
floribus apetalis. *Sp.* 914. n. 9.
Cardamine annua, exiguo flore. *Tourn. inst.* 224.
Boerb. lugdb. 2. p. 17.
Sisymbrium cardamines species quædam insipida.
Baub. bist. 2. p. 886.
Sisymbrium mortanum tenuifolium, flore musco-
so purpurascente. *Barr. rar. t.* 155.
Sium impatiens. *Alp. exot.* 331.
Nasturtium minimum annuum, flore albo. *Morif.*
bist. 2. p. 221. f. 3. t. 4. f. 1.
† Volgens BOERHAAVE.

548. *CARDAMINE* foliis pinnatis exstipulatis, foli- *parviflora*.
olis

olis lanceolatis obtusis, floribus corollatis. *Sp.*
914. n. 10.

Cardamine pratensis, parvo flore. *Tourn. inst.*
224. *Boerb. lugdb.* 2. p. 17. n. 4.

Nasturtium pratense, parvo flore. *Baub. pin.* 104.
prodr. 44.

In de Duinen op verscheide plaatsen.

hirsuta. 549. *CARDAMINE* foliis pinnatis, floribus tetrandris.
Sp. 915. n. 12. *Gelr.* 628.

Sisymbrium cardamine hirsutum minus, flore albo.
Baub. hist. 2. p. 888.

Nasturtium aquaticum minus. *Baub. pin.* 154.

*In een Tuin aan de oude Touwbaan by Harderwyk,
en te Byfel by Mulmer tusschen Harderwyk en
Elburg; in de Duinen by 's Hage; in de Boffchen
van Zandhorst; in den Haarlemmer-Hout; en
langs de wegen op zommige plaatsen.*

pratensis. 550. *CARDAMINE* foliis pinnatis: foliolis radicali-
bus subrotundis, caulinis lanceolatis. *Sp.* 915.
n. 13. *Gelr.* 385. *Jngr.* 104. *Fris.* 278.

Nasturtium pratense, magno flore. *Baub. pin.* 104.
Comm. boll. 79.

Flos cuculi. *Dod. pempt.* 592.

*Koekkoeks - bloem, Water - Violen, Klein Water -
Kers.* Belg.

Kievits - bloem. Ultrajectinis.

Pinxter - bloem. Frisiis.

β. *Cardamine pratensis*, magno flore alt. *Tourn.*
inst. 224. *Boerb. lugdb.* 2. p. 16.

γ. *Cardamine pratensis*, magno flore pleno. *Tourn.*
inst. 224. *Boerb. lugdb.* 2. p. 16.

*Veel in vochtige Wei- en Hooi-landen, en langs de
Slooten.*

amara. 551. *CARDAMINE* foliis pinnatis, axillis stoloni-
feris. *Sp.* 915. n. 14. *Jngr.* 104. *Fris.* 279.

Nasturtium aquaticum majus & amarum. *Baub.*
pin. 104. *prodr.* 45.

Nasturtium Cardamine seu Nasturtium aquaticum
flore majori elatius. *Baub. hist.* 2. p. 885.

*In de Slooten te Hulsen by Nymegen; omtrent Tjet-
jerk by de Hofstede Hanenburg in Friesland; te
Mastebroek in Overysfel; en elders.*

S I S Y M B R I U M.

352. *SISYMBRIUM* filiquis declinatis, foliis pinnatis: *Nasturtium*
 foliolis subcordatis. *Sp.* 916. *n.* 1. *Fris.* 280.
Gelr. 398.
Sisymbria Cardamine. *Fuchf. hist.* 723.
Nasturtium aquaticum supinum. *Baub. pin.* 104.
Comm. boll. 80.
Water - Kers. Belg.
Veel in de Slooten by Harderwyk en agter Ryswyk
in de Betuwe; hier en daar omtrent Tiel; om
Haarlem, en langs de Duinkant; by Holten in
Overysfel; in de laage Landen by Utrecht,
Wyk by Duurstede, en Zwol; in veele Slooten
in Friesland; en in 't Goreght buiten Groningen.
Pharm. NASTURTII AQUATICI herb.
353. *SISYMBRIUM* filiquis declinatis oblongo-ova- *sylvestre.*
 tis, foliolis lanceolatis ferratis. *Sp.* 916. *n.* 4.
Gelr. 399.
Eruca palustris, nasturtii folio, filiqua oblonga.
Baub. pin. 98. *Comm. boll.* 35.
Eruca sylvestris. *Fuchf. hist.* 263.
Water - Raket. Belg.
Veel op vochtige plaatsen in Hoorn in Overysfel;
by Uilenpas; en elders; ook in de Moes - boven.
354. *SISYMBRIUM* filiquis declinatis oblongo-ova- *amphibium.*
 tis, foliolis pinnatifidis ferratis. *Sp.* 917. *n.* 5.
Fngr. 105. *Fris.* 281.
a. Sisymbrium foliis infimis capillaceis, summis pin- *palustre.*
natifidis. *Linn. b. Cliff.* 337. *Gelr.* 632.
Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias
divisis, Baub. pin. 97. *prodr.* 38. *t.* 38. *Comm.*
boll. 97.
Wilde Water - Radys. Belg.
£. Sisymbrium foliis simplicibus dentatis ferratis. *aquaticum.*
Linn. b. Cliff. 336. *Gelr.* 631.
Raphanus aquaticus alter. Baub prodr. 38. *t.* 38.
Veel aan de kanten der Slooten, en in dezelve.
355. *SISYMBRIUM* foliis integerrimis: infimis tripin- *tenuifolium*
 natifidis; supremis integris. *Sp.* 719. *n.* 6.
Sinapi erucae folio. Baub. pin. 99. *Comm. boll.* 106
Eruca tenuifolia perennis. Baub hist. 2. *p.* 861.
 M Wild

Wild Mostaart - zaad. Belg.

Veel aan de Dyken by Amsterdam, en by de Wegen om Utrecht.

Sophia. 556. *SISYMBRIUM* petalis calyce minoribus, foliis decomposito - pinnatis. *Sp.* 920. *n.* 18. *Gelr.* 403. *Fris.* 282.

Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. Baub. pin. 105. *Comm. boll.* 80.

Sophia chirurgorum. Lob. ic. 738.

Oed. dan. t. 528.

Vuur - kruid, Sophie - kruid, Fie - kruid. Belg.

β. *Nasturtium sylvestre tenuissime divisum, folio latiore. Baub. pin.* 105.

Aan de Dyken, by de Wegen, op Kerkhoven; veel aan de Duinkant buiten Haarlem.

Pharm. SOPHIÆ herb. sem.

Irio. 557. *SISYMBRIUM* foliis runcinatis dentatis nudis, caule lævi, filiquis erectis. *Sp.* 921. *n.* 21.

Erysimum alterum filiquis erucæ. Baub. pin. 101. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 14.

Erysimum latifolium majus glabrum. Moris. hist. 2. *p.* 218. *f.* 3. *t.* 3. *f.* 3.

Irio lævis apulus erucæ folio. Col. ecphr. 1. *p.* 264. *t.* 265.

Buiten 's Hage in 't Bosch op den weg naar Scheveningen. (Cel. SCHWENCKE.) Veel by en in 't Zee - dorp ter Heide. (Cel. van ROIJEN.)

E R Y S I M U M.

officinale. 558. *ERYSIMUM* filiquis spicæ adpressis, foliis runcinatis. *Sp.* 922. *n.* 1. *Gelr.* 392. *Fris.* 283.

Erysimum vulgare. Baub. pin. 100. *Comm. boll.* 35. *Moris. hist.* 2. *p.* 218. *f.* 3. *t.* 3. *f.* 1.

Oed. dan. t. 560.

Steen - Raket. Belg.

Veel op ruwe steenachtige plaatsen, en by de wegen.

Pharm. ERYSIMI herb.

Barbarea. 559. *ERYSIMUM* foliis lyratis: extimo subrotundo. *Sp.* 922. *n.* 2. *Gelr.* 395. *Jngr.* 106.

Eruca lutea latifolia five Barbarea. Baub. pin. 98.

Barbarea. Dod. pempt. 712.

Win-

Winter-Kers. Belg.

Aan de Beeken by Harderwyk.

560. *ERYSIMUM* foliis cordatis. *Sp.* 922. *n.* 3. *Gelr.* *Alliaria.* 393. *Frif.* 284.

Alliaria. *Baub.* *pin.* 110. *Fuchf. hist.* 104. *Cam. epit.* 589. *Comm. boll.* 5.

Look zonder Look. Belg.

Overvloedig omtrent Tiel; aan de Wallen te Zutphen; en de Wal achter 's Heeren-Doelen te Arnhem; aan de Hoven by Harderwyk; buiten 's Hage op den weg naar Scheveningen; aan ruige wallen by Beverwyk, Bredenrode, Bloemendaal; in de Alkmaarder-hout; aan de Wegen by Utrecht, Franeker, Zwol; aan de Oostzyde van de Heere-weg dicht by Haren buiten Groningen, en elders.
Pharm. *ALLIARIÆ* herb.

561. *ERYSIMUM* foliis lanceolatis integerrimis, sili- *cheiranthoides.*
quis patulis. *Sp.* 923. *n.* 5. *Gelr.* 394.

Myagrum siliqua longa. *Baub.* *pin.* 109. *Comm. boll.* 78.

Camelina, *Myagrum* alterum *thlaspi* effigie. *Lob. ic.* 225.

Groote Wilde Kers. Belg.

In de Moës-hoven en Bouw-landen.

C H E I R A N T H U S.

- 562 *CHEIRANTHUS* foliis lanceolatis acutis glabris, *Cheiri.*
ramis angulatis, caule fruticoso. *Sp.* 924. *n.* 2.
Gelr. 382.

Leucojum luteum vulgare. *Baub.* *pin.* 202. *Comm. boll.* 65.

Leucojum luteum. *Dod. pempt.* 160.

Muur-bloemen, Steen-Violieren. Belg.

- ♂. *Leucojum*, pleno flore, minus. *Baub.* *pin.* 202.
Aan oude muuren op veele plaatsen. ♂. Op 't Choor
van de vervallen Ercederen-Kerk te Harderwyk.
Pharm. *CHEIRI* flor.

A R A B I S.

563. *ARABIS* foliis petiolatis lanceolatis integerrimis *thaliana.*
Sp. 929. *n.* 3. *Gelr.* 391.

M 2

Bur-

- Bursæ pastoris similis filiquosa major, seu majoribus foliis. *Baub. pin.* 108. *Comm. boll.* 19.
- β. Bursæ pastoris similis filiquosa minor, seu minoribus foliis. *Baub. pin.* 108. *Comm. boll.* 19.
- Pilosella filiquosa minor. *Tbal. berc.* 84. *t.* 7. *f.* D.
- Overvloedig in zandige Moes - boven; en op zomnige plaatsen in de Duinen.*

T U R R I T I S.

- glabra.* 564. TURRITIS foliis radicalibus dentatis hispidis; caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Sp.* 930. *n.* 1. *Fris.* 285. *Gelr.* 396.
- Brassica sylvestris, foliis circa radicem cichoraceis. *Baub. pin.* 112.
- Brassica sylvestris, foliis circa radicem cichoraceis asperis, caulibus autem adhærentibus planis seu glabris. *Morif. hist.* 2. *p.* 210. *f.* 3. *t.* 2. *f.* 22.
- In de Salker - Waard; in een donker Boschje omtrent Bontekoe in Friesland; en hier en daar op oude vervalle muuren in de schaduwe.*
- hirsuta.* 565. TURRITIS foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus. *Sp.* 930 *n.* 2. *Gelr.* 397.
- Erysimo similis hirsuta, non laciniata, alba. *Baub. pin.* 101. *prodr.* 42. *t.* 42.
- Brassica sylvestris hispida non ramosa, C. B. *Comm. boll.* 17.
- Turren - kruid. Belg.*
- Op oude Muuren te Harderwyk, Utrecht, Wyk by Duurstede.*

B R A S S I C A.

- campestris.* 566. BRASSICA radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus. *Sp.* 931. *n.* 2. *Gelr.* 388. *Fris.* 286.
- Brassica campestris perfoliata, flore albo. *Baub. pin.* 112.
- Brassica campestris perfoliata, flore luteo. *Comm. boll.* 17. *Loef. pruss.* 29.
- Oed. dan. t.* 550.
- Wilde Kool met Bladeren van Deurwas. Belg.*
- By Amsterdam, Haarlem, Alkmaar; in Friesland in*

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 181

in de Wouden; in Overysfel by Saik aan de wegen en dyken; ook van zelf in de Moes - boven en Bouw - landen.

Corolla buic semper lutea, non alba.

567. BRASSICA radice caulescente fusiformi. Sp. 931. *Napus*.

n. 3.

Napus sylvestris. Baub. pin. 95. Comm. boll. 79.

Napus seu Bunias sylvestris flore luteo. Lob. ic.

200. Cam. epit. 220.

Steek - Raapen. Belg.

Graveelzaad. Quibusdam.

By de Akkers en wegen in de Betuwe, en Noord-Holland.

Pharm. NAPI sem. Oleum, quod Raap - Olynostribus audit.

568. BRASSICA radice caulescente orbiculari depressa *Rapa*.

carnosa. Sp. 931. n. 4. Gelr. 387.

Rapa sylvestris. Raj. hist. 800.

Wilde Raapen of Knollen. Belg.

Ruben. Transylvanis

Aan de wegen by Heemstede en elders.

Pharm. RAPÆ rad.

569. BRASSICA foliis runcinatis, caule hispido, filii- *Erucastrum*

quis lævibus. Sp. 932. n. 7. Gelr. 402.

Eruca sylvestris major lutea, caule aspero. Baub.

pin. 98. Comm. boll. 35.

Eruca sylvestris. Dod. pempt. 708.

Wilde Raket. Belg.

Op Steenachtige plaatsen, en aan de Muuren te Hattem, 's Hage, Utrecht, Wyk by Duurstede, Zwol, Campen, en elders.

S I N A P I S.

570. SINAPIS filiquis multangulis toroso - turgidis *arvensis*

lævibus rostro ancipiti longioribus. Sp. 933.

n. 1. Gelr. 390. Fris. 288.

Rapistrum flore luteo. Baub. pin. 95. Comm. boll. 97.

Rapistrum. Dod. pempt. 675.

Herik. Belg.

Krodde. Frisiis.

Overvloedig in de Bouw - landen en by de wegen.

182 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

- alba.* 571. *SINAPIS* filiquis hispidis: rostro obliquo longissimo ensiformi. *Sp.* 933. n. 2.
Sinapi album, filiqua hirsuta, semine albo. *Baub. hist.* 2. p. 856.
Sinapi hortense semine albo. *Baub. pin.* 99. *Comm. boll.* 105.
Sinapi fativum alterum. *Dod. pempt.* 707.
Witte Mostaart. Belg.
In de Akkers op veele plaatsen, voornaamlyk in Noord-Holland.
Pharm. SINAPI ALBI sem.

- nigra.* 572. *SINAPIS* filiquis glabris racemo appressis. *Sp.* 933. n. 3. *Gelr.* 389.
Sinapi rapi folio. *Baub. pin.* 99. *Comm. boll.* 105.
Sinapi fativum prius. *Dod. pempt.* 706.
Mostaart. Belg.
Als vooren.
Pharm. SINAPI NIGRI sem.

R A P H A N U S.

- Raphanistrum.* 573. *RAPHANUS* filiquis teretibus articulatis lævibus unilocularibus. *Sp.* 935. n. 2. *Frisf.* 289. *Linn. amen. acad.* vol. VI. p. 448. t. 451.
Raphanistrum segetum, flore luteo vel pallido. *Keik. Rusticis.*
In de Bouw-landen op zeer veele plaatsen.

B U N I A S.

- Cakile.* 574. *BUNIAS* filiculis ovatis lævibus ancipitibus. *Sp.* 936. n. 4. *Gelr.* 384. *Frisf.* 290.
Eruca maritima latifolia italica, filiqua hastæ cuspidi simili. *Baub. pin.* 99. *Comm. boll.* 35.
Cakile serapionis. *Lob. ic.* 223.
Zee-Raket. Belg.
Aan 't Strand by Scheveningen; langs 't Zee- en Maasstrand agter 's Gravezande; in de Zee-Duinen by Wyk op Zee; aan het bängen der Duinen by Zandvoort; en elders aan de Zeekant van Holland; ook aan 't Strand buiten Stavoren, en aan de voet van 't Roode Klif.

C L A S S I S XVI.

MONADELPHIA

D E C A N D R I A.

G E R A N I U M.

575. GERANIUM pedunculis multifloris, floribus *cicutarium*.
 pentandris, foliis pinnatis incisiss obtusis, caule
 ramoso. *Sp.* 951. n. 26. *Gelr.* 407. *Fris.* 291.
 Geranium, cicutæ folio, minus & supinum. *Baub.*
pin. 319. *Comm. boll.* 44.
 Geranium septimum sive gruinum. *Dod. pempt.* 64.
Oijevaars-bek, Kraan-bals. Belg.
- β. Geranium, cicutæ folio, minus & supinum, flore
 albo. *Baub. pin.* 319. *Comm. boll.* 44.
Overvloedig in de Duinen van Holland; en in de
Bouw-landen, en by de wegen op veele plaatsen.
 β. *In de Haarlemmer-Hout.*
576. GERANIUM pedunculis multifloris, floribus *moschatum*
 pentandris, foliis pinnatis incisiss, cotyledoni-
 bus pinnatifidis. *Sp.* 951. n. 27.
 Geranium cicutæ folio, moschatum. *Baub. pin.*
 319.
 Geranium supinum. *Dod. pempt.* 63.
- γ. Geranium, cicutæ folio, inodorum. *Baub. pin.*
 319. *Boerb. lugdb.* 1. p. 266.
In de Duinen by 's Hage, en aan de wallen der
Bouw-landen agter den Kranenborg buiten Zwol.
577. GERANIUM pedunculis solitariis oppositifoliis, *phacm.*
 ca-

calycibus subaristatis, caule erecto, petalis undulatis. *Sp.* 953. n. 37.

Geranium montanum fuscum. *Baub. pin.* 318.

Geranium phæum seu fuscum, petalis rectis seu planis. *Morif. hist.* 2. p. 515. f. 3. t. 16. f. 18.

In 't Bosch van Zuilen by Utrecht, onder opgaande boomen over de poort van het Kasteel tusschen het Geranium Robertianum, Erysimum Alliaria, en andere gemeene kruiden. (*Nob. D. FABRICIUS* SIX.)

Singulare est, plantam alpinam hic spontaneam esse, quamvis notum sit plantas alpinas extra alpes solo humido delectari.

robertianum. 578. *GERANIUM* pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangulatis. *Sp.* 955. n. 45. *Gehr.* 406. *Frif.* 292.

Geranium robertianum primum. *Baub. pin.* 319. *Comm. boll.* 44.

Geranium robertianum. *Dod. pempt.* 62.

Robberts - kruid, Roode Oijevaars - bek. Belg.

Op oude Muuren, Boomen, Steenachtige gronden, in Bosschen, Heggen, Wildernissen; in 't Haagse - Bosch en in de Haarlemmer - Hout.

Pharm. GERANII ROBERTIANI herb.

Corolla plerumque rubro - purpurea, interdum alba.

molle. 579. *GERANIUM* pedunculis bifloris, foliisque floralibus alternis, petalis bifidis, calycibus muticis, caule erectiusculo. *Sp.* 955. n. 48. *Frif.* 293.

Geranium columbinum villosum, petalis bifidis purpureis. *Vaill. par.* 79. t. 15. f. 3.

Langs de Wegen by 's Hage, en veele andere plaatsen; in de Zaa - landen en aan de ruige Wallen buiten Franeker, en elders; menigvuldig aan de dykjes langs de Heereweg buiten Groningen.

dissectum. 580. *GERANIUM* pedunculis bifloris, foliis quinque-partito - trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villosis. *Sp.* 956. n. 49.

Geranium batrachiodes, Collum gruis germanorum. *Baub. pin.* 319.

Geranium columbinum majus, foliis imis longis adusque pediculum divis. *Morif. hist.* 2. p. 511. f. 5.

f. 5. t. 3. f. 3. Vaill. par. t. 15. f. 2. optima.
Zeer veel tegens de Kaë-dyk van de Meerburger-
Watering buiten Leiden. (Cel. D. van ROYEN.)
In de Wei-landen by 't Huis te Marquette, en
de Hofstede Vegeltroom niet verre van Maarssen.
(Nob. D. FABRICIUS SIX.)

581. GERANIUM pedunculis bifloris folio longiori- *columbi-*
 bus, foliis quinquepartito-multifidis, arillis *num.*
 glabris, calycibus aristatis. *Sp. 956. n. 51. Frisf.*
294.

Geranium columbinum, foliis dissectis, pediculis
florum longissimis. Vaill. par. 79. t. 15. f. 4.
Op ruwe plaatsen by Haarlem, Franeker, en elders.

582. GERANIUM pedunculis bifloris, petalis subin- *rotundifo-*
 tegris longitudine calycis, caule prostrato, fo- *lium.*
 liis reniformibus incis. *Sp. 957. n. 53. Gelr.*
405. Frisf. 295.

Geranium folio malvæ rotundo. Baub. pin. 318.

Comm. boll. 44.

Pes columbinus. Dod. pempt. 61.

Duive-Poot. Belg.

By de wegen op zandige plaatsen.

P O L Y A N D R I A.

A L T H Æ A.

583. ALTHÆA foliis simplicibus tomentosis. *Sp. 966. officinalis.*
n. 1. Gelr. 410.

Althæa dioscoridis & plinii. Baub. pin. 315. Comm.
boll. 8.

Althæa, Ibiscus. Dod. pempt. 655.

Oed. dan. t. 530.

Heems-wortel. Belg.

- β. Althæa folio rotundiori, aut minus acuminato.
Boerb. lugdb. 1. p. 269.

In Gelderland by Doornspyk, Oen, Westervoor-
de, Lathum, &c. aan de dyken van Maas en
Waal; in Zuid-Holland by 's Gravezande langs
den binnendyk; in Noord-Holland by Alkmaar

in de Huijer-Waart, tuffchen Koedyk en St. Pancras; aan de Alkmaarder-vaart; aan den dyk by Schermerhorn; aan den Zaan over Knollendam; op verfcheide plaatfen by Enkhuiſen; overvloedig in Waterland langs bet Y kant; ook in Overyſſel by Zwol, Campen, en elders.
Pharm. ALTHÆÆ rad. herb. flor. ſem. far.

M A L V A.

- rotundifolia.* 584. MALVA caule proſtrato, foliis cordato-orbiculatis obſolete quinquelobatis, pedunculis fructiferis declinatis. *Sp.* 969. n. 11. *Gelr.* 409. *Jngr.* 110. *Friſ.* 296.
Malva ſylveſtris, folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 314. *Comm. boll.* 71.
Malva ſylveſtris pumila. *Fuchſ. hiſt.* 508. *Dod. pempt.* 653.
Kleine Malowe of Kaasjes-kruid. Belg.
Aan de Wegen en Dyken.
- ſylveſtris.* 585. MALVA caule erecto herbaceo, foliis ſeptemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilofis.
Sp. 969. n. 13. *Gelr.* 408. *Friſ.* 297.
Malva ſylveſtris, folio ſinuato. *Baub. pin.* 314. *Comm. boll.* 71.
Malva ſylveſtris procerior. *Dod. pempt.* 653.
Malowe, Kaasjes-kruid. Belg.
Op ruwe ongebouwde en ſteenachtige plaatfen.
Pharm. MALVÆ rad. herb. flor. ſem.

C L A S S I S XVII.

D I A D E L P H I A.

H E X A N D R I A.

F U M A R I A.

586. FUMARIA caule simplici, bracteis longitudine *bulbosa*.
 florum. *Sp.* 983. *n.* 3. *Gelr.* 411.
 Fumaria bulbosa radice non cava minor. *Baub.*
pin. 144. *Comm. boll.* 39.
 Radix cava minor *Dod. pempt.* 327.
Boontjes - Holwortel. Belg.
Vogeltjes. Vulgo.
In de Bosschadien by Deutecom en Enghuysen in 't
Graaffschap Zutphen; by Zeddam in 't Graaffschap
's Heerenberg; in 't Haagse-Bosch; en in de
Haarlemmer-en Alkmaarder-Hout.
 Pharm. ARISTOLOCHIAE CAVE rad.
587. FUMARIA pericarpis monospermis racemosis, *officinalis*.
 caule diffuso. *Sp.* 984. *n.* 7. *Gelr.* 412. *Frisf.*
 298.
 Fumaria officinarum & dioscoridis. *Baub. pin.* 143.
Comm. boll. 39.
 Fumaria. *Dod. pempt.* 59.
Duive - Kervel, Aard - Rook, Grysecom. Belg.
Koe-gras. Mosa-Trajectinis.
- β. Fumaria officinarum, foliis caësis, flore dilute
 rubello. *Boerb. lugdb.* 1. p. 308.
In de Zaai-landen en Moesboven.

Pharm.

Pharm. FUMARIÆ herb. sem.

spicata. 588. FUMARIA pericarpiis monospermis spicatis, caule erecto, foliolis filiformibus. *Sp.* 985. n. 8. Fumaria minor tenuifolia. *Baub. pin.* 143. Fumaria minor tenuifolia præcox, semine lini. *Morif. hist.* 2. p. 262. f. 3. t. 12. f. 13. *In de Duinen* by Catwyk en Wassenaar. (*Hortulanus* MEERBURG.)

claviculata 589. FUMARIA filiquis linearibus, foliis cirrhiferis. *Sp.* 884. n. 10. *Gelr.* 213. *Fris.* 299. Fumaria claviculis donata. *Baub. pin.* 143. *Comm. boll.* 39. *Morif. hist.* 2. p. 266. f. 3. t. 13. f. 3. *Op schaduwachtige zandige plaatfen in Hulshorst en te Lovenich* by Harderwyk; *op Princen-Loo*; *by Haarlem, Utrecht*; *op den Berg* by Rhenen; *ontrent Oenkerk, Oudkerk, Heerenveen, Mildam, Bergum, in Friesland*; ook buiten Groningen.

O C T A N D R I A.

P O L Y G A L A.

vulgaris. 590. POLYGALA floribus cristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Sp.* 986. n. 2. *Gelr.* 414. *Fris.* 300. Polygala vulgaris. *Baub. pin.* 215. *Comm. boll.* 90. *Vaill. par. t.* 32. f. 2. Flos ambervalis. *Dod. pempt.* 273. *Oed. dan. t.* 516. *Kruis-bloem.* Belg. *Op Hei-velden* by Hulsen buiten Nymegen; *op de Stads-weide* by Harderwyk; *overvloedig in de Duin-valeeyen van Holland*; *op dorre velden* by Heerenveen, Orange-woud, Dragten, Ureterp, en Sygerswolde in Friesland; ook by Zwol, en elders. *Variat corolla cærulea, violacea, purpurascens, carnea & alba. Variat et staminum numero ab octo ad de-*

decem. Planta apud nos plerumque procumbens.

D E C A N D R I A.

S P A R T I U M.

591. SPARTIUM foliis ternatis solitariisque, ramis *scoparium.*
inermibus angulatis. *Sp.* 996. *n.* 8. *Gelr.* 415.

Fris. 301.

Genista angulosa & scoparia. *Baub. pin.* 305. *Comm.*
boll. 43.

Genista. *Dod. pempt.* 761.

Oed. dan. t. 313.

Brem, Brem-Kappers. Belg.

Veel omtrent Uilenpas, Keppel, 't Huis t' Velde,
Harderwyk, Wageningen, 's Heeren - Loo,
Haarlem, *in de Duinen by* Noordwyk, Wester-
hout, *Zorgvliet, Egmond op den Hoef en*
Bergen; aan de Wegen by Utrecht, Driebergen,
Rhenen; in de Wouden in Friesland; *te Onnen,*
by Harender - moolen; *en op de* Mickelhorst
buiten Groningen; *op de Heide by* Goor, *en*
elders.

Pharm. GENISTÆ herb. flor. sem.

Semina a nostratibus condiuntur, & loco Capparidum
acetariis inserviunt.

G E N I S T A.

592. GENISTA foliis lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis. *Sp.* 998. *n.* 8. *Gelr.* 416.

Genista tinctoria germanica. *Baub. pin.* 395.

Genista tinctoria. *Dod. pempt.* 763.

Gemeene Akker - Brem. Belg.

In de Landen by den Ouden Yssel omtrent Keppel
en Uilenpas; *in de Duinen by* Westerhout; *op*
de Heide in Friesland, Groningen, *en te* Heem-
ze in Overysfel.

593. GENISTA spinis simplicibus, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis, *Sp.* 999. *n.* 11. *Fris.*
302.

Ge-

Genista minor asphaltioides. *Baub. pin. 395. prodr.*
157. *Comm. boll. 43.*

Genistella. *Dod. pempt. 760.*

Kleine Stekende Brem. Belg.

Heuckel - doorn. Zutphanienfibus.

Steekel - Heide. Groninganis.

Katten - doorn. Vulgo.

Veel op Hei - velden omtrent Uilenpas, Harderwyk, Naarden, Utrecht, Zwol; in veele Woudplaatzen in Friesland; op 't Heideveld by Haren in 't witte Veen, en by Harender - Moolen buiten Groningen.

COMMELINUS confundit synonyma hujus & sequentis speciei.

germanica. 594. *GENISTA* spinis compositis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Sp. 999. n. 12.*

Genista spinosa minor germanica. *Baub. pin. 395.*

Comm. boll. 43.

Genistella spinosa. *Riv. tetr. t. 67.*

Gaspel - doorn. Belg.

Op Muiderberg.

U L E X.

europæus. 595. *ULEX* foliis villosis acutis, spinis sparsis. *Sp. 1045. n. 1.*

Genista spinosa major, longioribus aculeis. *Baub. pin. 394.*

Genista spinosa. *Dod. pempt. 759.*

Op Zuideras in 't Graafschap Zutphen; op de Heide by Mentenberg en Valkenhuisen, buiten Arnhem; en in den Aardenhout by Haarlem.

O N O N I S.

aryensis. 596. *ONONIS* floribus racemosis geminatis, foliis ternatis: superioribus solitariis, ramis inermibus subvillosis. *Sp. 1006. n. 2. Gelr. 418. Fris. 303.*

spinosa. α. *Anonis spinosa, flore purpureo.* *Baub. pin. 389. Comm. boll. 11.*

Anonis. *Dod. pempt. 743.*

Stal - kruid, Prang - wortel. Belg.

Woert - baak. Rusticis.

β. *Anonis spinosa, flore albo.* *Baub. pin. 389. Boerb. lugdb. 2. p. 33.*

γ. *Ano-*

γ. *Anonis spinis carens purpurea*. *Baub. pin.* 389. *mitis*.
Comm. boll. 11.

Anonis mitior. 1. *Clus. hist.* 99.

Stal-kruid zonder doornen. Belg.

α & γ. Aan de kanten der zandige Bouw-landen op
veele plaatsen; ook aan den Yssel-dyk in Gelder-
land en Overysfel; aan de Maas-en Zee-Dyken
achter s' Gravezande en by Monster; aan de
Zyp-dyk in Noord-Holland; aan de Lek-dyk
by Wyk te Duurstede. β. Omtrent Doesburg,
s' Gravezande, Monster.

Pharm. ONONIDIS rad.

Plantæ inermes γ. æstate spinosæ evadunt.

A N T H Y L L I S.

597. *ANTHYLLIS herbacea*, foliis pinnatis inæqua- *Vulneraria*
libus, capitulo duplicato. *Sp.* 1012. n. 2.

Anthyllis leguminosa belgarum. *Lob. ic.* 2. p. 87.

Loto affinis vulneraria pratensis. *Baub. pin.* 332.

Lagopodium flore luteo. *Tabern. ic.* 925.

Wond-kruid. Belg.

In de Duinen buiten 's Hage, over Velsen, en
tusschen Egmond op den Hoef en Bergen.

L A T H Y R U S.

598. *LATHYRUS pedunculis unifloris*, cirrhis aphyll- *Aphaca*
lis, stipulis sagittato-cordatis. *Sp.* 1029. n. 1.

Vicia lutea, foliis convolvuli minoris. *Baub. pin.*
345.

Aphaca. *Lob. ic.* 2. p. 70.

Op de nieuwe plantagie langs de Maas by Rotter-
dam. (D. RAINVILLE.)

599. *LATHYRUS pedunculis multifloris*, cirrhis di- *tuberosus*
phyllis: foliolis ovalibus, internodiis nudis. *Sp.*
1033. n. 15. *Gelr.* 421.

Lathyrus arvensis repens tuberosus. *Baub. pin.*
344. *Comm. boll.* 64.

Terræ glandes. *Dod. pempt.* 550.

Aard-Aakers. Belg.

Overvloedig in de Zaaï-en Koorn-landen in Gel-
derland, 't Sticht van Utrecht en Overysfel;
in de Heggen om Wyk by Duurstede; ook hier en
daar

daar op de *Akkers* by 's Gravenhage, dog zeldzaam.

pratensis. 600. *LATHYRUS* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis: foliolis lanceolatis. *Sp.* 1033. n. 16. *Gelr.* 422. *Fris.* 305.

Lathyrus sylvestris luteus, foliis viciæ. *Baub. pin.* 344. *Comm. boll.* 65.

Lathyrus luteus sylvestris dumetorum. *Baub. hist.* 2. p. 304.

Oed. dan. t. 527.

Geele Wikken. Belg.

Linzen. Groningans.

Op schaduwwachtige plaatsen, en aan de kanten der Zaaï- en Koorn-landen by Uilenpas, 's Heeren-Loo, 's Gravenhage, Utrecht; in den Aardenhout op den weg naar Overveen; in de Wouden en op de Kley in Friesland; in 't Goreght om Groningen; en elders.

sylvestris. 601. *LATHYRUS* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. *Sp.* 1033. n. 17.

Lathyrus sylvestris major. *Baub. pin.* 344.

Lathyrus sylvestris. *Clus. hist.* 2. p. 129. *Dod. pempt.* 523.

Oed. dan. t. 525.

Op de Duinen by 's Gravenhage. (*Cel. SCHWENCKE.*)

latifolius. 602. *LATHYRUS* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Sp.* 1033. n. 18. *Gelr.* 629.

Lathyrus latifolius. *Baub. pin.* 344.

Lathyrus major latifolius, flore purpureo speciosior. *Baub. hist.* 2. p. 303.

Tros-Lathyrus, *Bouquet-Lathyrus.* Vulgo.

Langs de Heggen by Uilenpas, en overvloedig op den Haak by 's Gravezande.

V I C I A.

Cracca. 603. *VICIA* pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris. *Sp.* 1035. n. 5. *Gelr.* 423. *Fris.* 306.

Vi-

Vicia multiflora. *Baub. pin.* 345. *Comm. boll.* 114.
Vicia perennis multiflora spicata cærulea sepiaria.
Morif. hist. 2. p. 61. f. 2. t. 11. f. 1.
Cracca. Riv. tetr. 49. *Rupp. jen.* 212.
Wilde Wikken of Vitzen, Nacht-Wikken. Belg.
In de Koorn-landen, en aan ruige Wallen op veele
plaatsen.

604. *VICIA* leguminibus sessilibus subbinatis erectis, *fativa*.
 foliolis retusis, stipulis notatis. *Sp.* 1037. n. 10.
Gelr. 424. *Fris.* 307.

Vicia sativa vulgaris, semine nigro. *Baub. pin.* 344.
Comm. boll. 114.

Vicia vulgaris fativa. *Baub. hist.* 2. p. 310.
Oed. dan. t. 522.

Wikken. Belg.

6. *Vicia vulgaris, acutiori folio, semine parvo ni-*
gro. *Baub. pin.* 345. *Boerb. lugdb.* 2. p. 43.

7. *Vicia semine rotundo nigro.* *Baub. pin.* 344.
Craccae primum genus. *Dod. pempt.* 542.

In de Koorn- en Bouw-landen.

605. *VICIA* leguminibus sessilibus solitariis erectis *lathyroides*.
 glabris, foliolis senis: inferioribus obcordatis.

Sp. 1037. n. 11.

Vicia minima, radice granulosa breynii. *Comm.*
boll. 115. *amst.* 364.

Vicia minima. *Riv. tetr.* 169.

Vicia lathyroides, purpureo - cæruleis floribus.
Herm. par. 242. t. 242.

Oed. dan. t. 58.

Op de Duinen by Catwyk, en buiten Haarlem;
en op dorre plaatsen by Naarden.

Nonnullæ hujus speciei plantæ radice granulata
gagent.

606. *VICIA* leguminibus pedicellatis subquaternis *sepium*.
 erectis, foliolis ovatis integerrimis: exteriori-
 bus decrescentibus. *Sp.* 1038. n. 15. *Gelr.* 425.
Fris. 308.

Vicia sepium, folio rotundiore acuto. *Baub. pin.*
 345. *Comm. boll.* 114.

Vicia. *Dod. pempt.* 531.

Vitzen, Kleine wilde Wikken, Rinkel - Wikken.
 Belg.

By de Wegen, en in de Akkers.

E R V U M.

tetraspermum. 607. ERVUM pedunculis subbifloris, seminibus globosis quaternis. *Sp.* 1039. n. 2.

Vicia segetum, singularibus filiquis glabris. *Baub. pin.* 345.

Vicia minor segetum, cum filiquis paucis glabris. *Morist. bist.* 2. p. 64. f. 2. t. 4. f. 16.

Oed. dan. t. 95.

Aan de kant van een Sloot op Zandhorst; en in de Zaai-landen tusschen Utrecht en Maarssen. (*Nob. D. FABRICIUS SIX.*)

hirsutum. 608. ERVUM pedunculis multifloris, seminibus globosis binis. *Sp.* 1039. n. 3. *Gelr.* 436. *Fris.* 310.

Vicia segetum cum filiquis plurimis hirsutis. *Baub. pin.* 345.

Cracca minor. *Tabern. ic.* 507.

Kleine Crock. Belg.

In de Koorn-en Bouw-landen.

O R N I T H O P U S.

perpusillus. 609. ORNITHOPUS foliis pinnatis, leguminibus incurvatis. *Sp.* 1049. n. 1. *Gelr.* 438. *Fris.* 311.

Ornithopodium majus. *Faub. pin.* 350. *Comm. holl.* 84. *Morist. bist.* 2. p. 124. f. 2. t. 10. f. 13.

Vogel-voet, Vogel-pootjes. Belg.

β. Ornithopodium minus. *Baub. pin.* 350. *Comm. holl.* 84.

Ornithopodium perpusillum. *Dalech. bist.* 487.

γ. Ornithopodium radice tuberculis nodosa. *Baub. pin.* 350. *Boerb. lugdb.* 2. p. 50.

In de Bouw-en Zaai-landen, op dorre zandige plaatsen, by Hillegom, Franeker, Groningen, &c. α. by Harderwyk, op de Heerlykheid Roozendaal by Arnhem; aan de Arnhemse-berg by Wageningen; langs de Wegen in 't Duin by 's Hage en Alkmaar; in de Wouden in Friesland; ook by de Wegen omtrent Zwol.

TRIFOLIUM.

610. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis di-*M. officina-*
 spermis rugosis acutis, caule erecto. *Sp.* 1078. *415.*
n. 4. Gelr. 454. Fris. 312.

Trifolium odoratum f. Melilotus. *Dod. pempt. 567.*

Melilotus officinarum germaniæ. *Baub. pin. 331.*

Comm. boll. 73. 1

Welriekende Klaveren, Melote, Mallote. Belg.

β. Melilotus officinarum germaniæ, flore albo. *Baub.*
pin. 331. Comm. boll. 73.

Witte Mallote. Belg.

In Gelderland by Tiel, Zutphen, Doesburg, Twel-
lo, &c.; aan de Maas - dyk by 's Gravezande; aan
de Munder - dyk buiten Amsterdam; in Friesland
buiten Leeuwaarden, en tusschen Pinjum en Wit-
marfum, oek op eenige ruige plaatsen in de Wou-
den; en overloedig langs den Yssel - Dyk buiten
Campen.

Pharm. MELILOTI flor.

611. TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, legumini-*repens-*
 bus tetraspermis, caule repente. *Sp.* 1080. *n. 12.*

Gelr. 431. Fris. 313.

Trifolium pratense album. *Baub. pin. 327. Comm.*
boll. 111.

Trifolium pratense. *Till. ic. 103.*

Witte Veld - Klaver. Belg.

β. Trifolium quadrifolium hortense album. *Baub. pin.*
327. Boerb. lugdb. 2. p. 31.

Overloedig in de Wei-landen, en aan Wallen en
Wegen.

612. TRIFOLIUM spicis globosis subvillosis, cinctis *pratense.*

stipulis oppositis membranaceis, corollis mono-

petalis. Sp. 1082 n. 19. Gelr. 433. Fris. 314.

Trifolium pratense purpureum. *Baub. pin. 327.*

Comm. boll. 111.

Trifolium pratense. *Cam. epit. 582. Dod. pempt.*
565.

Rode Klaver, Beemd - Klaver. Belg.

Varkens - Klaver. Rusticis.

β. Trifolium purpureum majus, foliis longioribus &
 angustioribus, floribus saturatoribus. *Boerb.*
lugdb. 2. p. 31.

By de voorgaande.

- arvense.* 613. *TRIFOLIUM* spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis villosis æqualibus. *Sp.* 1083. *n.* 25. *Gelr.* 432. *Fris.* 315.

Trifolium arvense humile spicatum sive Lagopus.
Baub. pin. 328. *Comm. boll.* 112.

Lagopus. Dod. pempt. 577.

Haaze-pootjes. Belg.

Te Maurik op den Bikkelenberg in de Betuwe; langs de Hierder-weg, en in de zandige Bouw-landen buiten Harderwyk, Zutphen, Haarlem, Alkmaar; in de Duinen en in 't Haagse-Bosch; in Friesland in de Wouden omtrent Bergum, Zuiderhuysum, Heerenveen, Dragten, en elders; ook omtrent Zwol.

- resupinatum.* 614. *TRIFOLIUM* spicis subovatis, corollis supinatis, calycibus inflatis dorso gibbis, caulibus prostratis. *Sp.* 1086. *n.* 35. *Gelr.* 429.

Trifolium pratense folliculatum. Baub. pin. 329.

Trifolium folliculatum f. vesicarium minus purpureum. Baub. bist. 2. p. 379.

Aan den Ouden-Yssel by Uilenpas.

- fragiferum* 615. *TRIFOLIUM* capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. *Sp.* 1085. *n.* 37. *Gelr.* 428. *Fris.* 316.

Trifolium fragiferum friscum. Baub. pin. 329.

Clus. cur. app. 38. *t.* 39. *Comm. boll.* 112.

Trifolium fragiferum. Vaill. par. 195. *t.* 22. *f.* 2.

Klaver met Beziën. Belg.

Aard-Beziën Klaver. Vulgo.

By de voorgaande, en in de Wei-landen by Zandhorst, en op veele plaatsen buiten Haarlem; overvloedig langs de Maasstrand op 't Nieuwe land; en in Friesland, zoo in de Wouden als op de Kley.

- agrarium.* 616. *TRIFOLIUM* spicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis persistentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Sp.* 1087. *n.* 39. *Gelr.* 430.

Trifolium pratense luteum, capitulo lupuli vel agrarium. Baub. pin. 328. *Comm. boll.* 111.

Trifolium agrarium. Dod. pempt. 576.

Oed.

Oed. dan. t. 558.

Steen-Klaveren. Belg.

Op ruwe steenachtige en zandige gronden buiten Tiel, Harderwyk, Zwol, Campen; langs de Duinkant buiten Haarlem en 's Hage; ook in 't Haagse - Bosch; en op de Heereweg by Haren buiten Groningen.

L O T U S.

617. *Lotus* leguminibus solitariis membranaceo-filiquosus. quadrangulis, caulibus procumbentibus, foliis subtus pubescentibus. *Sp.* 1086. n. 2.
Lotus pratensis filiquosus luteus. *Baub.* pin. 332. *Boerb. lugdb.* 2. p. 37.
 Langs de Slooten by 's Gravenhage. (Cel SCHWENCKE.)

- 618 *Lotus* capitulis depressis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. *Sp.* 1092. n. 5. *Gelt.* 427. *Fris.* 317. *corniculatus.*
Lotus five *Melilotus* pentaphyllos minor glabra. *Baub.* pin. 332. *Comm. boll.* 68.
Trifolium corniculatum. 1. *Dod. pempt.* 573.
 Kleine geboorende Klaveren. Belg.
 Juffers - Schoenen. Vulgo.
 β. *Lotus* pentaphyllos, flore majore luteo splendente. *Baub.* pin. 332.
 Veel op drooge dorre plaatsen by Tiel, Harderwyk, Hattem, Utrecht, Zwol, &c.; in de Duinen van Holland; in sommige Wei-landen, en aan de Wegen in Friesland. β. Buiten Balk en elders in de Wouden.

T R I G O N E L L A.

619. *TRIGONELLA* leguminibus pedunculatis congestis declinatis subfalcatis, pedunculo longo subspinoso, caule erecto. *Sp.* 1094. n. 4. *corniculata*
Melilotus corniculis reflexis major. *Baub.* pin. 331. *Comm. boll.* 73.
Trifolium corniculatum 2. *Dod. pempt.* 573.
 Geboornde Klaveren. Belg.
 In vochtige Wei-landen, en aan de vochtige kanten van de weg tusschen Haarlem en Overveen.

M E D I C A G O.

falcata. 620. **MEDICAGO** pedunculis racemosis, leguminibus lunatis, caule prostrato. *Sp.* 1096. *n.* 6. *Gelr.* 437. *Fris.* 318.

Medica flavo flore. *Clus. hist.* 2. *p.* 243.

Trifolium sylvestre luteum, filiqua cornuta, vel *Medica* frutescens. *Laub. pin.* 330.

Oed. dan. t. 233.

Hier en daar op de Krogten by 's Hage; tusschen de Akkers aanden weg in Assendo p in Overysiel; en op zommige Velden en aan de wegen omtrent het Heereveen, en elders in Friesland.

lupulina. 621. **MEDICAGO** spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caulibus procumbentibus. *Sp.* 1097. *n.* 7. *Fris.* 319.

Trifolium pratense luteum, capitulo brevior. *Bauh. pin.* 328.

Trifolium pratense luteum *Fuchs. hist.* 819.

Geele Veld - Klaver met kleine hoofdjes. Belg.

Op de Krogten by 's Hage; in de graspaden op Zandhorst; in de Zaai-landen langs de wegen tusschen Utrecht en Maarssen; veel op Koornvelden, ook in Wei-en Moes-landen op veele plaatsen in Friesland.

polymorpha 622. **MEDICAGO** leguminibus cochleatis, stipulis dentatis, caule diffuso. *Sp.* 1097. *n.* 9. *Fris.* 320.

a. *Medica* cochleata dicarpos, capsula spinosa rotunda minore. *Morif. hist.* 2. *p.* 153. *f.* 2. *t.* 15. *f.* 11.

Slakken - kruid met Doorntjes. Belg.

In Friesland by de voorgaande, dog minder in getal. (MEESE.)

C L A S S I S XVIII.

POLYADELPHIA.

P O L Y A N D R I A.

H Y P E R I C U M.

623. *HYPERICUM* floribus trigynis, caule quadrato *quadrangulare.*
herbaceo. *Sp.* 1104. *n.* 17. *Gelr.* 439. *Fris.* 321.

Hypericum Ascyrum dictum, caule quadrangulo.

Baub. hist. 3. p. 382.

Ascyron *Dod. pempt.* 78.

Harts-Hoo. Belg.

Op vocht ge plaatsen langs de Peecken in Gelderland
en Overysfel; aan de Duinkanten in Holland;
in 't Haagse-Bosch; in de Wouden in Fries-
land; aan de Kerklaan te Haren en elders buiten
Groningen.

624. *HYPERICUM* floribus trigynis, caule ancipiti, *perforatum*
foliis obtusis pellucido-punctatis. *Sp.* 1105. *n.*
18. *Gelr.* 440. *Fris.* 322.

Hypericum vulgare. *Laub. pin.* 279. *Comm. boll.* 59.

Hypericum, *Perforata*, *Fuga demonum.* *Tabern.*
ic. 864.

St. Jans-kruid. Belg.

Jaagt den duivel. Rusticis quibusdam.

Aan de kanten der Akkers, en aan de Wegen op
veele plaatsen; ook in de Valeyen der Duinen.

Pharm. HYPERICI herb. flor. sem.

Varietatem foliis variegatis vidi circa Uilenpassiam.

humifusum. 625. HYPERICUM floribus trigynis axillaribus solitariis, caulibus ancipitibus prostratis filiformibus, foliis glabris. *Sp.* 1105. *n.* 19. *Gelr.* 630. Hypericum minus supinum, vel supinum glabrum. *Baub. pin.* 279.

Hypericum supinum III. minimum. *Clus. hist.* 2. *p.* 181.

Oed. dan. t. 141.

Klein kruipend St. Jans - kruid. Belg.

By de Sloot achter de Kampen aan 't Veld te Heemze in Overysfel.

hirsutum. 626. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis subpubescentibus. *Sp.* 1105. *n.* 21.

Hypericum Androsæmum dictum. *Baub. hist.* 3. *p.* 382.

Androsæmum hirsutum. *Baub. pin.* 280. *Comm. boll.* 10.

Androsæmum Ascyron dictum; caule rotundo hirsuto. *Morif. hist.* 2. *p.* 271. *f.* 5. *t.* 6. *f.* 11.

Ruig - Harts - Hooy. Belg.

Op vochtige gronden te Hulsen by Nymegen; in 't Bentveld aan de Duin - beken, en op andere plaatsen buiten Haarlem; ook buiten Alkmaar; in 't Sticht van Utrecht achter de Bilt; op de Borgh te Hemmen buiten Groningen.

Planta est odorata.

COMMELINUS confundit synonyma hujus & Hyperici quadranguli, nam Ascyron Dod. ad utramque plantam refert. Deinde Hypericum Ascyron dictum, caule quadrangulo J. B. non est Hypericum hirsutum, sed quadrangulare Linn. Denique Ascyrum sive Hypericum bifolium glabrum non perforatum. *Baub. pin.* 280. non est Hypericum quadrangulare, sed montanum Linnæi, qui illud *spec. pl. edit. Imæ*, pro varietate Hyperici hirsuti habuit. Vel forsan una eademque planta a Commelino bis citata est, quod eo magis credo, quia locus crescendi utriusque convenit.

comentosum 627. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ferrato-

to-glandulosi, foliis semiamplexicaulibus flexu-
osis tomentosis, caulibus prostratis. *Sp.* 1106.
n. 22. *Fris.* 323.

β. *Hypericum* supinum tomentosum majus & hispani-
cum. *Baub. pin.* 279.

Hypericum supinum tomentosum hispanicum. *Clus.*
hist. 2. p. 181.

In de eerste opvaart ten Oosten het Verlaat by de
Bontebok in Friesland. (MEESE.)

C L A S S I S XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

T R A G O P O G O N.

pratensis. 628. TRAGOPOGON calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris strictis. *Sp.* 1109. *n.* 1. *Gelr.* 452. *Fris.* 324.

Tragopogon luteum majus. *Baub.* pin. 274. *Comm. boll.* 111.

Tragopogon. *Dod. pempt* 256.

Boks-baard, *Salsafi*, *Josephs-bloemen*. Belg.

Morgenstar. Quibusdam.

In de Heerlykheid Loenen en Hemmen in de Betuwe; hier en daar om Giel; in de Meben by Harderwyk; overal in de Duinen; overvloedig aan den Ryn by Leiden; aan den Lek-dyk by Wyk te Luurstedede; aan 't voetpad tusschen Hardenbroek en Cothen, en omtrent Beverwaard in 't Sticht van Utrecht; aan den Yssel-dyk by Campen; tusschen 't Koorn op het Oude-Bilt in Friesland; en op andere plaatsen.

Hujus flores omnium primo evigilant, unde ratio nominis belgici Morgenstar.

porrifolium 629. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis. *Sp.* 1110. *n.* 3. *Fris.* 325.

Tragopogon purpureo-cæruleum, porri folio, quod

quod Artefi vulgo. *Baub. pin. 274. Moris. hist. 3. p. 8. f. 7. t. 9. f. 5.*

Aan de kanten der Koorn-landen tusschen Beetgum en Marsum in Friesland.

P I C R I S.

630. *PICRIS* perianthis laxis, folii integris, pedunculis squamatis in calycem. *Sp. 1115. n. 2. Gerl. 448.*

Cichorium pratense luteum hirsutie asperum. Baub. pin. 126. Comm. boll. 26.

Hieracium asperum, majore efflore in agrorum limitibus. Baub. hist. 2. p. 1029. Moris hist. 3. p. 69 f. 7. t. 4. f. 45.

Aan de kanten der Zaaï-landen en by de Wegen omtrent Harderwyk, Hattem, Muiderberg, Zwol, en elders; ook in de Duinen by 's Hage.

S O N C H U S.

631. *SONCHUS* pedunculis calycibusque hispidis sub-palustris. umbellatis, foliis runcinatis basi aristatis. *Sp. 1116. n. 2.*

Sonchus asper arborescens. Baub. pin. 124.

Sonchus laevior austriacus 5. altissimus. Chuf hist. 2. p. 147.

In de Riet-landen by Haarlem; in de Elsbagen te Mastenbroek in Overysfel; en elders op ongebouwde plaatsen.

632. *SONCHUS* pedunculis calycibusque hispidis sub-arvensis. umbellatis, foliis runcinatis basi cordatis. *Sp. 1116. n. 3. Gerl. 454. Fris. 326.*

Sonchus repens, multis Hieracium majus. Baub. hist. 2. p. 1017.

Hieracium majus, folio sonchi, vel Hieracium sonchites. Baub. pin. 126. Comm. boll. 57.

- β. *Hieracium majus, folio sonchi angustiore. Baub. pin. 126. Comm. boll. 58.*

Hieracium alterum. Dod. pempt. 639.

In kleyige Koorn-velden en Riet-landen op veele plaatsen; genoeg in de Duinen.

633. *SONCHUS* pedunculis tomentosis, calycibus solutis. glabris. *Sp. 1116. n. 5. Gerl. 453. Fris. 327.*

a. Son-

- α. *Sonchus lævis laciniatus latifolius*. *Baub. pin.* 124.
Comm. boll. 107.
Sonchus lævis. *Dod. pempt.* 643.
Haaze - Latouw, *Ganzen - Distel*, *Sogge - Distel*,
Dauw - Distel, *Haazen - Distel*. Belg.
- β. *Sonchus lævis minor*, *pauciorbus laciniis*. *Baub. pin.* 124.
Sonchus lævis latifolius. *Tabern. ic.* 190.
- γ. *Sonchus asper laciniatus*. *Baub. pin.* 124. *Comm. boll.* 107.
Sonchus asper. *Dod. pempt.* 643.
- δ. *Sonchus asper non laciniatus*. *Tourn. inst.* 474.
Comm. boll. 107.
Sonchus aspera. *Fuchf. hist.* 674.
- ε. *Sonchus lævis laciniatus latifolius*, *flore niveo*.
Baub. pin. 124. *Boerb. lugdb.* 1. p. 85.
Op ruwe plaatsfen, en in de Moes-landen en Hoven.
Pharm. SONCHI ASPERI & LÆVIS berb.

L A C T U C A.

- Scariola.* 634. *LACTUCA foliis verticalibus carina aculeatis*.
Sp. 1119. n. 4.
Lactuca sylvestris costa spinosa. *Baub. pin.* 123.
Comm. boll. 62.
Lactuca sylvestris laciniata. *Morif. hist.* 3. p. 58.
f. 7. t. 2. f. 17.
Wilde Salade, Wilde Latouw. Belg.
In de Zaai-landen op Muiderberg.

P R E N A N T H E S.

- muralis.* 635. *PRENANTHES flosculis quinis, foliis runcinatis*. *Sp.* 1121. n. 4. *Gelr.* 441.
Sonchus lævis laciniatus muralis, parvis floribus.
Baub. pin. 124.
Sonchus lævis vulgarior 2. *Clusf. hist.* 2. p. 146.
Oed. dan. t. 509.
Veel op de muuren te Schoonhoven en Zwol.

L E O N T O D O N.

- Taraxacum.* 636. *LEONTODON calycè squamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis lævibus*. *Sp.* 1122. n. 1. *Gelr.* 450. *Frisf.* 328.

Dens

SYNGENESIA POLYG. ÆQUALIS. 205

Dens leonis latiore folio. *Baub. pin. 126. Comm. boll. 31.*

Dens leonis. *Dod. pempt. 636.*

Oed. dan. t. 574.

Paarde-bloem, Hondsbloem, Paapenkruid, Kankerbloem, Mol-Salade, Pis in 't bed. Belg.

Paapen-Stoelen. Mosa Trajectinis.

β. Dens leonis angustiore folio. *Baub. pin. 126.*

Boerb. lugdb. 1. p. 88.

Veel in de Wei-landen en by de Wegen.

Pharm. TARAXACI rad. berb.

Variat etiam foliis magis minusque runcinatis.

637. LEONTODON caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. *Sp. 1123 n. 4. Gelr. 416. Fris. 329.*

Hieracium, chondrillæ folio glabro, radice succisa majus. Baub. pin. 127. Comm. boll. 58.

Hieracium quartum. Dod. pempt. 639.

β. Hieracium chondrillæ folio glabro, radice succisa minus. *Baub. pin. 128. Comm. boll. 58.*

Hieracium quintum. Dod. pempt. 639.

In de Koorn- en Weiden op veele plaatsen; ook in 't Haagse-Bosch.

638. LEONTODON calyce toto erecto, foliis dentatis integerrimis hispidis: setis furcatis. *Sp. 1124. n. 8.*

Hieracium, caule aphylo, hirsutum. Baub. hist. 2. p. 1038.

Hieracium dentis leonis folio, caulibus aphyllis glabris. Dill. Eph. nat. cur. Cent. VI. app. p. 62. t. 9. f. 18.

Picris nudo caule unifloro, foliis asperis dentatis. Hall. hist. 25.

In de Weiden en andere met gras begroeide plaatsen in de Provinciën Holland en Utrecht, en buiten Franeker; zeer gemeen in de Weiden aan de Duinkant buiten Leiden, zoo dat 'er het Duingras dikwils maar al te veel mede bezet is, als men het tot graspaden wil gebruiken.

HIERACIUM.

639. HIERACIUM foliis integerrimis ovatis subtus pilosella.

tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro. *Sp.* 1125. n. 4. *Gelr.* 444. *Jngr.* 124. *Fris.* 330.
Pilosella major repens hirsuta. Baub. pin. 262.
Comm. boll. 87.

Pilosella major. Cam. epit. 709.

Muizen - Oor, Nagel - kruid. Belg.

Overvloedig op hooge zandige plaatsen in Gelderland, Utrecht en Overysel; in de Duinen by 's Hage, Haarlem, en elders; in de Wouden in Friesland; in 't Goreght by Groningen aan de dykjes; en elders.

Auricula. 640. *HIERACIUM* foliis integerrimis lanceolatis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro. *Sp.* 1126. n. 6.

Pilosella major erecta altera. Baub. 262.

In de Duinen tusschen Hartecamp en de Zee. (Linn. b. Cliff. 388.)

murorum. 641. *HIERACIUM* caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulino minori. *Sp.* 1128. n. 17.
Hieracium murorum, folio pilosissimo. Baub. pin. 129. *Comm. boll.* 58.

Palmonaria gallica mas. Tabern. hist. 504.

Fransch Longe - kruid. Belg.

Aan de Oude muuren der Stad Utrecht, en op meer plaatsen; by de Mickelhorst aan de westkant buiten Groningen.

paludosum. 642. *HIERACIUM* caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispids. *Sp.* 1129. n. 18. *Jngr.* 123. *Fris.* 331.

Hieracium montanum latifolium glabrum minus. Baub. pin. 129. *Morif. hist.* 3. p. 69. f. 7. t. 5. f. 47.

Klein Berg - Haviks - kruid. Belg.

Aan de agterkant ten Noord-westen op de Bergummer-heide in Friesland.

umbellatum 643. *HIERACIUM* foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus subumbellatis. *Sp.* 1131. n. 28. *Gelr.* 443. *Jngr.* 124. *Fris.* 332.

Hieracium fruticosum angustifolium majus. Baub. pin. 129. *Comm. boll.* 58. *Morif. hist.* 3. p. 69. f. 7. t. 5. f. 66.

Gemeen groot Haviks - kruid. Belg.

Veel

Veel aan de dykjes en kanten der Wegen op den Es-senburg buiten Harderwyk; en omtrent Zwol; op de Duinen buiten 's Hage en Haarlem; in de Wouden in Friesland; aan de Heereweg en Oostweg by Haren buiten Groningen, en op andere plaatsen.

C R E P I S.

644. CREPIS foliis lanceolato-runcinatis sessilibus *testorum*.
lævis: inferioribus dentatis. *Sp.* 1135. *n.* 13.

Ge'r. 445.

- α. Hieracium chondrillæ folio hirsutum. *Baub.* pin.
127.

Hieracium II. *Tabern. bift.* 491. *benè.*

Hieracium foliis & facie chondrillæ. *Lob. ic.* 239.

- β. Cichorium pratense luteum lævius. *Baub.* pin. 126.
Comm. boll. 26.

Dens leonis tertia species. *Dod. pempt.* 636.

Oed. dan. t. 501.

Wilde Cicorey. Belg.

- α. *In de Herkeloer-Waard in Overysfel. β. Veel op vochtige plaatsen omtren Amsterdam en Utrecht; ook op de Duinen tusschen de Heide.*

H Y O S E R I S.

645. HYOSERIS caule diviso nudo, pedunculis in-
crassatis. *Sp.* 1138. *n.* 5. *Ge'r.* 449.

Hyoseris angustifolia. *Tabern. ic.* 180. *Eoerb.*
lugdb. I. p. 93.

Hieracium minus, folio subrotundo. *Baub.* pin.
127. *Comm. boll.* 58.

Hieracium minimum. *Clus. bift.* 2. *p.* 142.

Oed. dan. t. 201.

Veel in de Koorn-landen by Uilenpas, in Tonzel by Harderwyk, op Muiderberg, en op de Duinen agter Zorgvliet by 's Hage.

H Y P O C H Æ R I S.

646. HYPOCHÆRIS glabra, calycibus oblongis im-
bricatis, caule ramofo nudo, foliis dentato-fi-
nuatis. *Sp.* 1140. *n.* 3.

Hy-

Hypochæris chondrillæ folio, parvo flore. Vaill. act. 1721. p. 214.

Hieracium minus, dentis leonis folio oblongo glabro. Baub. pin. 127.

Oed. dan. t. 124.

In de zandige Zaaï-landen by Zandhorst, Teilingen, 't Huis te Marquette, en elders in Holland, dog nergens in Kley-landen. (Nob. D. FABRICIUS SIX.)

Solet esse glaberrima, interdum tamen villos raros in pagina superiore foliorum exhibet.

radicata. 647. *HYPOCHÆRIS* foliis runcinatis obtusis scabris, caule ramoso nudo lævi, pedunculis squamosis. *Sp. 1140. n. 4. Gelr. 447. Fris. 333.*

Hieracium, dentis leonis folio obtuso, majus. Baub. pin. 127. Comm. boll. 58. Moris. hist. 3. p. 66. f. 7. t. 4. f. 27.

Hieracium longius radiculatum. Lob. hist. 120.

Oed. dan. t. 150.

Op de Duinen agter Zorgvliet; in de zandige velden, en by de Wegen buiten Harderwyk, Haarlem, Utrecht, Zwol; in Friesland omtrent Balk, Wykel, Gorradyk, Dragten, en elders.

L A P S A N A.

communis. 648. *LAPSANA* calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *Sp. 1141. n. 1. Gelr. 455. Fris. 334.*

Lampfana. Dod. pempt. 675.

Soncho affinis, Lampfana domestica. Baub. pin. 124. Comm. boll. 107.

Oed. dan. t. 500.

By de Wegen, en in de Bouw-landen.

C I C H O R I U M.

Intybus. 649. *CICHORIUM* floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis. *Sp. 1142. n. 1. Gelr. 456.*

Cichorium sylvestre sive officinarum. Baub. pin. 126. Comm. boll. 25.

Intybus sylvestris. Cam. epit. 285.

Suikerey of Cicorey. Belg.

β. *Cichorium sylvestre, flore cæruleo, caule purpu-*

pureo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 91.

γ. *Cichorium sylvestre*, flore albo. *Baub. pin.* 126.
Boerb. lugdb. 1. p. 91.

δ. *Cichorium sylvestre*, flore rosco. *Baub. pin.* 126.
Boerb. lugdb. 1. p. 91.

In de braakleggende Koorn-velden op veele plaatsen;
op de Zaaï-landen in de Duinen; overvloedig aan
den Yssel-en Lek-dyk, en door de gantsche Be-
tuwe en Tielerwaard; ook aan den ingang van de
Sydel by Harderwyk; op de Vesting by de Geester-
poort te Alkmaar, en elders. γ. Overvloedig op
Zuideras en by 't Dorp Brummen buiten Zutphen.
Pharm. CICHOREI SYLVESTRIS rad. berb. sem.

A R C T I U M.

650. *ARCTIUM* foliis cordatis inermibus petiolatis. *Lappa.*
Sp. 1143. n. 1. *Gelr.* 457. *Frif.* 335.

Lappa major; *Arctium dioscoridis.* *Baub. pin.* 198.
Comm. boll. 63. *Morif. bist.* 3. p. 146. f. 7. t.
32. f. 1.

Kliffen, Klassen, Klitten. Belg.

Startoffen. Enchufanis.

Kladde-wortel. Quibusdam.

β. *Lappa major montana*, capitulis tomentosis. *Baub.*
pin. 198. *Comm. boll.* 63.

Berg-Klitten. Belg.

Overvloedig by de dyken en wegen, en op ruwe
plaatsen. β. Op de Vesten der Stad Amsterdam,
tusschen de Muider en Utrechtsche Poorten; en in de
Botstraat te Enckhuysen.

Pharm. *BARDANÆ* rad. sem.

S E R R A T U L A.

651. *SERRATULA* foliis dentatis spinosis. *Sp.* 1149. *arvensis.*
n. 16. *Gelr.* 462. *Frif.* 336.

Carduus vinearum repens, sonchi folio. *Baub. pin.*
377. *prodr.* 156.

Carduus in avena proventus. *Baub. pin.* 377.
Comm. boll. 21.

Cleonanthos theophrasti. *Col. ecphr.* 45. t. 45.

Haver-Distel. Belg.

β. *Carduus in avena proventus*, flore albo. *Baub.*
pin. 377.

In de Bouw-landen op verscheide plaatsen.

C A R D U U S.

lanceolatus 652. *CARDUUS* foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis: laciniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis villosis, caule piloso. *Sp.* 1149. *n.* 2. *Gelr.* 459.

Carduus lanceolatus latifolius. Baub pin. 385.
Comm. boll. 21.

Carduus lanceolatus f. sylvestris dodonæi. Baub. hist. 3. *p.* 58.

Carduus lanceolatus Tabern. ic. 699.

β. *Carduus lanceolatus latifolius, flore albo. Tourn. inst.* 440.

Langs de Wegen en Paden buiten Haarlem, en op andere plaatsen. β. Buiten Alkmaar by Egmond op den Hoef.

COMMELINUS non recte synonymum f. Baub. ab hac planta separavit.

nutans. 653. *CARDUUS* foliis semidecurrentibus spinosis, floribus cernuis: squamis calycinis superne patentibus. *Sp.* 1150. *n.* 3. *Gelr.* 460.

Carduus spinosissimus latifolius sphærocephalus vulgaris. Baub. pin. 385.

Carduus nutans. Baub. hist. 3. *p.* 56.

Carduus alatus major, flore rubro moschato, capite nutante. Moris. hist. 3. *p.* 152. *f.* 7. *t.* 31. *f.* 6.

Cirsium majus singulari capitulo magno. C. B. Comm. boll. 27.

Veel aan de Wegen en Dyken in 't Graaffschap Zutphen, en by Arnhem; by Twello op de Veluwe; aan de Duinkant by 's Hage en Haarlem; aan de Lek-dyk; en elders.

Varietatem flore roseo legi circa pagum Elst inter Neomagum & Arnhemiam.

acanthoides 654. *CARDUUS* foliis decurrentibus sinuatis: margine spinosis, calycibus pedunculatis solitariis erectis villosis. *Sp.* 1150. *n.* 4.

Carduus polyacanthos. Schreb. spicileg. 915.

Polyacantha theophrasti. Tabern. ic. 701. *fig. bona.*
Aan de Wegen, veel buiten Doesburg.

Af.

Affinis sequenti Carduo crispo, & hinc forsan pro eodem habitus. Synonyma ꝯ Baulini ab Ill. Linnæo ad hunc et sequentem Carduum relata dubia sunt.

655. **CARDUUS** foliis decurrentibus sinuatis: margine *crispis*. spinosis, floribus aggregatis terminalibus: squamis inermibus subaristatis patulis. *Sp.* 1150 *n.* 5. *Gelr.* 463. *Frif.* 337.

Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris Baub. pin. 385. Comm. holl. 21. Loef. pruss. 34. t. 5.

2. **Carduus** spinosissimus angustifolius, flore albo. *verb. lugdb. 1. p. 136.*

- γ. **Idem** flore carneo.

In de Moes - boven, by de Wegen, en op oude Muren. γ. Aan de Bronsbergen buiten Zutphen.

656. **CARDUUS** foliis decurrentibus dentatis: margi- *palustris*. ne spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. *Sp.* 1151. *n.* 6. *Gelr.* 631. *Frif.* 338.

Carduus palustris. Baub. pin. 377. prodr. 156.

Carduus spinosissimus erectus angustifolius palustris. Morif. hist. 3. p. 153. f. 7. t. 32. f. 13.

Kaale Jonker, Noeren - Rottingen. Rusticis.

In siegte Wei - landen in 't Graaffschap Zutphen, Friesland, Overysel; in de Duin - valeyen van Rasphorst, en by 't Huis te Marquette; ook langs de Slooten op veele plaatsen.

657. **CARDUUS** foliis amplexicaulibus hastato - pinna- *marianus*. tifidis spinosis, calycibus aphyllis: spinis canaliculatis duplicato - spinosis. *Sp.* 1153. *n.* 14. *Gelr.* 461.

Carduus albis maculis notatus vulgaris. Baub. pin. 381. Comm. holl. 21.

Carduus marie Dalech. hist. 1475.

Silybum nervis foliorum albis. Hall. hist. 181.

Marien - Distel, Onze Vrouwe - Distel, Melk - Distel Belg.

In de Moes. boven en by de Wegen.

Pharm. CARDUI MARIE sem.

658. **CARDUUS** foliis amplexicaulibus lanceolatis *heterophyl-* integris laciniatisque, caule subunifloro, calyce *lus*. inermi. *Sp.* 1154. *n.* 20. *Jngr.* 128. *Frif.* 339.

212 SYNGENESIA POLYG. ÆQUALIS.

Cirsium maximum, asphodeli radice. *Baub. pin.* 377.

Oed. dan. t. 160.

Overvloedig in de laage Veenachtige Wei-landen en andere Velden tusschen Tjetjerk en Bergum, en elders in de Wouden in Friesland; in Heivelden, op de Mickelhorst en elders buiten Groningen; ook aan de Kleverlaan by Haarlem.

acaulis. 659. *CARDUUS acaulis*, calyce glabro. *Sp.* 1156. *n.* 26.

Carlina acaulos, minore purpureo flore. *Baub. pin.* 380. *Comm. holl.* 23.

Chamæleon exiguus. *Trag. hist.* 852. *Baub. hist.* 3. *p.* 62.

Ever-wortel. Belg.

Op ruwe steenachtige plaatsen.

C N I C U S.

oleraceus. 660. *CNICUS* foliis pinnatifidis carinatis nudis; bracteis concavis integris subcoloratis.

Sp. 1156. *n.* 1.

Carduus pratensis latifolius. *Baub. pin.* 376. *Comm. holl.* 20.

Carduus pratensis. *Lob. ic.* 2. *p.* 11.

Beemdt- of Veld-Distel. Belg.

In vochtige Wei-landen en Velden buiten Utrecht.

O N O P O R D U M.

Acanthium. 661. *ONOPORDUM* calycibus squarrosis: squamis patentibus, foliis ovato-oblongis sinuatis. *Sp.* 1158. *n.* 1. *Gehr.* 458.

Spina alba tomentosa latifolia sylvestris. *Baub. pin.* 382. *Comm. holl.* 108. *Loef. pruss.* 261. *t.* 82.

Acanthium. *Dod. pempt.* 721.

Witte Weg-Distel Belg.

Opruwe plaatsen by Nymegen, Harderwyk, Rhennen; en aan het opgaan van de Duinen by Overveen buiten Haarlem.

illyricum. 662. *ONOPORDUM* calycibus squarrosis: squamis inferioribus uncinatis, foliis lanceolatis pinnatifidis. *Sp.* 1158. *n.* 2.

Spi-

SYNGENESIA POLYG. ÆQUALIS. 213

Spina tomentosa altera spinosior. *Baub. pin.* 382.
 Carduus tomentosus acanthi folio angustiore.
Tourn. inst. 441. *Boerb. lugdb.* 1. p. 137.
 Carduus, quibusdam dictus Acanthium illyricum.
Baub. hist. 3. p. 55.
 † *Volgens* BOERHAAVE.

C A R L I N A.

663. CARLINA caule multifloro corymbofo, flori- *vulgaris.*
 bus terminalibus, calycibus radio albo. *Sp.* 1161.
n. 4. *Gelr.* 158. *Fris.* 340.
 Carlina sylvestris vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 155.
 Cnicus sylvestris spinosior. *Baub. pin.* 378. *Comm.*
boll. 27.
Drie - Distel, Wilde Veld - Saffraan. Belg.
In de Duinen by 's Hage, Westerhout, Raaphorst,
Heemstede, &c ook in slegte landen by Uilenpas,
Zwol, in Friesland; en elders.

B I D E N S.

664. BIDENS foliis trifidis, calycibus subfoliosis, *tripartita.*
 feminibus erectis. *Sp.* 1165. *n.* 1. *Gelr.* 467.
Fris. 341.
 Cannabina aquatica, folio tripartitim diviso. *Baub.*
pin. 321. *Comm. boll.* 20.
 Hepatorium aquatile. *Dod. pempt.* 595.
Water - Boelkens - kruid. Belg.
Aan de kanten der Slooten en Graften, in Mocras-
sen, en andere vogtige plaatsen.
665. BIDENS foliis lanceolatis amplexicaulibus, flo- *cernua.*
 ribus cernuis, feminibus erectis. *Sp.* 1165. *n.* 5.
Gelr. 632. *Fris.* 342.
 Cannabina aquatica, folio non diviso. *Baub. pin.*
 321. *Comm. boll.* 20.
 Eupatorium cannabinum chrysanthemum. *Tabern.*
ic. 117.
In en aan de Slooten om de Stads - Weide by Harder-
wyk; in 't Haagse - Bosch; by Zandhorst, Mar-
quette; tusschen Haarlem en Overveen; by Ber-
gen buiten Alkmaar; en op andere plaatsen by de
voorige, dog veel minder.

214 SYNGENESIA POLYG. ÆQUALIS.

EUPATORIUM.

- cannabinum.* 666. EUPATORIUM foliis digitatis. Sp. 1173. n. 12.
Gelr. 465. *Jagr.* 130. *Fris.* 313.
 Eupatorium cannabinum. *Baub.* pin. 320. *Comm.*
boll. 36.
 Hepatorium vulgare. *Dod.* pempt. 28.
Boelkens - kruid, *Koninginne* - kruid. Belg.
Aan de kanten der slooten op veele plaatsen.
Pharm. EUPATORII CANNABINI herb.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

TANACETUM.

- vulgare.* 667. TANACETUM foliis bipinnatis incisiss serratis.
Sp. 1184. n. 7. *Gelr.* 466. *Fris.* 344.
 Tanacetum vulgare luteum. *Baub.* pin. 132. *Comm.*
boll. 109.
 Athanasia sive Tanacetum. *Dalech. hist.* 955.
Rynvaar. *Boere* - Worm - kruid. Belg.
Veel langs de Wegen.
Pharm. TANACETI herb. flör. sem.

ARTEMISIA.

- campestris.* 668. ARTEMISIA foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. Sp. 1185. n. 4.
 Artemisia tenuifolia. *Dod.* pempt. 33.
 Artemisia tenuifolia seu leptophyllos, aliis abrotanum sylvestre. *Baub.* hist. 3. p. 194. *Comm.*
boll. 13.
 Abrotanum campestre, cauliculis rubentibus.
Baub. pin. 136.
Wild - *Averuit* of *Averone*. Belg.
 β. Abrotanum campestre, cauliculis albicantibus.
Baub. pin. 136. *Foerb. lugdb.* 1. p. 127.
Langs de zandige Wegen by Arnheim, Wageningen, Rhenen, &c. in 't bängen der Duinen by Overveen, en naar Velsen.

- maritima.* 669. ARTEMISIA foliis multipartitis tomentosis, rac-

cemis cernuis, flosculis femineis ternis. *Sp.*
1186. n. 7. *Fris.* 315.

Absinthium seriphium belgicum. Baub. pin. 139.

Baub. hist. 3. p. 178. *Comm. boll.* 3.

Zee-Alsem. Belg.

Overvloedig langs de Zee-en Maas-strand achter
's Gravezande; op 't Koe-gras by de Helder;
aan de Zee-Dyken van Noord-Holland en Fries-
land; en langs 't Zee-strand te Delfzyl.

670. *ARTEMISIA* foliis compositis multifidis, flori- *Absinthium*
bus subglobosis pendulis: receptaculo villoso.
Sp. 1188. n. 14. *Gelr.* 472.

Absinthium ponticum seu romanum officinarum
seu *dioscoridis Baub. pin.* 138. *Comm. boll.* 3.

Absinthium. Cam. epit. 452.

Alsem. Belg.

β. *Absinthium inspidum, absinthio vulgari simile.*

Baub. pin. 139. *Boerb. lugdb.* 1. p. 126.

Absinthium inodorum & inspidum. Dod. pempt. 26.

Alsem zonder reuk en smaak. Belg.

Overvloedig in Gelderland by Genderingen, Uilen-
pas, 't Velde, Zuidcras, Oen, Wellsum, &c. In
Holland buiten Haarlem, Naarden, en langs de
Zee-dyken achter 's Gravezande; in 't Sticht van
Utrecht omtrent Doorn, Drybergen, Leersum;
in de Provintie Groningen aan de Oostkant van
Helper; en elders op dorre plaatsen.

Pharm. *ABSINTHII* berb. summ. sem.

671. *ARTEMISIA* foliis pinnatifidis planis incisfis sub- *vulgaris*
tus tomentosis, racemis simplicibus recurva-
tis, florum radio quinquefloro. *Sp.* 1188. n. 16.
Gelr. 471. *Fris.* 346.

Artemisia vulgaris major. Baub. pin. 137. *Comm.*
boll. 13.

Artemisia latifolia. Dod. pempt. 33.

Byvoet. Belg.

Krabbe-Klootjes. Harderovicenis.

β. *Artemisia vulgaris major, caule ex viridi albican-*
te. Baub. pin. 137. *Boerb. lugdb.* 1. p. 127.

Overvloedig buiten Tiel, Zutphen, Harderwyk,
Naarden, Haarlem, Alkmaar, Utrecht by
Zeist, &c. In Friesland omtrent Joure, Langweer,
en elders in de Wouden ook in de andere Provintien.

Pharm. ARTEMISIÆ herb.

Fumo bauritur a pueris ut Nicotiana.

- cerulea* 672. ARTEMISIA foliis caulinis lanceolatis integris: radicalibus multifidis, flosculis femineis ternis. Sp. 1189. n. 18
 Abūnthium maritimum lavendulæ folio. Baub. pin. 139. Moris. hist. 3. p. 7. f. 6. t. 1. f. 5.
Langs het Zee- en Maas- strand in Delfland (Cel. SCHWENCKE.)

GNAPHALIUM.

- luteo-album* 673. GNAPHALIUM herbaceum, foliis semiamplexicaulibus ensiformibus repandis obtusis utrinque pubescentibus floribus, conglomeratis. Sp. 1196. n. 23. Gelr. 634. Fris. 349.
 Gnaphalium majus, lato oblongo folio. Baub. pin. 263. Moris. hist. 3. p. 88. f. 7. t. 11. f. 20.
 Gnaphalium ad stoechadem citrinam accedens. Baub. hist. 3. p. 160.
 Elichrysum sylvestre latifolium, capitulis conglomeratis. Baub. pin. 264. Comm. boll. 33.
Stink-bloem, Zevenjaars-bloem. Belg.
Buiten Leiden tusſchen Katwyk en Noordwyk; aan 't Zand-pad tusſchen Cothen en Hardenbroek in 't Sticht van Utrecht; op ongebouwd Kleiland te Oldonniel in Overysfel; aan de wegen en dykjes by Nye Mirdum in Friesland.
- bioticum.* 674. GNAPHALIUM sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici, floribus divisis. Sp. 1199. n. 35. Gelr. 468. Jngr. 132. Fris. 347.
- mas.* β. Gnaphalium montanum, flore rotundiore. Baub. pin. 263. Comm. boll. 45.
 Pilosella minor. Dod. pempt. 68. fig. exterior.
- semina.* γ. Gnaphalium montanum, longiore & folio & flore. Baub. pin. 263.
 Pilosella minor. Dod. pempt. 68. fig. interior.
Katte-voet. Belg.
Rooze-kransjes. Zutphanienſibus.
Zevenjaars-bloem. Vulgo.
Veel op de Heide in Gelderland en Overysfel; in de laagstens van de Zee-Duinen agter Zorgvliet; op de

de Duinachtige beuvelen by Bredenrode buiten Haarlem; aan de Bilt buiten Utrecht; in een Bosch by Bergum, en op andere plaatsen in de Wouden in Friesland; in 't Heide-veld by Harrender-moolen buiten Groningen.

Variat corollæ colore subpurpureo, suave rubente, candido, & variegato.

Transjylani oleum floribus infusum vulneribus recentibus inungunt.

675. GNAPHALIUM caule herbaceo simplicissimo *styaticum.*
erecto, floribus sparsis. Sp. 1200. n. 39. Gelr.
633. Fris. 351.

Gnaphalium majus, angusto oblongo folio, alterum. Baub. pin. 263.

Gnaphalium rectum. Baub. bist. 3. p. 160.

Oed. dan. t. 254.

By Uilenpas in de Klaver-landen; in de Bosschen by Marquette; te Emmen in Overysfel; omtrent Zumeer en Bergum, als elders in de Wouden in Friesland, op Heide-velden, en aan sommige wegen en wallen.

676. GNAPHALIUM caule herbaceo ramosissimo *uliginosum.*
fuso, floribus confertis terminalibus. Sp. 1200.
n. 41. Gelr. 470. Fris. 350.

Gnaphalium medium. C. B. Comm. boll. 45.

Gnaphalium annuum serotinum, capitulis nigricantibus in humidis gaudens. Moris. bist. 3. p. 92.

Gnaphalio vulgari similis. Baub. bist. 3. p. 159.

Klein Reur- of Roer-kruid. Belg.

Op vochtige plaatsen by Zelhem, Uilenpas, Harderwyk, en elders in Gelderland; by de Bilt buiten Utrecht; op de Kley en in de Wouden in Friesland; ook omtrent Zwol.

III. LINNÆUS in Flor. belg. Gnaphalium medium C. B. Comm. boll. 45. habet pro Filagine arvensi; sed autopsia hanc esse plantam docet.

C O N Y Z A.

677. CONYZA foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo corymbofo, calycibus squarrosis. Sp. 1205.
n. 1.

Coryza major vulgaris. Baub. pin. 265.

O. 5.

Don-

218 SYNGENESIAPOLYG. SUPERFLUA.

Donder - kruid. Belg.
Veel buiten 's Hage.

ERIGERON.

canadense. 678. *ERIGERON* caule floribus paniculatis, hirtis, foliis lanceolatis ciliatis. *Sp.* 1214. *n.* 5. *Gelr.* 475.

Conyzella. *Dill. giss.* 160. *gen.* 142.

Conyza annua acris alba elatior, linariae foliis. *Morif. bist.* 3. *p.* 115. *f.* 7. *t.* 20. *f.* 29. *Bocc. succ.* 85. *t.* 46.

Langs de wegen by Arnhem, Harderwyk, Duurstede; in de Duinen van Raaphorst, en tusschen Velsen en Beverwyk; op de Muuren te Haarlem, &c.

Quotannis vulgatus.

acre. 679. *ERIGERON* pedunculis alternis unifloris. *Sp.* 1211. *n.* 9. *Gelr.* 474.

Conyzacærulea acris. *Baub. pin.* 265. *Comm. boll.* 28.

Amellus montanus æquilocorum. *Col. ecphr.* 2. *p.* 25. *t.* 26.

Blaauw bytend Donder - kruid. Belg.

In de Koorn - velden. ook wel op oude Muuren omtrent Haarlem en Utrecht; in de Duinen tusschen 's Hage en het Huis ten Deil by de Hofstede Eikenhorst; by Overveen, en elders.

TUSSILAGO.

Farfara. 680. *TUSSILAGO* scapo unifloro imbricato, foliis subcordatis angulatis denticulatis. *Sp.* 1214. *n.* 5. *Gelr.* 475. *Fris.* 353.

Tussilago vulgaris. *Baub. pin.* 197. *Comm. boll.* 113.

Tussilago. *Baub. bist.* 3. *p.* 163. *Morif. bist.* 3. *p.* 130. *f.* 7. *t.* 12. *f.* 1.

Oed. dan. t. 595.

Hoefblad, Paarden - klaauw. Belg.

Op veele plaatsen, alwaar klei-grond is, in de Bouwlanden en aan de Dyken.

Pharm. TUSSILAGINIS rad berb.

hybrida. 681. *TUSSILAGO* thyrso oblongo, flosculis femineis nudis.

nudis plurimis. Sp. 1214. n. 8. Gelr. 478. Fris.
351.

Petasites major, floribus pediculis longis insiden-
tibus. Dill. eltb. 309. t. 32. f. 297.

Pestilentie-wortel, *Dokke-bladen*, Belg.

Podde-bladen. Vulgo.

*Te Arnhem op de Glacis, te Westervoort op de
Schans; by Harderwyk in de Weisteeg aan de
Hoven, en omtrent Bifel; aan de Vaart tusschen
Rotterdam en Overschie; en by Delft; buiten
Utrecht tusschen Breukelen en de Nieuwersluis;
in Friesland by Herbojum, Dron-Ryp, over-
vloedig aan 't Bolwerk te Leeuwaarden; aan de
dykjes in de wittesteeg te Haren by Groningen.*

682. *TUSSILAGO thyrso ovato*, flo-culis femineis *Petasites*,
nudis paucis. Sp. 1215. n. 9. Gelr. 477.

Petasites major & vulgaris. Baub. pin. 197. Comm.
boll. 87.

Petasites. Dod. pempt. 597.

Belg. ut praecedens.

*Aan de Dyken en Wegen om Tiel, en in 't Stift
Sennewynen in de Tielerwaard; in de landen
agter Hierden buiten Harderwyk, by 't Dorp
Voorst op de Veluwe; aan den Dyk by Rotte-
dam en Gouda; te Elshout over Krimpen aan de
Lee; buiten Haarlem aan de Haazepaterslaan.*

Pharm. *PETASITIDIS* rad.

*Locus crescendi inter Breukelen & Nieuwersluis a
Commelino adsignatus pertinet ad praecedentem plan-
tam.*

S E N E C I O.

683. *SENECIO corollis nudis*, foliis pinnato-sinuatis *vulgaris*,
amplexicaulibus, floribus sparsis. Sp. 1216. n.

7. Gelr. 483. Fris. 355.

Senecio minor vulgaris. Baub. pin. 131. Comm.

boll. 105.

Erigerum minus. Dod. pempt. 641.

Oed. dan. t. 513.

Klein Grind-kruid, Kruis-kruid, Kruis-wortel.

Belg.

Schaaps-teentjes. Mosa-Trajectinis.

Zeer gemeen in de Moes-boven, en Zaai-landen,

en

en by de Wegen.

Pharm. SENECTIONIS herb.

- viscosus.* 684. SENECIO corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii. Sp. 1217. n. 12. Fris. 356.
Senecio incanus pinguis. Baub. pin. 131. Comm. boll. 105.

Senecio hirsutus viscidus graveolens. Dill. elth. 347. t. 258. f. 336.

Erigerum primum. Dod. pempt. 640.

Stinkend Kruis-kruid. Belg.

Veel aan de St. Antonis-Dyk buiten Amsterdam, en aan de Zwart-Waters-dyk.

- sylvaticus.* 685. SENECIO corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymbofo erecto. Sp. 1217. n. 13.

Senecio minor, latiore folio, sive montanus. Baub. pin. 131. Dill. elth. 258. t. 258. f. 337.

Jacobæa, senecionis folio incano, perennis. Raj. hist. 285. Hall. jen. 177. t. 3.

In Holland niet zeldzaam: word gevonden in de Bosschen van de Hofsteden Zandhorst en Marquette, en in de Zaai-landen by 't Dorp Heemskerk in Noord-Holland, en by 't Huis te Teilingen. (Nob. D. FABRICIUS SIX.)

Antecessores de hac planta mentionem non fecerunt forsitan quod eam confuderunt cum senecione viscoso.

- Jacobæa.* 686. SENECIO corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto. Sp. 1219. n. 25. Gelr. 482. Fris. 357.

Jacobæa vulgaris laciniata. Baub. pin. 131. Comm. boll. 60.

Jacobæa. Dod. pempt. 642.

St. Jacobs-kruid. Belg.

Grondbeel. Groninganis.

- β. Senecio jacobæa folio. Moris. blef. 309. Boerb. lugdb. 1. p. 117.

Overvloedig in de Wei-landen. β. Op. dorre zandgronden.

Varietas β. ex natura soli provenit, nequaquam igitur pro distincta specie, multo minus alio genere

babenda cum Matthiolo & aliis. Conf. Baub. hist.
3. p. 1057.

Varietatem foliis variegatis legi circa Uilenpassiam.

687. *SENECIO* corollis radiantibus, foliis ensiformi-^{paludifera} bus acute ferratis subtus subvillosis, caule stricto.

Sp. 1220. n. 29. Gelr. 635.

Jacobæa foliis longis integris & mucronatis. *Morif.*
hist. 3. p. 110. f. 7. t. 19. f. 22.

Conyza palustris ferratifolia. Baub. pin. 266.

Oed. dan. t. 385.

Hier en daar in de Kolken buiten Tiel; aan den Ryn by Maurik in de Betuwe; in de Droogmakeryen by Rotterdam, en elders; aan de binnen Kolken te Herkeloo in Overysfel.

688. *SENECIO* corollis radiantibus, floribus corym-^{faracenicus} bosis, foliis lanceolatis ferratis glabriusculis.

Sp. 1221. n. 32. Gelr. 481.

Solidago faracena. Dod. pempt. 141. Fuchf. hist.
728. Baub. hist. 2. p. 1062.

Virga aurea angustifolia ferrata. Baub. pin. 268.
Comm. boll. 115.

Heidens Wond - kruid. Belg.

Fanekley. Quibusdam.

Veel aan de Waal - Dyk by Nymegen en Tiel; aan de Maas - Dyken; en aan den Yssel - Dyk by Gouda, Deventer, Zwol, Campen, &c.

Pharm. SOLIDAGINIS SARACENICÆ herb.

A S T E R.

689. *ASTER* foliis lanceolatis integerrimis carnosiss^{Tripolium.} glabris, ramis inæquatis, floribus corymbosis.

Sp. 1226. n. 9. Gelr. 484. Fris. 358.

Tripolium majus cæruleum. Baub. pin. 267. Comm.
boll. 112.

Tripolium. Dod. pempt. 379.

Zee - Aster of Zee - Sterre - kruid. Belg.

- ♀. *Tripolium majus, flore albo. Comm. boll. 112.*

Veel aan de Noord - en Zuider - Zee - kant; langs de Maas agter 's Gravezande; aan den Amstel om-trent Amsterdam, en aan de Haarlemmer - Vaart; in overstroomde landen by Franeker, Bergum, Groningen, Delfzyl, &c.

222 SYNGENESIA POLYG. SUPERFLUA.

In Comm. boll. edit. 1709. Trifolium majus cæruleum legendum Tripolium majus cæruleum.

S O L I D A G O.

Virgaurea. 690. SOLIDAGO caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Sp.* 1235. *n.* 9:
Gelr. 480.

Virga aurea angustifolia minus serrata. *Baub. pin.* 268.

Virga aurea. *Dod. pempt.* 142.

Virga aurea vulgaris latifolia. *Baub. hist.* 2. p. 1062.

Gulde-Roede. Belg.

Veel in de Boffchadien aan de Nunspeeter-beek buiten Elburg; tuffchen Amerongen en Elft in 't Sticht van Utrecht, en agter den Kranenborg by Zwol.

Pharm. VIRGÆ AURÆ herb.

C I N E R A R I A.

palustris. 691. CINERARIA floribus corymbosis, foliis lanceolatis deniato-sinuatis, caule villoso. *Sp.* 1243. *n.* 6.

Othonna palustris. *Gelr.* 638. *Fris.* 371.

Conyza aquatica laciniata. *Baub. pin.* 266. *Comm. boll.* 28:

Conyzæ mediæ species altera. *Dod. pempt.* 52.

Oed. dan. t. 573.

In de Moerassen om Tiel, en by Uilenpas en Boedelhof in 't Graaffchap Zutphen; ook omtrent Amsterdam en Utrecht; aan 't Gain tuffchen Ouderkerk en de Voetangel; overvloedig buiten 's Hage in een Poel op Staalduin; buiten de Helder in de boek van 't doog; in de Schermer in Noord-Holland; by Donsfega, Eefterga, Vollega, &c. in Friesland.

I N U L A.

Oculus Christi. 692. INULA foliis amplexicaulibus oblongis integris hirsutis, caule piloso corymboso. *Sp.* 1237. *n.* 5:
Gelr. 485. *Fris.* 359.

Conyza pannonica lanuginosa. *Baub. pin.* 265.
Comm.

Comm. boll. 28. Moris. hist. 3. p. 113. f. 7. t. 19. f. 1.

Overvloedig buiten Haarlem naar Overveen; in de Duinen achter Zorgvliet, en tusschen beide Katwyken; en aan zommige Wegen en Hei-velden omtrent 't Heereveen in Friesland.

693. *INULA* foliis amplexicaulibus cordato-oblongis, *dysenterica*, caule villosa paniculato, squamis calycinis fetaceis. *Sp. 1237. n. 7. Gelr. 636. Frisf. 360.*

Conyza media asteris flore luteo, vel tertia discoridis. *Baub. pin. 265.*

Conyza media matthioli, flore magno luteo, humidis locis proveniens. *Baub. hist. 2. p. 1050.*

Conyza I. Tabern. hist. 1243.

Oed. dan. t. 410.

Gemeen Donder-kruid. Belg.

Heel-blaadtjes. Rusticis.

Aan de Sypels by Harderwyk; aan de kanten der Slooten by Wyk by Duurstede, Amerongen, Franeker, langs de Wegen tusschen de laage landen in Dieze in Overysel.

694. *INULA* foliis amplexicaulibus undulatis, caule *Puticaria*, prostrato, floribus subglobosis radio brevissimo. *Sp. 1238. n. 9. Gelr. 473.*

Conyza minor, flore globoso. *Baub. pin. 266.*

Conyza minima. Dod. pempt 52.

In Overysel te Westerholte in de laagte by Heinbs-buis.

A R N I C A.

695. *ARNICA* foliis ovatis integris: caulinis geminis *montana*, oppositis. *Sp. 1245. n. 1. Gelr. 479. Frisf. 361.*

Arnica lapforum panacea. Eph. Nat. Cur. Dec. 1.

Ann. 9. p. 22. t. 3.

Doronicum, plantaginis folio, alterum. *Baub. pin. 263.*

Oed. dan. t. 63.

Wolverley, Groot Luciaan-kruid, Val-kruid, Woud-kruid. Belg.

Veel op de Stads-weide by Harderwyk; in ééne-weide by Uilenpas, en op Zuideras, op de Heide by Selhem, en elders in 't Graaffschap Zutphen; op de Hei-velden omtrent Bergum, Oudega,

Au-

224. SYNGENESIA POLYG. SUPERFLUA.

Augustinisga en Heerenveen in Friesland; en
by de Harender-moolen buiten Groningen.
Pharm. ARNICÆ rad. herb. flor.
Herbam in Cerevisia coctam Rustici pro vulnerario
interne adhibent.

B E L L I S.

- persanis.* 696. BELLIS scapo nudo. Sp. 1248. n. 1. Gelr. 494.
Fris. 362.
Bellis sylvestris minor. Baub. pin. 261. Boerb.
lugdb. 1. p. 108.
Bellis sylvestris. Dod. pempt. 265.
Oed. dan. t. 503.
Maagdelieven, May-zoetjes, Margarieten. Belg.
Kransjes. Harlemensibus.
Fenne-bloemen. Frisiis.
Overvloedig in de Weiden.
Pharm. BELLIDIS herb. flor.
Variat petalis ex candido & rubro mistis; ex candido
rubris; disco rubris, radio albis. Vidi etiam plantas
spontaneas flore pleno.
In Commelini Catalogo omissa.

C H R Y S A N T H E M U M.

- Leucanthemum.* 697. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus
oblongis; superne serratis; inferne dentatis.
Sp. 1251. n. 4. Gelr. 486. Fris. 363.
Bellis sylvestris, caule folioso, major. Baub. pin.
261. Comm. boll. 15.
Bellis major. Cam. epit. 635. Dod. pempt. 265.
Groote Maagdelieven, of Ganze-bloemen. Belg.
Wammis-knoopen of Wambuis-knoopen. Arnhem-
ensibus.
In en aan de Zaai-landen op veele plaatsen.
- segetum.* 698. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus:
superne laciniatis; inferne dentato-serratis.
Sp. 1154. n. 15. Gelr. 487. Fris. 364.
Chrysanthemum segetum. Clus. hist. 1. p. 334.
Bellis lutea, foliis profunde incis, major. Baub.
pin. 262. Comm. boll. 15.
Vokelaar of Geele Ganze-bloemen. Belg.
In zandige Bouw-landen op veele plaatsen.

*Variat interdum foliis minoribus, floribusque ex albo
& luteo variegatis. Boerb. lugdb. 1. p. 106. n.
10 & 11.*

M A T R I C A R I A.

699. MATRICARIA foliis compositis planis: foliolis *Partheniæ*
ovatis incis, pedunculis ramosis. *Sp.* 1255. n.

1. *Gelr.* 488.

Matricaria vulgaris seu sativa. Baub. pin. 133.

Matricaria sylvestris flore toto luteo. C. B. Comm.
boll. 72.

Matricaria. Dod. pempt. 35.

Mater, Moeder-kruid. Belg.

*Komt van zelfs voort in de Hoven, ook aan oude
Muuren, en op ruwe steenachtige plaatsen.*

Pharm. MATRICARIÆ herb. flor.

700. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis pa- *Chamomilla*
tentibus, squamis calycinis margine æqualibus.

Sp. 1256. n. 3. *Gelr.* 489.

Chamæmelum vulgare, Leucanthemum dioscori-
dis. Baub. pin. 135.

Chamæmelum vulgare. Dod. pempt. 257.

Camille. Belg.

Overvloedig in de Zaai-landen op veele plaatsen.

Pharm. CHAMÆMELI VULGARIS herb. flor.

701. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis de- *suaveolens.*
flexis, squamis calycinis margine æqualibus. *Sp.*

1256. n. 5. *Fris.* 366.

Matricaria leucanthemos annua suaveolens, cha-
mæmeli folio, ovariis albicantibus. Vaill. act.

1720. p. 370.

Welruikende Camille. Belg.

Op veele plaatsen in de Bouw-landen.

Non confundenda cum Anthemide nobili.

A N T H E M I S.

702. ANTHEMIS receptaculis conicis: paleis lance- *arvensis.*
olatis, seminibus coronato-marginatis. *Sp.* 1261.

n. 8. *Gelr.* 637.

Chamæmelum inodorum. Baub. pin. 135. *Rupp.*

jen. 173.

Wilde Camille. Belg.

Op veel plaatsen langs de Wegen en Akkers.

- Cotula.* 703. *ANTHEMIS* receptaculis conicis: paleis setaceis, feminibus nudis. *Sp.* 1261. *n.* 10. *Gelr.* 491. *Fris.* 367.

Chamæmelum foetidum. Baub. pin. 135. *Comm. boll.* 24.

Cotula fetida. Dod. pempt. 258.

Padde-bloem, Stinkende Camille, Koedille. Belg. Langs de wegen omtrent Amsterdam, Utrecht; in de Wouden en op de Kley in Friesland; aan de Muyder-en Ysfeldyk, en elders.

- valentina.* 704. *ANTHEMIS* caule ramoso, foliis pubescentibus tripinnatis setaceis, calycibus villosis pedunculatis. *Sp.* 1262. *n.* 14. *Gelr.* 490.

Bupthalmum cotulae folio. Baub. pin. 134. *Comm. boll.* 18.

Bupthalmum alterum penæ. Dalech hist. 863.

Te Campen aan de Muuren.

- cinctoria.* 705. *ANTHEMIS* foliis bipinnatis ferratis subtus tomentosis, caule corymbofo. *Sp.* 1263. *n.* 17. *Jngr.* 138.

Bupthalmum tanacetii minoris foliis. Baub. pin. 134. *Comm. boll.* 18.

Chrysanthemum foliis tanacetii. Loef. pruss. 47. *t.* 9.

Koe-Ooge. Belg.

Op oude Muuren te Utrecht en in andere plaatsen.

A C H I L L E A.

- Ptarmica.* 706. *ACHILLEA* foliis lanceolatis acuminatis argute ferratis. *Sp.* 1266. *n.* 13. *Gelr.* 493. *Fris.* 368. *Dracunculus pratensis, serrato folio. Baub. pin.* 98. *Comm. boll.* 32.

Draco sylvestris sive Ptarmica. Dod. pempt. 710. *Wilde Dragon, Wilde Bertram. Belg.*

Langs de gruppels der Bouw-landen te Zandwyk by Tiel; langs de wegen by Uilenpas en elders in 't Graafschap Zutphen; in de Meben by Harderwyk, Nykerk, &c. in den Aardenbouts-Laan buiten Haarlem; aan de Kade buiten de Leuterpoort

SYNGENESIA POLYG. SUPERFLUA. 227

poort te Wyk by Duurstede; omtrent Haskerdyken, Heerenveen, Wolvega, en elders in de Wouden in Friesland.

Pharm. PTARMICÆ VULGARIS herb.

707. *ACHILLEA* foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus superne sulcatis, *Millefolium*
Sp. 1267. n. 18. *Gelr.* 492. *Jngr.* 139. *Fris.* 369.
Millefolium vulgare album. *Baub.* pin. 140. *Comm.*
boll. 76.
Millefolium sive *Achillæa*. *Dod. pempt.* 100.
Haaze-Gerwe, Geruwe, Duizend-blad. Belg.
 β. *Millefolium* purpureum majus. *Baub.* pin. 140.
Boerb. lugdb. 1. p. 112.
 γ. *Millefolium* purpureum minus. *Baub.* pin. 140.
Comm. boll. 76. *Boerb. lugdb.* 1. p. 112.
Langs de Wegen, aan de kanten der Akkers, en in
de Weiden op veele plaatsen.
 Pharm. MILLEFOLII herb.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

C O R E O P S I S.

708. *COREOPSIS* foliis lanceolatis ferratis oppositis *Bident.*
 amplexicaulibus. *Sp.* 1281. n. 4.
Chrysanthemum aquaticum *bidens*, folio non di-
 viso, flore aureis petalis undique radiato. *Morif.*
hist. 3. p. 17. f. 6. t. 5. f. 25.
In de Slooten van 't Haagse-Bosch, en elders.

C E N T A U R E A.

709. *CENTAUREA* calycibus ciliatis: squamula ovata: nigra.
 ciliis capillaribus erectis, foliis lyrato-angu-
 latis, floribus flosculosis. *Sp.* 1288. n. 11.
Jacea nigra laciniata. *Baub.* pin. 271. *Boerb. lugdb.*
 1. p. 142. (non *Commelini*. *Vide Centauream*
Jaceam.)
Jacea austriaca VI. *Clus. hist.* 2, p. 7.
 † Volgens BOERHAAVE.

- Cyanus.* 710. *CENTAUREA* calycibus ferratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis. *Sp.* 1289. n. 14. *Gelr.* 495. *Fris.* 370.
Cyanus fegetum. *Baub.* pin. 273. *Comm. boll.* 30.
Cyanus vulgaris. *Lob. ic.* 546.
Koorn-bloemen, Rogge-bloemen. Belg
Veel tusschen 't Koorn.
Pharm. CYANI flor.
Variat interdum corollæ colore albo, purpureo, incarnato, violaceo, rubro, &c.
- Scabiosa.* 711. *CENTAUREA* calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis: pinnis lanceolatis. *Sp.* 1291. n. 22. *Jngr.* 140
Scabiosa major, squamatis capitulis. *Baub.* pin. 269.
Centaureum collinum gesneri, flore purpureo.
Baub. hist. 3. p. 32.
Habitat in pratis aridioribus Belgii. (Linn. b. Cliff. 422.
- Jacea.* 712. *CENTAUREA* calycibus scariosis laceris, foliis lanceolatis: radicalibus sinuato-dentatis: ramis angulatis. *Sp.* 1293. n. 29. *Gelr.* 492.
Jacea nigra pratensis latifolia *Baub.* pin. 271.
Jacea nigra laciniata. *C. B. Comm. boll.* 60.
Oed. dan. t. 519.
Knoop-kruid. Belg.
Veel in de Bouw-en Wei-landen buiten Harderwyk, 's Hage, Haarlem, Zwol; aan de Lek-Dyk; aan de dykjes te Haren by Groningen; ook op de Heide.
Commelinus perperam Jaceam nigram laciniatam
C. B. quæ est Centaurea nigra, pro hac planta posuit. Ceterum synonyma vix distinguenda.
- Calcitrapa.* 713. *CENTAUREA* calycibus subduplicato-spinosis sessilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloso. *Sp.* 1297. n. 44. *Gelr.* 496.
Carduus stellatus, foliis papaveris erratci. *Baub.* pin. 387. *Comm. boll.* 21.
Carduus stellatus. *Dod. pempt.* 733.
Carduus muricatus vulgo Calcitrapa dictus. *Clus.* hist. 2. p. 7.
Sterre-Distel. Belg.
Op verscheide plaatsen aan de Dyken, tusschen Muiden

den en Naarden; ook aan den Yssel-dyk in Gel-
derland en Overysfel by Campen, &c.

POLYGAMIA NECESSARIA.

F I L A G O.

714. *FILAGO* floribus acaulibus sessilibus, foliis flo-
ralibus majoribus. *Sp.* 1311. n. 1.
Filago maritima, capite folioso. *Tourn. inst.* 454.
Boerb. lugdb. 1. p. 119.
Gnaphalium roseum sylvestre. *Baub. pin.* 263.
prodr. 122.
Gnaphalium umbellatum minimum. *Baub. list.* 3.
p. 162.
† Volgens BOERHAAVE.
715. *FILAGO* panicula dichotoma, floribus rotunda-
tis axillaribus hirsutis, foliis acutis. *Sp.* 1311.
n. 2. *Geln.* 469.
Filago seu *Impia*. *Dod. pempt.* 66.
Gnaphalium vulgare majus. *Baub. pin.* 263. *Comm.*
bull. 45.
Reur- of Roer-kruid. Belg.
In de Zaaï-landen en Moes-boven; veel op zandige
pluutsen by 's Heeren-Loo buiten Harderwyk;
en langs de Wegen buiten Groningen.
716. *FILAGO* caule subdichotomo erecto, floribus ^{montana-}
conicis terminalibus axillaribusque. *Sp.* 1311. n.
54. *Frif.* 352.
Gnaphalium minus repens. *Baub. pin.* 263.
Gnaphalium minimum. *Lob. ic.* 481. *Baub. list.* 3.
p. 159. *Pet. herb. t.* 18. f. 11.
Klein kruipend Roer-kruid. Belg.
Op zandige Wegen en op Zaaï-landen by Oude-
Schoot, Rottum, Katlyk, en elders in de
Woud-kant in Friesland.
717. *FILAGO* caule dichotomo erecto, floribus subu-
latis axillaribus, foliis filiformibus. *Sp.* 1312.
n. 5.

Filago vulgaris tenuissimo folio erecta. Tourn. inst. 454. Boerb. lugdb. 1. p. 119.

Gnaphalium vulgare tenuifolium. Baub. hist. 3. p. 159.

Gnaphalium vulgare medium. Moris. hist. 3. f. 7. t. 11. f. 14. Pet. herb. t. 18. f. 12.

† *Volgens* BOERHAAVE.

arvensis. 718. *FILAGO* caule paniculato, floribus conicis lateralibus. *Sp. 1312. n. 6.*

Filago altera. Dod. pempt. 67. absque icone. Boerb. lugdb. 1. p. 119.

Gnaphalium majus angusto oblongo folio. Baub. pin. 263.

By Uilenpas, Keppel en elders in 't Graaffschap Zutphen.

M O N O G A M I A.

J A S I O N E.

montana. 719. *JASIONE. Sp. 1317. n. 1. Gelr. 498. Fris. 372.*

Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo. Baub. pin. 92. Comm. boll. 98.

Scabiosa minor. Dod. pempt. 122.

Oed. dan. t. 319.

Schaaps - Scabiosa. Belg.

Veel langs de Wegen by Uilenpas, Harderwyk, Wageningen, Amerongen, &c. in de Duinen by Haarlem en Alkmaar; in de Zaaï-landen by Velsen; in de Wouden in Friesland; in de Noorderender essen, en elders aan de dykjes in 't Gorecht buiten Groningen; en op andere plaatsen op dorre zandige gronden.

L O B E L I A.

Dortmanna 720. *LOBELIA* foliis linearibus bilocularibus integerimis, caule subnudo. *Sp. 1318. n. 3.*

Dortmanna palustris, floribus sparsis pendulis.

Rudb. act. ups. 1720. p. 97. t. 2. opt.

Gla-

Gladiolus aquaticus f. *Gladiolus palustris*. *Dod.*

hist. 250.

Leucojum palustre, flore subcæruleo. *Baub.* pin.

202.

Oed. dan. t. 39.

In de Slooten by 't Dorp Westerveld en Narch in Drenthe. (*Linn. b. Cliff.* 426.) *By Zwol.* (*Bruman. zuoll.* 11.)

V I O L A.

721. *VIOLA* acaulis, foliis cordatis, stolonibus rep-^{odorata-}
tantibus. *Sp.* 1324. n. 8. *Gelr.* 500. *Fris.* 373.

Viola martia purpurea, flore simplici odoro. *Baub.*
pin. 199. *Comm. boll.* 115.

Viola martia purpurea. *Dod. pempt.* 156. t. 1. 2.

Oed. dan. t. 309.

Tammen Blaauwe Violen. Belg.

Styfmoertjes. quibusdam.

β. *Viola martia alba.* *Baub.* pin. 199.

Overvloedig in de Boffchadien in de Tielerwaard;
te Welfum, Oen, en daar omtrent in Gelderland;
ook by Zutphen en Amersfoort; in eenige Duin-
Valeyen buiten Haarlem; op verscheide plaatsen in
Friesland; te Holten in Overysfel; veelaan de
Stads-wal te Groningen, ook te Haren en Onnen;
en elders. β Op 't Nieuwe-werk by Rotterdam,
en aan de Wegen omtrent Wyk by Duurstede.

Pharm. VIOLARIÆ berb. flor. sem.

722. *VIOLA* caule adultiore adscendente, foliis ^{canina.}
oblongo - cordatis. *Sp.* 1324. n. 9. *Gelr.* 499.
Fris. 374.

Viola martia inodora sylvestris. *Baub.* pin. 199.
Comm. boll. 115.

Viola cærulea martia inodora sylvatica, in cacu-
mine semen ferens. *Baub. hist.* 3. p. 543.

Wilde Violen. Belg.

In de Mehen by Harderwyk; in de Boffchen by Put-
ten, Clarenbeek, Uilenpas, en elders in Gel-
derland en Overysfel; overvloedig in de Duin-
valeyen; en laage natte grieven by Harkama-
opeinde; en op verscheide plaatsen onder geboomte
by Donkerbroek, Haule en Oosterwoude in
Friesland.

- tricolor.* 723. *VIOLA* caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisis, stipulis pinnatifidis. *Sp.* 1326. n. 15. *Gelr.* 501. *Fris.* 375.
Viola bicolor arvensis. *Baub.* pin. 200. *Comm. boll.* 115.
Wilde Penseen of Viooltjes. Belg.
 β. *Viola tricolor.* *Dod. pempt.* 158. *Renealm. spec.* 144. t. 140.
Viola tricolor hortensis repens. *Baub.* pin. 199. *Comm. boll.* 115.
 γ. *Eadem flore albo & luteo.* *Boerb. lugdb.* 1. p. 244.
 δ. *Eadem flore pallide cæruleo, purpureo & luteo.* *Boerb.*
Veel aan de binnenweg tusschen Harderwyk en Hierden; in de Duin-valeyen op dorre zandige gronden; omtrent Balk, Wykel, Heerenveen, en elders in de Wouden in Friesland.

I M P A T I E N S.

- Nolitangere.* 724. *IMPATIENS* pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Sp.* 1329. n. 7. *Gelr.* 502.
Impatiens herba. *Dod. pempt.* 659.
Balsamina lutea sive Noli me tangere. *Baub.* pin. 306. *Comm. boll.* 15.
Oed. dan. t. 588.
Kruidje roer my niet, Spring-kruid. Belg.
In Gelderland hier en daar aan de kanten der Slooten om Tiel; in 't Bosch van Uilenpas, en by den Engelenborg, te Ermello op de Pastory aan de kant van een sloot; buiten Haarlem in het Schaa-pen-bosch, en op 't Bent-veld; te Paterwolde in 't Landschap Drenthe.

C L A S S I S XX.

G Y N A N D R I A.

D I A N D R I A.

O R C H I S.

725. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio lanceo-^{bifolia.}
lato integerrimo: cornu longissimo, petalis pa-
tëntibus. *Sp.* 1331. n. 8. *Jngr.* 143. *Fris.* 376.

Orchis radicibus oblongis, labello lineari. *Hall.*
bist. 1285. t. 35.

Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Baub.*
pin. 83. *Comm. boll.* 82. *Vaill. par.* 151. t. 30.
f. 7. *segu. ver.* t. 15. *f.* 10.

Orchis serapias primus. *Dod. pempt.* 237.

Balletjes - kruid, Standel - kruid, Vosse - kulletjes.
Belg.

Oed. dan. t. 235.

*In de Zee - Duin - Valeyen agter Hillegom; op Staal-
duin by 's Gravenhage; en op Hei - velden in de
Wouden in Friesland.*

726. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio bicorni^{pyramida-}
trifido æquali integerrimo: cornu longo, petalis ^{lis.}
sublanceolatis. *Sp.* 1332. n. 12.

Orchis radicibus subrotundis, spica densa calcare
longissimo, labello bicorni æqualiter tripartito.
Hall. bist. 1286. t. 35.

Orchis flore glomerato. *Riv. hex. t.* 14.

Orchis purpurea spica congesta pyramidalis. *Segu.*

ver. t. 15. f. 11.

Cynosorchis militaris montana, spica rubente conglomerata *Baub. pin.* 81. *prodr.* 28.

By 's Gravenhage, en in de Velden langs de Duinen. (*Linn. b. Cliff.* 429.)

Morio.

727. *ORCHIS* bulbis indivisis, nectarii labio quadridido crenulato: cornu obtuso adscendente, petalis obtusis conniventibus. *Sp.* 1333. n. 16. *Gelr.* 504. *Frif.* 377.

Orchis radicibus subrotundis, galeæ petalis linearis, labello trifido crenato, medio segmento emarginato. *Hall. bist.* 1282. t. 33.

Orchis morio femina. *Baub. pin.* 82. *Comm. boll.* 82. *Vaill. par.* t. 31. f. 13. 14. *Segu. ver. t.* 15. f. 7.

Orchis angustifolia. *Riv. hex. t.* 19.

Oed. dan. t. 253.

Kulletjes-kruid. Belg.

Volg my na. Groninganis.

By Harderwyk en Doornspyk in vochtige landen; by Alkmaar op den weg naar Egmond, in de Velden; in 't Sticht van Utrecht, en in Friesland op verscheiden plaatsen; by Haren in 't witteveen; ook in de veenlanden langs 't Horensche diep, en by de Harender-molen in 't Heide-veld buiten Groningen.

Pharm. SATYRII FEMINÆ rad.

Variat corollarum colore purpureo carneo, albo &c.
Boerb. lugdb. 2. p. 152.

mascula.

728. *ORCHIS* bulbis indivisis, nectarii labio quadri-
lobo crenulato: cornu obtuso, petalis dorsali-
bus reflexis. *Sp.* 1333. n. 17.

Orchis radicibus subrotundis, petalis lateralibus reflexis, labello trifido, segmento medio longiori bifido. *Hall. bist.* 1283. t. 33.

Orchis morio mas, foliis maculatis. *Baub. pin.* 81. *Comm. boll.* 82. *Vaill. par.* 151. t. 31. f. 11. 12.

Palmata major. *Riv. hex. t.* 10.

Oed. dan. t. 457.

By de voorgaande; ook in de pannen der Duinen op Staalduin by 's Gravenhage, Haarlem, en in Brees-Aap.

Pharm.

Pharm. SATYRII MARIS rad.

729. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quinque-*militaris*.
fido punctis scabro: cornu obtuso, petalis con-
fluentibus. *Sp.* 1333. *n.* 19.

Orchis radicibus subrotundis, spica conica, la-
bello quadrifido brachiolis & pectore perangu-
stis. *Hall. bist.* 1277. *t.* 28.

Orchis galea & alis fere cinereis. *Baub. bist.* 2.
p. 755.

Orchis latifolia, hiantе cucullo, major. *Morif.*
bist. 3. *p.* 490. *Vaill. par.* 148. *t.* 31. *f.* 21.

Orchis macula. *Riv. hex.* *t.* 15. 16.

Cynosorchis latifolia, hiantе cucullo major. *Baub.*
pin. 80. *Comm. boll.* 82. (*sub. Orchide.*)

Honds - kulletjes. Belg.

β. Orchis latifolia, hiantе cucullo, altera. *Tourn.*
inst. 432. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 152. *Vaill. par. t.*
31. f. 22. 23. 24.

Op grasachtige plaatsen, in Koeymans - Bosch.

730. ORCHIS bulbis subpalmaris rectis, nectarii cor-*latifolia*.
nu conico: labio trilobo lateribus reflexo,
bracteis flore longioribus. *Sp.* 1334. *n.* 21. *Gelr.*
503.

Orchis radicibus palmatis, caule fistuloso, bracteis
maximis, labello trifido ferrato, medio segmento
obtuso. *Hall. bist.* 1279 *t.* 32.

Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcari-
bus. *Baub. pin.* 85. *Comm. boll.* 83. *Vaill. par.*
t. 31. *f.* 1. 2. 3. 4. 5.

Oed. dan. t. 266.

Handekens - kruid. Belg.

β. Orchis palmata palustris latifolia. *Baub. pin.* 86.
Comm. boll. 83.

Palmata palustris latifolia. Riv. hex. t. 19.

Satyrium basilicum foliosum. Eod. pempt. 241.

Water - Handekens - kruid. Belg.

γ. Orchis palmata pratensis maculata. *Baub. pin.* 85.

*In de Duin - valeyen. E. in de Meben en Hooi - lan-
den by Harderwyk, Nykerk, &c. Tusschen den
Overtoom en Amstelveen buiten Amsterdam; in
de moerassen by Groningen. γ. Overvloedig in de
Meben by Harderwyk; op de Hei - velden en in
laage Wei - landen ontrent Bergum, Oostermeer,*

Eest.

Eestrum, en elders in de Wouden in Friesland;
ook overvloedig in de Provintie Groningen en
Omlanden.

Variat etiam corollis carneis & albis.

maculata.

731. ORCHIS bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus brevior: labio plano, petalis dorsalis erectis. *Sp.* 1335. n. 24. *Gelr.* 639. *Frif.* 378.

Orchis radicibus palmatis, caule solido, labello trifido ferrato, medio segmento. acuminato. *Hall. bist.* 1278. t. 32.

Orchis palmata montana maculata. *Baub. pin.* 86. *Vaill. par. t.* 31. f. 9. 10.

Orchis palmata pratensis maculata. *C. B. Comm. boll.* 83.

Palmata maculata. *Riv. hex. t.* 8. 11.

Koekkoeks. - Bloemen. Zutphanienfibus.

In de Velden by Zutphen; in de Meben by Harderwyk; buiten Haarlem by 't Kraayenest aan de koediefsvaart; in de Wouden in Friesland, en Groningen.

Distinguitur a precedenti caule non fistuloso, bracteis flore non longioribus, et reliquis notis ab Ill. Hallero traditis.

conspicua.

732. ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu setaceo germinibus longior: labio trifido, petalis duobus patentissimis. *Sp.* 1335. n. 26.

Orchis radicibus palmatis, calcare longissimo, labello trifido obtuso unicolore. *Hall. bist.* 1287. t. 29.

Orchis palmata minor, calcaribus oblongis. *Baub. pin.* 85. *Vaill. par.* 153. t. 30. f. 8. 8.

Orchis angustifolia non maculata. *Riv. hex. t.* 11. *Oed. dan. t.* 224.

In de Duin-valeyen, vry overvloedig by Raaphorst.

S A T Y R I U M.

viride.

733. SATYRIUM bulbis palmatis, foliis oblongis obtusis, nectarii labio lineari trifido: intermedia lacinia obsoleta. *Sp.* 1337. n. 2.

Orchis radicibus palmatis, galea connivente, label-

bello trifulco, calcare brevissimo. *Hall. bist.*
1269. t. 26.

Orchis palmata, flore viridi. *Baub. pin.* 26. *prodr.*
30

Orchis palmata flore galericulato dilute viridi.
Loef. pruss. 182. t. 56.

Oed. dan. t. 77.

In de Valeyen op Staal - duin by 's Gravenhage.
(*Cel. SCHWENCKE.*)

O P H R Y S.

734. *OPHRYS* bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ova-
tis, nectarii labio bifido. *Sp.* 1340. n. 5. *Gelr.*
506.

Ophris bifolia. *Baub. pin.* 87. *Comm. boll.* 82.

Epipactis foliis binis ovatis, labello bifido. *Hall.*
bist. 1291. t. 37.

Bifolium. *Riv. hex.* t. 7.

Pseudo - orchis bifolium. *Dod. pempt.* 242.

Twee - blad. Belg.

Oed. dan. t. 137.

In een Wei - land by Zuideras, en op de Hofstede
Blik buiten Zutphen; op de Stads - weide by
Harderwyk; in de Boschjes te Overveen; in de
pannen der Duinen achter Zorgvliet, en op veele
andere plaatsen aan de Duinkant van Holland;
op 't Woud tusschen Bergen en Egmond op den
Hoef buiten Alkmaar; in de Landen by Leerzum
in 't Sticht van Utrecht; in een Bosch by Frane-
ker; en elders.

735. *OPHRYS* bulbo fibroso, caule bifolio, foliis *cordatis.*
cordatis. *Sp.* 1340. n. 6.

Ophris minima. *Baub. pin.* 87. *prodr.* 31. *Comm.*
boll. 82.

Epipactis foliis binis cordatis, labello bifido,
postice bidentato. *Hall. bist.* 1292. t. 22. f. 4.

Bifolium minimum. *Baub. bist.* 3. p. 534.

In de Duin - valeyen achter Overveen, by Haarlem,
op opene luchtige plaatsen.

736. *OPHRYS* bulbo subrotundo, scapo nudo, foliis
lanceolatis, nectarii labio integro, petalis dor-
salibus linearibus. *Sp.* 1341. n. 7.

Her-

- Herminium* bulbo infra radicato, nectarii labio bifido. *Linn. act. upf.* 1740. p. 31.
Orchis lilifolia minor fabuletorum zelandiæ & bataviæ. *Baub. hist.* 2. p. 770. figuræ duæ prior. *Comm. boll.* 83.
Chamæorchis lilifolia. *Baub. pin.* 84.
Bifolium bulbosum *Dod. pempt.* 242.
Ebret. act. angl. 1764. n. 53. p. 81. t. 4.
In Brees - Aap.

- Monorchis.* 737. *OPHRYS* bulbo globoso, scapo nudo, nectarii labio trifido cruciato. *Sp.* 1342. n. 11.
Orchis bulbo unico subrotundo, labello cruciformi. *Hall. hist.* 1262. t. 22. f. 3.
Orchis odorata moschata f. *Monorchis.* *Baub. pin.* 84.
Monorchis. *Mich. gen.* 30. t. 26. *Rupp. jen.* 421. t. 2
Oed. dan. t. 102.
In de Duinen by Velsen. (Nob. D. FABRICIUS SIX.)

S E R A P I A S.

- latifolia.* 738. *SERAPIAS* bulbis fibrosis, foliis ovâtis amplexicaulibus, floribus pendulis. *Syst. edit.* 13. p. 678. n. 1.
Serapias Helleborine. *Sp.* 1344. n. 1. *Gelr.* 505.
Helleborine latifolia montana. *Baub. pin.* 186. *Comm. boll.* 57.
Epipactis five *Helleborine.* *Cam. epit.* 889.
Epipactis foliis amplexicaulibus ovato-lanceolatis, labello lanceolato. *Hall. hist.* 1297. t. 40.
Damafonium flore mixto. *Riv. hex. t.* 6.
Oed. dan. t. 267.
Berg - Nieskruid. Belg.
 β. *Helleborine* flore carneo. *Baub. pin.* 187. *Comm. boll.* 57.
 γ. *Helleborine* altera, atro-rubente flore. *Baub. pin.* 186.
 Op de zyde van 't Kraayenest, op de boogte by de Koediefs - vaart; veel op Uilenpas en Baank in 't Graaffschap Zutphen; ook omtrent Zwol. β.
 Op den weg van 't Kraayenest naar Heemstede op drooge zandige gronden. γ. Op Uilenpas.

739. SERAPIAS bulbis fibrosis, foliis ensiformibus *longifolia*.
sessilibus, floribus pendulis. *Syst. edit.* 13. p.

679. (*Sp.* 1345. n. 3.)

Helleborine angustifolia palustris sive pratensis.

Baub. pin. 87. *Comm. boll.* 57.

Helleborine. *Riv. hex. t.* 3.

Epipactis foliis ensiformibus caulinis, floribus
pendulis, labello obtuso per oras plicato. *Hall.*
bist. 1296. t. 39.

Damafonium flore herbaceo, intus nonnihil can-
dicante. *Baub. bist.* 3. p. 317.

Oed. dan. t. 267.

*In de vochtige Duin-valeyen buiten Haarlem; by
den Hoef, Bergen, &c. buiten Alkmaar; en
agter Zorgvliet langs den weg naar Schevenin-
gen.*

740. SERAPIAS bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, *rubra*.
floribus erectis: nectarii labio acuto. *Syst. edit.*
13. p. 679.

Helleborine montana angustifolia purpurascens.

Baub. pin. 187. *Boerb. lugdb.* 2 p. 153.

Elleborines genus. 5. *Clus. pan.* 275.

Epipactis caule paucifloro, labello lanceolato
lineato, lineis undulatis. *Hall. bist.* 1299. t. 42.

Damafonium flore roseo. *Riv. hex. t.* 6.

Oed. dan. t. 345.

† *Volgens BOERHAAVE.*

H E X A N D R I A.

A R I S T O L O C H I A.

741. ARISTOLOCHIA foliis cordatis, caule erecto, *Clematidis*.
floribus axillaribus confertis. *Sp.* 1364. n. 20.

Aristolochia Clematidis recta. *Baub. pin.* 307.

Comm. boll. 12.

Aristolochia Clematidis vulgaris. *Clus. bist.* 2. p.

71.

Dunne Hol-Wortel, Sarratyns-kruid. Belg.

*Overvloedig op de Kamp van bet Haaze-woold by de
Bronbergen by Zutphen; in de Duinen niet verre
van*

van Wyk op Zee op zommige plaatsen overvloedig;
langs een weg by de Beverwyk, die van de Her-
berg Romen naar de duinen loopt; overvloedig op
de Kruidberg by Brederode; ook om Utrecht.
Pharm. ARISTOLOCHIE VULGARIS rad.

P O L Y A N D R I A.

A R U M.

maculatum. 742. ARUM acaule, foliis hastatis integerrimis, spa-
dice clavato. *Sp.* 1370. *n.* 12. *Gelr.* 508.

Arum vulgare maculatum & non maculatum. *Bauh.*

pin. 195. *Comm. boll.* 13.

Arum. *Fuchf. bist.* 69. *Lob. ic.* 597.

Oed. dan. t. 597.

Kalfsvoet, Aarons - baart. Belg.

By de Vos agter de Kanons-dyk buiten Zutphen;
in 't Bosch van den Uilenpas en by Ubbergen; op
Zandwyk by Tiel; te Dodeweerd by 't Huis den
Appelenburg; te Ochten in de Neder-Betuwe;
ook omtrent Leiden; in vochtige Else Boschjes by
't Huis te Brederode; in Neer-Langbroek in de
Provintie Utrecht; in 't Bosch op de Mickelhorst
by Groningen; en elders.

Pharm. ARI rad.

C A L L A.

palustris. 743. Calla foliis cordatis, spatha plana, spadice undi-
que hermaphrodito. *Sp.* 1373. *n.* 2. *Gelr.* 507.
Frgr. 147.

Dracunculus pulustris five radice arundinacea
plinii. *Bauh. pin.* 195. *Comm. boll.* 32. *Morif.*

bist. 3. *p.* 545. *f.* 13. *t.* 5. *f.* 23.

Dracunculus aquatilis. *Dod. pempt.* 330.

Oed. dan. t. 423.

Water-Slange - kruid. Belg.

In de Slooten en staande Wateren by Oldbroek op de
Veluwe; tusschen Rotterdam en Gouda, langs
den Hoogen-dyk; en achter Westbroek by U-
trecht.

ZOS.

Z O S T E R A.

744. *ZOSTERA pericarpis fessilibus*. Sp. 1374. n. 1. *marina*.
it. W. goth. t. 4. f. 1. Gelr. 222. Fris. 379.
Fucus angustifolius ligulas referens. Baub. pin. 364.
Comm. boll. 38.
Fucus marinus secundus. Dod. pempt. 479.
Zee - Wiert of Wier, Zee - Nestelen. Belg.
Oed. dan. t. 15.
Overvloedig omtrent 't Eiland Wieringen in de
Zuider - Zee.
745. *ZOSTERA pericarpis pedicellatis oliviformibus. oceanica.*
Mant. 123. Syst. 605. edit. 13. p. 691.
Alga angustifolia vitriariorum. Baub. pin. 364.
Alga marina. Lob. ic. 251.
By de voorige.
Confunditur facile cum Zostera marina, sed fructibus
pedunculatis, et radicibus in pilam complicatis
differt.

C L A S S I S XXI.

M O N O E C I A.

M O N A N D R I A.

Z A N N I C H E L L I A.

- palustris.* 746. ZANNICHELLIA *Sp.* 1375. n. 1. *Fris.* 380.
 Zannichellia palustris major, foliis gramineis
 acutis. *Mich. gen.* 71. t. 34. f. 1. 2.
 Algoides vulgaris. *Vaill. act.* 1719. p. 15. t. 1.
 f. 1.
 Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifi-
 dis. *Baub. pin.* 193. *prodr.* 101.
Oed. dan. t. 67.
 Overvloedig in Vaarten en Slooten op verscheide
 plaatsen.

C H A R A.

- vulgaris.* 747. CHARA caulibus lævibus, frondibus interne
 dentatis. *Sp.* 1624. n. 2. *Fris.* 504.
 Chara vulgaris foetida. *Vaill. act.* 1719. p. 23.
 t. 3. f. 1.
 Equisetum foetidum sub aqua repens. *Baub. pin.*
 16. *prodr.* 25. *theatr.* 251. *Baub. hist.* 3. p. 731.
Comm. holl. 33.
Oed. dan. t. 150.
 Stinkende Paarde-staart. Belg.
 In de Kolken aan den Yssel, en in veele Slooten.
 748. CHA-

748. CHARA caulibus aculeis capillaribus confertis. *hispida*.

Sp. 1624. n. 3. Fris. 505.

Chara major, caulibus spinosis. Vaill. act. 1719.

p. 18. t. 3. f. 3.

Equisetum sive Hippuris muscosus sub aqua repens, in hibernia. Pluk. alm. 135. t. 193. f. 6.

Hippuris muscosa, setis per maturitatem stellatis.

Dill. Eph. Nat. Cur. Cent. VI. app. 58. t. 13.

f. 1.

Oed. dan. t. 154.

In de Slooten by Enckhuisen, Franeker, en elders.

D I A N D R I A.

L E M N A.

749. LEMNA foliis petiolatis lanceolatis. Sp. 1376. *trifulca*.

n. 1. Gelr. 590. Fris. 382.

Hydrophace caule filiformi, foliis ellipticis lanceolatis viviparis. Hall. bist. 1901.

Lenticularia ramosa monorhiza, foliis oblongis pediculis longioribus donatis. Mich. gen. 16. t.

11. f. 5.

Lenticula aquatica trifulca. Baub. pin. 362. Baub.

bist. 3. p. 786. Comm. boll. 65.

Hederula aquatica. Lob. ic. 2. p. 36.

Klein Water-Veil. Belg.

In stilstaande zoete Wateren tusschen Haarlem en Overveen, by Harderwyk, Zwol, Franeker, en elders.

750. LEMNA foliis sessilibus utrinque planiusculis, *minor*.

radicibus solitariis. Sp. 1376. n. 2. Gelr. 592.

Fris. 383.

Hydrophace monorhiza, foliis planis ovatis.

Hall. bist. 1900.

Lenticularia minor monorhiza, foliis subrotundis utrinque viridibus. Mich. gen. 16. t. 11. f. 3.

Lenticula palustris vulgaris. Baub. pin. 362. Comm.

boll. 61. Vaill. par. 114. t. 20. f. 3.

Lens palustris. Dod. pempt. 587. Cam. epit. 852.

Raj. angl. 3. p. 129. t. 4. f. 1.

Kroos, Eenden-kroos, Eenden-groen, Water-Linzen. Belg.

Overvloedig in Graften, Slooten, en andere stilstaande zoete Wateren.

Pharm. LENTICULÆ herb.

gibba.

751. LEMNA foliis sessilibus subtus hemisphæricis, radicibus solitariis. *Sp.* 1377. n. 3. *Fris.* 384.

Hydrophace monorrhiza, foliis pulvinatis, inferne convexissimis. Hall. bist. 1898.

Lenticula palustris major: inferne magis convexa, fructu polyspermo. Mich. gen. 15. t. 11. f. 1.

In verscheide Slooten in Friesland.

polyrhiza. 752. LEMNA foliis sessilibus, radicibus confertis. *Sp.* 1377. n. 4. *Gelr.* 591. *Fris.* 385.

Hydrophace polyrrhiza, foliis ovatis planis. Hall. bist. 1899.

Lenticularia major polyrhiza inferne atropurpurea. Mich. gen. 16. t. 11. f. 1.

Lenticula palustris major. Comm. boll. 65. *Dill. app.* 51. *Raj. angl.* 3. p. 129. t. 4. f. 2. *Vaill. par. t.* 20. f. 2.

In de Vaart van Amsterdam op Gouda, niet verre van de Goudse sluis; in de Grift tusschen Nymegen en Arnhem; en in Friesland by de voorgaande, maar minder.

T R I A N D R I A.

T Y P H A.

latifolia.

753. TYPHA foliis subensiformibus, spica mascula femineaque approximatis. *Sp.* 1377. n. 1. *Gelr.* 514. *Fris.* 386.

Typha palustris major. Baub. pin. 20. *Comm. boll.* 113. *Morif. bist.* 3. p. 246. f. 8. t. 13. f. 1.

Lisch-Dodden of Donzen, Bulpeserikken, Duivelskoppen, Raboorden. Belg.

Zwejeriken. Zutphanie nribus.

Groen.

Groote Haanebolten, ook wel *Doete-bolten*. Groninganis.
Op veele plaatsen in de *Graften*, *Rivieren*, en *Riet-poelen*.

754. *TYPHA* foliis semicylindricis, spica mascula ^{anaustrifolia.} femineaque remotis. *Sp.* 1377. n. 1.

Typha palustris, clava gracili. *Baub.* pin. 20. *Comm. boll.* 113.

Typha palustris media. *Morif. bist.* 3. p. 246. f. 8. t. 13. f. 2.

♀. *Typha palustris minor.* *Baub.* pin. 20. *Comm. boll.* 113.

Kleine Haanebolten. Groninganis.

In het *Spaarne* by *Haarlem*; ook in den *Yssel* op veele plaatsen; buiten *Groningen* in de *Slooten* by *Haren*, *Meckelhorst*, *Onnen*, en elders.

S P A R G A N I U M.

755. *SPARGANIUM* foliis erectis triquetris. *Sp.* 1378. *erectum.* n. 1. *Gelr.* 513. *Fris.* 387.

Sparganium ramosum. *Baub.* pin. 15. *theatr.* 228. *Comm. boll.* 107. *Morif. bist.* 3. p. 247. f. 8. t. 13. f. 1.

Platanaria f. *Butomon.* *Dod. pempt.* 601.

Riet-gras, *Driekantig Liefch.* *Belg.*

Duikers. Groninganis.

♀. *Sparganium non ramosum.* *Baub.* pin. 15. *theatr.* 231. *Tabern. ic.* 247. *Comm. boll.* 107. *Morif. bist.* 3. p. 248. f. 8. t. 13. f. 2.

Oed. dan. t. 260.

In byna uitgedroogde *Slooten*, *Moerassen*, en aan de kanten der *Graften*, op verscheide plaatsen. ♂. Voornaamlyk tusschen *Haarlem* en *Overveen*, en by *Cuilenburg*.

C A R E X.

Spica unica simplici.

756. *CAREX* spica simplici dioica. *Sp.* 1379. n. 1. *dioica.* *Cyperoides parvum*, caulibus & foliis tenuissimis

triangularibus, spica longiore capsulis oblongis.

*Mich. gen. 56. t. 32. f. 1.

Gramen Cyperoides minimum, spica simplici crassa. Moris. hist. 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. ult. (mas.)

Oed. dan. t. 166.

Te Hullen by Nymegen, en elders in vochtige Weilanden, en in de Meben by Harderwyk.

capitata. 757. CAREX spica simplici androgyna ovata: superne mascula, capsulis imbricato-patulis. Sp. 1379. n. 2.

Gramen Cyperoides minimum, ranunculi capitulo simplici asperiore rotundo. Moris. hist. 3. p. 245. f. 8. t. 12. f. 36.

Oed. dan. t. 379.

By Groningen. (D. RAINVILLE.)

pulicaris. 758. CAREX spica simplici androgyna: superne mascula, capsulis divaricatis retroflexis. Sp. 1380. n. 3.

Gramen Cyperoides minimum, feminibus deorsum reflexis puliciformibus. Moris. hist. 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 21.

Te Hullen by Nymegen in een vochtig land, en op veele plaatsen in Modderpoelen.

Spicis androgynis.

ballensis. 759. CAREX spicis ternis congestis sessilibus ovatis triquetris androgynis, involucro diphylo. Sp. 1380. n. 5.

Carex alpina, capitulis albis: squamis triquetris et pulchre lucentibus. Segu. ver. 1. p. 125.

Gramen junceum montanum, capite squamoso. Baub. pin. 6. prodr. 13. t. 13.

Op de Cingel van Rotterdam, dog zeldzaam. (D. RAINVILLE.)

arenaria. 760. CAREX spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo triquetro. Sp. 13. n. 6.

Carex maritima humilis, radice repente, caule triquetro, spica spadicea. Mich. gen. 67. t. 33. f. 4. Gra-

Gramen Cyperoides minus repens, spica divisa.

Loef. pruss. 116. t. 31.

Oed. dan. t. 425.

Helm. draad. Vulgo.

Overvloedig in de Duinen by Haarlem, Velsen, Scheveningen, en aan de kanten van zandige Akkers. (Nob. D. FABRICIUS SIX, & D. RAINVILLE.)

III. HALLERUS duas facit Caricis arenariæ Linnaei species. Hist. stirp. Helv. n. 1362. et 1363. sed. neutra illarum cum nostra convenit. Conf. C. E. WEIGEL observ. bot. 22.

Reptatu molesta est & invisa rusticis.

Loco Saffaparillæ usurpandam commendat C. F. REUSS orat. inang. Tubing. 1771.

761. CAREX spica composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis. *Sp. leporina.*
1381. n. 8. Gelr. 641.

Gramen Cyperoides palustre majus, spica divisa. Baub. pin. 6. theatr. 88. Comm. boll. 52. Moris. hist. 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 29.

Klein Wild - Water - Galigaan. Belg.

Variat tribus modis.

α. Spiculis omnibus androgynis.

β. Spiculis superioribus masculis.

γ. Spiculis superioribus & inferioribus femineis, mediis masculis.

In vochtige Weiden aan de Slooten op veele plaatsen.

α. by Gouda. β. te Bodegraaven; γ. by Nymegen.

762. CAREX spica composita, superne mascula, inferne feminea; spiculis ovatis mollibus; capsulis marginatis. *marginata.*

Carex palustris elatior, radice repente, caule trilatero, spica spadicea, capitulis crassioribus, capsulis marginatis. Mich. gen. 67. t. 33. f. 3.

Gramen nemorosum, spica rufescente molli. Baub. pin. 7.

Gemeen by Bodegraven aan de kanten der Slooten. (D. RAINVILLE.)

Variat spica interrupta, id est spiculis superioribus & inferioribus femineis, mediis masculis.

Capsulæ hinc planæ, inde convexæ, utrinque nervosæ

♂ *quasi striatæ. Pericarpium semine latius, unde marginatum apparet.*

vulpina.

763. *CAREX* spica supradecomposita inferne laxiore: spiculis androgynis ovatis sessilibus glomeratis: superne masculis. *Sp.* 1382. n. 10. *Gelr.* 5. 9. *Fris.* 388.

Gramen Cyperoides palustre majus spica compacta. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 87. *Comm. holl.* 52. *Morif. hist.* 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 24.

Oed. dan. t. 308.

Wild Water - Galigaan - Gras. Belg.

By de voorgaande, en veel aan de kanten der Grachten om Rotterdam.

muricata.

764. *CAREX* spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis, capsulis acutis divergentibus spinosis. *Sp.* 1382. n. 11.

Carex nemorosa, fibrosa radice, angustifolia minima, caule exquisitè triangulari, spica brevi interrupta. *Mich. gen.* 69. t. 32. f. 11.

Gramen nemorosum, spicis parvis asperis. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 100. *Morif. hist.* 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 27.

Oed. dan. t. 284.

Overvloedig te Hulsen by Nymegen; ook langs sommige Vaarten en Slooten om Rotterdam, en langs den Cingel aldaar, dog weinig (D. RAINVILLE.)

Glauceæ.

765. *CAREX* spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis, capsulis ovatis teretiusculis muticis divaricatis. *Sp.* 1382. n. 13.

By Groningen. (D. RAINVILLE.)

Ill. HALLERUS Hist. 1765. eandem esse vult cum *Carice muricata*, et tantum plantam juniorem.

nemora.

766. *CAREX* spiculis ovatis subsessilibus remotis androgynis, bracteis culmum æquantibus. *Sp.* 1383. n. 14.

Cyperoides angustifolium, spicis parvis sessilibus in foliorum alis. *Raj. hist.* 1295. *Morif. hist.* 3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 17. *Pluk. alm.* 178. t. 34. f. 3. *Scheuch. gram.* 483.

Oed. dan. t. 370.

Gemeen aan de kanten der Vyvers op Rosendaal by Arn-

Arnhem; langs de Graften om Nymegen; onder aan den boogendyk onder de dikke boomen buiten Rotterdam; by bet Huis ten Donk; en elders.

767. *CAREX* racemo composito, spiculis androgynis. *paniculata*
Sp. 1383. *n.* 17.

Cyperus longus inodorus sylvaticus. Baub. pin. 14.
theatr. 221.

Gramen *Cyperoides palustre elatius*, spica longiore laxa. *Raj. hist.* 1296. *Morif. bist.* 3. p. 244.
f. 8. *t.* 12. *f.* 23.

Gemeen langs diepe en door boomen overdekte graften by Rotterdam, 's Hage, Voorburg, Bodegraven, &c. (D. RAINVILLE.)

Variat panicula ampliori & tenuiori, imo et filiformi.

Spicis sexu distinctis: femineis sessilibus.

768. *CAREX* spicis confertis subsessilibus subrotundis: *flava*,
 dis: mascula linearis, capsulis acutis recurvis.
Sp. 1384. *n.* 18.

Gramen palustre aculeatum germanicum *f.* minus.
Baub. pin. 7. *theatr.* 109 *Comm. boll.* 53. *Morif. bist.* 3. p. 243. *f.* 8. *t.* 12. *f.* 19.

Water-Gras met Steekende Airen. Belg.

In laage waterachtige Velden by Amsterdam, Utrecht, Zwol, te Hulsen by Nymegen, en elders.

769. *CAREX* spicis linearibus erectis: mascula breviora inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distantibus. *Sp.* 1384. *n.* 20. *digitata.*

Gramen caryophyllatum montanum, spica varia.
Baub. pin. 4. *prodr.* 9.

Gramen caryophyllatum polycarpon, fructu triangulari. *Loef. pruss.* 112. *t.* 27.

In bet Bosch by Putten en Elspeet op de Veluwe.

770. *CAREX* spicis femineis sessilibus subsolitariis *montana*,
 ovatis masculæ approximatis, culmo nudo, capsulis pubescentibus. *Sp.* 1385. *n.* 21.

Cyperoides montanum, foliis angustis parvis,
Q 5 spi-

spica spadicea divisa. *Scheuch. gram.* 419.

Cyperoides alpinum saxatile, capillaceo folio, caule rotundo triquetro, spica feminali nigricante plerumque unica. *Mich. gen.* 64. t. 32. f. 3.

In de Duinen by Haarlem, en in de Heide by Hulsen buiten Nymegen. (D. RAINVILLE.)

Synonymum Scheuchzeri Ill. LINNÆUS dubitanter hic apposuit, Ill. HALLERUS omnino negat hanc esse plantam; sed Ill. SCHREBERUS recte statuit eandem esse, cum in uno eodemque cespite folia capillaria, atque latiuscula inveniantur.

globularis. 771. CAREX spica mascula oblonga, feminea sessili ovata folio florali breviori approximata. *Sp.* 1385. n. 22.

Cyperoides alpinum saxatile, capillaceo folio, caule rotundo triquetro, spica feminali nigricante plerumque unica, capsulis oblongis turbinate trilateris subhirsutis in apicem tenuissimum nonnihil bifidum terminatis. *Mich. gen.* 64. t. 32. f. 3.

Op de Duinen by Egmond op den Hoef.

filiformis. 772. CAREX spica mascula oblonga, femineis sessilibus oblongis: inferiore foliolo proprio brevior. *Sp.* 1385. n. 23. *Fris.* 389.

Cyperoides sylvaticum tenuifolium, spicis parvis tenuibus spadiceo-viridibus. *Scheuch. gram.* 425. t. 10. f. 11.

By Gouda, Haarlem, Groningen, en in Friesland op veele plaatsen in de Weiden, en aan de kanten der zelven; als ook aan sommige Wegen.

pilulifera. 773. CAREX spicis terminalibus confertis subrotundis: mascula oblonga. *Sp.* 1385. n. 24.

Gramen Cyperoides tenuifolium, spicis adsummitatem caulis sessilibus globulorum æmulis. *Pluk. alm.* 178. t. 91. f. 8.

Te Hulsen by Nymegen, en op de Duinen by Scheveningen. (D. RAINVILLE.)

Variat multum longitudine culmi & foliorum.

saxatilis. 774. CAREX spicis tribus ovatis sessilibus alternis; mascula oblonga. *Sp.* 1385. n. 25.

Ord.

Oed. dan. t. 159.

Op de Duinen by Haarlem en Scheveningen. (D. RAINVILLE.)

Spicis sexu distinctis: femineis pedunculatis.

775. CAREX spicis androgynis terminalibus pedun-^{strata.}
culatis: florentibus erectis; fructiferis pendu-
lis. Sp. 1386. n. 26.

Gramen alpinum pulchrum, foliis caryophyllæis,
spicis atris & tumentibus. Scheuch. gram. 481.

Oed. dan. t. 138.

Op de Duinen by Haarlem. (D. RAINVILLE.)

776. CAREX spicis ovatis pendulis: mascula longio-^{limosa.}
re erectiore, radice repente. Sp. 1386. n. 27.

Cyperoides spica pendula brevior, squamis
e spadiceo vel fusco rutilante viridibus. Scheuch.
gram. 442. t. 10. f. 15.

Gramen Cyperoides spica pendula minus. Baub.
pin. 85.

Oed. dan. t. 158?

Tusschen de Duinen by Haarlem. (D. RAINVILLE.)

777. CAREX spicis pedunculatis erectis remotis: fe-^{panicæ.}
mineis linearibus, capsulis obtusiusculis inflatis.
Sp. 1385. n. 39. Fris. 390.

Cyperoides foliis caryophyllæis, spicis e rariori-
bus & tumidioribus vesicis compositis. Mich.
gen. 61. t. 32. f. 11. Pluk. alm. 178. t. 91. f. 7.

Oed. dan. t. 261.

In de Veenen en natte Hei-gronden, te Hulsen by
Nymegen, Sneek, Groningen, en elders.

778. CAREX spicis pendulis, pedunculis geminatis. ^{pseudo-Cy-}
Sp. 1387. n. 32. Gelr. 511. ^{perus.}

Pseudo-Cyperus. Dod. pempt. 339.

Gramen Cyperoides spica pendula brevior. Baub.
pin. 6. Comm. boll. 51. Moris. hist. 340. p. 242.
f. 8. t. 12. f. 5.

Langs de Rivier het Spaarne, den Yssel, en 'aan
de

de kanten der Slooten op veele plaatsen.

distant.

779. *CAREX* spicis remotissimis subfessilibus, bractea vaginali, capsulis angulatis mucronatis. *Sp.* 1387. *n.* 33.

Gramen Cyperoides gracile alterum, glomeratis torulis spatio distantibus. *Morif. bist.* 3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 18.

Aan de weg tusschen Rotterdam en Gouda, by de eerste Schuur. (D. RAINVILLE.)

caespitosa.

780. *CAREX* spicis erectis cylindricis ternis subfessilibus: mascula terminali, culmo triquetro. *Sp.* 1388. *n.* 34.

Gramen Cyperoides caryophyllum, folio longiore et angustiore, spicis sessilibus compactis erectis. *Morif. bist.* 3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 14.

In de Turf-Veenen.

Spicis sexu distinctis: masculis pluribus.

acuta.

781. *CAREX* spicis masculis pluribus, femineis subfessilibus, capsulis obtusituculis. *Sp.* 1388. *n.* 35. *Geir.* 510. 512.

rufa.

- a. Gramen Cyperoides latifolium, spica rufa sive caule triangulo. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 83. *Comm. boll.* 51. *Morif. bist.* 3. p. 242. f. 8. t. 12. f. 1.

Variat hæc rursus.

a. *Spicis fructiferis androgynis.*

b. *Spicis fructiferis sessilibus, inferiore tantum pedunculata.*

c. *Spica fructifera inferiore longius pedunculata & pendula.*

d. *Spica mascula superiore clavata seu abrupta.*

- nigra major* β. *Cyperoides nigro-luteum vernum majus. Tourn. inst.* 529.

Gramen Cyperoides majus angustifolium. *Park. theatr.* 1295. *Raj. bist.* 1293. *Boerb. lugdb.* 2. p. 165. *n.* 2.

Graminis nigro-lutei verni varietas major. *Baub. bist.* 2. p. 494.

Hæc

Hæc gaudet sæpe spicis femineis superioribus binis.

7. *Cyperoides nigro-luteum vernum minus. Tourn. nigruminoz inst. 529.*

Gramen nigro-luteum vernum. Baub. hist. 2. p. 494. Comm. boll. 52. Boerb. lugdb. 2. p. 165. n. 3.

Gramen caryophyllatæ foliis minus, spica divulsa. Baub. pin. 3. theatr. 46. Boerb. n. 4.

Gramen spicatum foliis veronicæ caryophyllatæ. Lob. ic. 10.

Hæc porro variat

a. *Spicis femineis omnibus sessilibus.*

b. *Spicis femineis longioribus, inferiore pedunculata.*

c. *Spica feminea inferiore longissime pedunculata*

Op vochtige plaatsen. a. in de Wei-landen aan het Spaarne buiten Haarlem, om Utrecht, Rotterdam, Bodegraven, Utrecht, Zwol, in de Meben by Harderwyk, en elders. B. tusschen Rotterdam en Overschie. 7. in vochtige zand gronden.

Varietatis a. d. figura clavata in viva planta multo evidentior quam in sicca.

782. *CAREX spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis, capsulis inflatis acuminatis. Sp. 1388. n. 36. Gelr. 647. Fris. 391.*

Gramen Cyperoides angustifolium, spicis longis erectis Baub. pin. 48. theatr. 14. Comm boll. 51.

Gramen Cyperoides majus præcox, spicis turgidis teretibus flavescentibus. Moris. hist. 3. p. 242. f. 8. t. 12. f. 6.

Zegge, of Water-Riet-Gras. Belg.

Menigvuldig aan de kanten van sommige Vaarten en Slooten, en in laage moerassige Landen en Poelen.

III. *HALLERUS hist. pl. Helv. n. 1401. citans ad banc Caricem Floram metum Frugicam, excludit synonyma a me addita: sed ex qua ratione non video, cum mea non alia sint, quam quæ Ipse Carici vesicariæ adscripsit, ut conferenti patebit.*

783. *CAREX spicis remotis: masculis pluribus, femineis subpedunculatis erectis, capsulis hirtis. Sp. 1389. n. 37.*

Gramen spicatum, foliis & spicis hirsutis molli- bus. Baub. pin. 4. theatr. 48.

Gra-

Gramen Cyperoides polystachion lanuginosum.

Morif. hist. 3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 10. Pluk.

alm. 178. t. 34. f. 6.

Oed. dan. t. 379.

Veel op dorre zandige plaatsen; te Rotterdam op het
Bolwerk tusschen de steenen.

In humidis & herbosis crescit ad altitudinem 2. 3.

& 4. pedum.

T E T R A N D R I A.

L I T T O R E L L A.

lacustris. 784. LITTORELLA. Linn. mant. 295.

Plantago uniflora. Sp. 167. n. 16. Fris. 70.

Plantago floribus femineis sessilibus ad exortum
scapi uniflori maris. Fuss. act. gall. 1742. p. 131.
t. 7.

Gramen junceum minus, capitulis longissimis fila-
mentis donatis. Morif. hist. 3. p. 230. f. 8. t.

9. f. 3. opt.

Oed. dan. t. 170.

Op veele plaatsen in de Wouden in Friesland, in
Veen- en Zand-gronden.

B E T U L A.

alba.

785. BETULA foliis ovatis acuminatis ferratis. Sp.
1393. n. 1. Gelr. 519. Fris. 392.

Betula. Baub. pin. 427. Dod. pempt. 839. Comm.
boll. 16.

Berke-boom. Belg.

Op verscheide plaatsen, vooral in de Bosschen.

Plantatur etiam & crescit in arenosis Velaviæ, ubi
vix alia degit planta.

Alnus.

786. BETULA pedunculis ramosis. Sp. 1394. n. 5.
Fris. 303.

glutinosa. Alnus. Dod. pempt. 839. Gelr. 518.

Alnus rotundifolia glutinosa viridis. Baub. pin.
428.

Elze-boom. Belg.

β. Al.

- β. *Alnus folio incano. Baub. pin. 428. incana.*
 α. *Veel aan de Water-kanten. β. in de Salker-Waard.*

B U X U S.

787. *BUXUS. Sp. 1394. n. 1. Gelr. 517. Dod. pempt. sempervirens.*
 782.
Buxus arborescens. Baub. pin. 471.
Grove of Boom-Palm, Busboom of Bosboom. Belg.
Op de Duinkant buiten Haarlem by den Weligen berg by Overveen.
Pharm. BUXINUM lign.
An vera indigena sit, dubito.

U R T I C A.

788. *URTICA foliis oppositis ovalibus. Sp. 1396. urens.*
n. 5. Gelr. 515. Fris. 394.
Urtica urens minor. Baub. pin. 232. Comm. boll.
 116.
Kleine Brand-Netelen. Belg.
By de Wegen.
Pharm. URTICÆ MINORIS herb.
789. *URTICA foliis oppositis cordatis, racemis ge. dioica.*
minis. Sp. 1396. n. 6. Gelr. 515. Fris. 395.
Urtica urens maxima. Baub. pin. 232. Comm. boll.
 116.
Groote Netelen. Belg.
Op ruwe ongebouwde gronden langs de Wegen.
Pharm. URTICÆ. rad. herb.

P E N T A N D R I A.

X A N T H I U M.

790. *XANTHIUM caule inermi, foliis cordatis tri- strumarium*
nervatis. Sp. 1400. n. 1.
Xanthium. Fuchf. hist. 579. Dod. pempt. 39.
Lappa minor sive Xanthium diofcoridis. Baub.
 pin.

pin. 198. Comm. boll. 63.

Kleine Klitzen. Belg.

Aan den Yssel-dyk by Campen; te Utrecht buiten de Tolsteeg-poort; en op andere plaatsen.

A M A R A N T H U S.

Blitum. 791. AMARANTHUS glomerulis lateralibus: floribus trifidis, foliis ovatis retusis, caule diffuso. Sp. 1405. n. 11. Gelr. 522.

Blitum album minus. Baub. pin. 118. Cam. epit. 236. Comm. boll. 16.

Witte Mayer. Belg.

By de wegen op verscheide plaatsen.

P O L Y A N D R I A.

C E R A T O P H Y L L U M.

Samosum. 792. CERATOPHYLLUM foliis dichotomo-bigeminis, fructibus trispinosis. Sp. 1409. n. 1. Fris. 396.
Hydroceratophyllum folio aspero quatuor cornibus armato. Vaill. act. 1719. p. 21. t. 2. f. 1.
Equisetum sub aqua repens, foliis bifurcis. Loef. pruss. 67. t. 12.

Pinastella infirmioribus & hamosioribus caulibus, foliis instar cornu cervi divisis. Hall. jen. 350.
Millefolium aquaticum cornutum Raj. hist. 1. p. 191. Baub. hist. 3 p. 789. quoad descriptionem Comm. boll. 76.

Op veele plaatsen in de Slooten; overvloedig in de Kolken by den Ouden-Yssel, en in de Graffen om Harderwyk.

M Y R I O P H Y L L U M.

Spicatum. 793. MYRIOPHYLLUM floribus masculis interrupte spicatis. Sp. 1409. n. 1. Gelr. 525. Fris. 397.
Millefolium aquaticum pennatum spicatum. Baub. pin. 141. prodr. 73. f. 1. Comm. boll. 76.
Water.-Duizend-blad. Belg.

In de Vyvers en stilstaande Wateren op veele plaatsen.

794. MYRIOPHYLLUM floribus omnibus verticillatis ^{verticillatum.}
herinaphroditis. *Sp.* 1410. *n.* 2. *Frif.* 398.

Myriophyllum aquaticum minus. *Cluf. hist.* 2. p. 252.

Millefolium aquaticum, flosculis ad foliorum nodos. *Baub. pin.* 151. *Comm. boll.* 75.

In stilstaande Slooten by Tiel, te Loenen aan de Vecht; in Friesland in de Wouden, alwaar Veenen zyn; gelyk ook by Veenendaal in 't Sticht van Utrecht; en elders.

SAGITTARIA.

795. SAGITTARIA foliis sagittatis acutis. *Sp.* 1410. *Sagittifolia n.* 1. *Gelr.* 524. *Frif.* 399.

Sagitta aquatica minor latifolia. *Baub. pin.* 194. *Comm. boll.* 100.

Sagitta minor. *Dod. pempt.* 588.

Oed. dan. 1. 172.

c. Sagitta aquatica minor angustifolia. *Baub. pin.* 194. *Comm. boll.* 100.

f. Sagitta aquatica major. *Baub. pin.* 194. *Comm. boll.* 100.

Sagitta major. *Dod. pempt.* 588.

γ. Sagitta aquatica major, folio angustiore. *Boerb. lugdb.* 1. p. 46.

Serpents - Tongen. Belg.

In stilstaande Wateren en Slooten op veele plaatsen. c. By Oldenbrock in Gelderland, en by Overveen in Holland. f. By den Aardenhout. γ. In de Graften om Harderwyk; in de Slooten by Leerdam, en elders.

POTERIUM.

796. POTERIUM inerme, caulibus subangulosis. *Sp.* ^{Sanguisorva.}
1411. *n.* 1. *Gelr.* 523.

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta. *Baub. pin.* 160. *Comm. boll.* 88.

Pimpinella Sanguisorba. *Dod. pempt.* 105. *Cam. epit.* 777.

Pimpernel. Belg.

In de Duinen niet verre van Velsen; en in het
R. Bent-

Bentveld by Haarlem; overvloedig in de Weiden
langs den Yssel by Zutphen.
Pharm. PIMPINELLÆ rad. herb.

Q U E R C U S.

- Robur.* 797. QUERCUS foliis deciduis oblongis superne latioribus: sinubus acutioribus, angulis obtusis. *Sp.* 1414. *n.* 12. *Gelr.* 526. *Jngr.* 154. *Fris.* 490.
Quercus cum longo pediculo. *Baub.* *pin.* 420.
Comm. boll. 94.
Quercus. *Fuchsf. bist.* 229. *Loef. pruss.* 31. *t.* 69.
Eike-boom. Belg.
β. Quercus latifolia mas, quæ brevi pedunculo. *Baub.*
pin. 419. *Comm. boll.* 94.
Quercus platyphyllos mas. *Dalech. bist.* 2.
Veel op de Veluwe; in Friesland in de Wouden;
by Groningen in 't Goreght in verscheide bos-
schen. β. In het Haagse-bosch, Haarlemmer-
hout, en buiten Utrecht.
Pharm. QUERCUS cort. fol. glandes, gallæ.

F A G U S.

- Sylvestica.* 798. FAGUS foliis ovatis obsolete serratis. *Sp.* 1416.
n. 3. *Gelr.* 528. *Fris.* 401.
Fagus. *Baub.* *pin.* 419. *Dod. pempt.* 832. *Comm.*
boll. 37.
Beuke-boom. Belg. -
In veele Bosschen in 't wild.

C O R Y L U S.

- Avellana.* 799. CORYLLUS stipulis ovatis obtusis. *Sp.* 1417. *n.*
1. *Gelr.* 530. *Fris.* 402.
Corylus sylvestris. *Baub.* *pin.* 418.
Avellana nux sylvestris. *Fuchsf. bist.* 393.
Haselaar, Haaze-nooten-boom. Belg.
St. Lamberts-nooten. *Gelris.*
In het Haagse-Bosch; in veele Bosschen in Gelder-
land en Overysel; op verscheide Woud-plaat-
sen in Friesland; en in 't Goreght.
Pharm. AVELLANÆ nux.

MONADELPHIA.

P I N U S.

200. PINUS foliis geminis: primordialibus folitariis. *Sp. 1418. n. 1. Gelr. 532.*

Pinus sylvestris. Baub. pin. 491. Comm. boll. 36.

Pinus sylvestris vulgaris genevensis. Baub. hist. 1. p. 253.

Wilde Pyn-boom, Sparre-boom. Belg.

Op weele plaatsen in Gelderland; in het Bosch van Uitenbogaard buiten Naarden; in 't Schaapen-bosch buiten Haarlem; te Lisse tusschen Haariem en Leiden; te Drybergen, Maansbergen, &c. in 't Sticht van Utrecht.

Pharm. PINI resina, Pix alba & nigra, Pix liquida, Terebintina communis.

In Prædio Viri Ill. H. a WESTERVELT Essen-burgo prope Harderovicum, A. 1753. lectus est ramus hujus arboris conis mire onustus, ita quidem ut centum circiter numerari potuerint, qui invicem insidentes globum capitis humani magnitudinem æquontem efficiebant.

SYNGENESIA.

B R Y O N I A.

201. BRYONIA foliis palmatis utrinque calloso-sca- *alba.*
bris. *Sp. 1438. n. 1. Gelr. 536.*

Bryonia aspera sive alba, baccis rubris. Baub. pin. 297. Comm. boll. 17. Moris. hist. 2. p. 4. f. 1. t. 1. f. 5.

Wilde Wyngaard. Belg.

Veel aan de Waal-dyk by Nymegen en Tiel; aan de dykjes langs de Wegen buiten Zutphen; aan de Hoven buiten Harderwyk; in de Duinen buiten

's Hage, Haarlem, Alkmaar; in de Heggen en
 Bosſchen in Friesland; en elders op ſchaduwach-
 tige plaatsen.

Pharm. BRYONIÆ rad. far.

Baccis nigris, quæ apud nos, ſemper monoica.

C L A S S I S XXII.

D I O E C I A.

D I A N D R I A.

V A L L I S N E R I A.

802. VALLISNERIA. Sp. 1441. n. 1.

*Spiralis.*Vallisneria palustris, algæ folio, italica, foliis
in summitate denticulatis, flore purpurascente.*Mich. gen. 12. t. 10. f. 1.*

Habitat in piscinis juxta fossas Belgii rarius. (Linn.

b. Cliff. 454.)

S A L I X.

803. SALIX foliis ferratis glabris, floribus pentan-*pentandra.*
dris. Sp. 1442. n. 3. Gmel. fib. 1. p. 153. t.

34. f. 1.

Salix folio laureo five lato glabro odorato. Raj.

*hist. 1420. angl. 3. p. 449.**Duin-wilg. Belg.**Aan de Duinkant buiten Haarlem.*804. SALIX foliis ferratis ovatis acutis glabris: ferra-*vitellina.*
turis cartilagineis, petiolis calloso-punctatis.*Sp. 1442. n. 5.*

Salix fativa lutea, folio crenato. Baub. pin. 473.

Salix persicæ folio, non auriculato. Comm. boll. 101.

*Geele Wilg.**By 't Huis te Berkenrode buiten Haarlem, en ook.*

in veele Waarden aan de Rivieren.

Arbor stature parvæ. Folia longiora & angustiora, quam Salicis fragilis, serrata, pagina superiore splendentia viridia, inferiore pallidiora. Rami juores sunt tenaces flexiles. (Comm.)

amygdalina 805. *SALIX* foliis ferratis glabris lanceolatis petiolatis, stipulis trapeziformibus. *Sp.* 1443. n. 6.

Salix folio amygdalino utrinque virente aurito.

Baub. pin. 43.

Salix sylvestris latifolia. Tabern. ic. 1037.

Wervelen-bout. Vulgo.

In de Salker-Waart; in Vieracker en aan den Tol-dyk buiten Zutphen; ook buiten Wyk by Daurstede, en elders.

Eligno scalarum gradus conficiuntur; rami teneriores ad vitilia inserviunt.

fragilis. 806. *SALIX* foliis ferratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis. *Sp.* 1443 n. 8.
Fl. lapp. 349. t. 8. f. B.

Salix fragilis. Baub. pin. 474. prodr. 159. Comm. boll. 101.

Salix, folio longo latoque splendente, fragilis.

Raj. angl. 3. p. 448. n. 8. cantab. 143.

Katten-bout. Vulgo.

By Bloemendaal, aan de Duinkant langs de Bleeckeryen; by Tiel, Uilenpas, Ouden-Ailer en elders in Gelderland aan de Slooten.

purpurea. 807. *SALIX* foliis ferratis glabris lanceolatis: inferioribus oppositis. *Sp.* 1444 n. 10.

Salix vulgaris nigricans, folio non serrato. Baub. pin. 473. Boerb. lugdb. 2. p. 210.

Salix rubra minime fragilis folio longo angusto. Baub. hist. 1. p. 215.

♀. *Salix vulgaris rubens. Baub. pin. 473. Boerb. lugdb. 2. p. 210. Comm. boll. 101.*

γ. *Salix folio longo non auriculato, viminea rubra. Raj. cantab. 143. Comm. boll. 102.*

Roode Wilg. Belg.

Op veele plaatsen aan de Waterkanten. γ. In Zeeland; en in de Zyp.

Helix. 808. *SALIX* foliis ferratis glabris lanceolato-linearibus: superioribus oppositis obliquis. *Sp.* 1444. n. 11. Sa-

Salix humilis, capitulo squamoso. *Baub. pin.* 474.

Salix tenuior, folio minore utrinque glabro, fragilis. *Baub. bist.* 1. p. 213. f. 2. *Comm. boll.* 101.

Salix humilior, foliis angustis subcæruleis ex adverso binis. *Raj. bist.* 1421. *cantab.* 144. *angl.* 3. p. 448.

Bittere Wilg. Vulgo.

By Berkenroode, en niet verre van Velsen in de Duinen; dog niet overvloedig.

809. *SALIX* foliis integris ovatis acutis supra subvil. *arenaria*.
lofis, subtus tomentosis. *Sp.* 1447. n. 23. *Gelr.* 643.

Salix pumila, foliis utrinque candicantibus & lanuginosis. *Baub. pin.* 474. *Comm. boll.* 102. *Gmel. fib.* 1. p. 164. t. 36. f. 1.

Klein Zand-Wilg. Belg.

Kleine Wirf. Vulgo.

Overvloedig in de Duin-valeyen; en in de Meben by Harderwyk.

810. *SALIX* foliis integerrimis ovatis subtus pubescen. *fusca*.
tibus. *Sp.* 1447. n. 26. *Fris.* 403. *Linn. lapp.* 364. t. 8. f. R.

Salix pumila, folio utrinque glabro. *Baub. bist.* 1. p. 217.

Salix pumila brevi angustoque folio incano. C. B. *Comm. boll.* 102.

In de Duinen; en in de Wouden in Friesland.

811. *SALIX* foliis integerrimis lanceolato-linearibus *rosincri-*
strictis sessilibus subtus tomentosis. *Sp.* 1448. n. *folia*.
27. *Gelr.* 542. *Fris.* 404.

Salix humilis angustifolia. *Baub. pin.* 474.

Salix humilis repens angustifolia. *Lob. ic.* 2. p. 137.

Veel in de Gagel-kampen by Harderwyk; en op de Heivelden in de Wouden in Friesland.

812. *SALIX* foliis ovatis rugosis subtus tomentosis *caprea*.
undatis superne denticulatis. *Sp.* 1448. n. 28.
Gelr. 540. *Fris.* 405.

Salix latifolia rotunda. *Baub. pin.* 474. *Raj. angl.* 3. p. 449. *Comm. boll.* 101.

β. *Salix* foliis obscure crenatis utrinque villosis ovato-oblan-

oblongis. *Linn. lapp.* 365. *t.* 3. *f.* S.

Salix latifolia inferne hirsuta. Baub. bist. 1. *p.* 215. 2.

Salix folio ex rotunditate acuminato. Baub. pin.

474. *Comm. boll.* 101.

Ronde Ruige Wilg. Belg.

Water-Wilg. Vulgo.

Aan 't eind van 't Kraayenest by Haarlem, in de Duinen by Westerhout; en in de Salcker-waart.

cineritis. 813. *SALIX* foliis subintegerrimis lanceolato-lineari-bus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis. *Sp.* 1448. *n.* 29. *Gelr.* 538. *Frif.* 406.
Salix angustis & longissimis foliis crispis, subtus albicantibus. Baub. bist. 1. *p.* 212. *Comm. boll.* 101.

Salix folio longissimo. Raj. angl. 3. *p.* 450.

Rieswaart. Vulgo.

Overvloedig langs den Yssel, Rhyne en Leck; ook by de voorige, en in de Wouden in Friesland.

cinerea. 814. *SALIX* foliis subserratis oblongo-ovatis subtus subvillosis, stipulis dimidiato-cordatis. *Sp.* 1449. *n.* 30. *Frif.* 407.

Salix foliis integris glabris lanceolato-ovatis. Linn. lapp. 358.

Op veele plaatsen in Friesland, in de Wouden, aan wegen, in gruppels en bosschen. (MEESE)

alba.

815. *SALIX* foliis lanceolatis acuminatis serratis utrinque pubescentibus: serraturis infimis glandulosis. *Sp.* 1449. *n.* 31. *Gelr.* 537. *Frif.* 408.

Salix vulgaris alba arborescens. Baub. pin. 473. *Comm. boll.* 101.

• *Salix maxima fragilis alba hirsuta. Baub. bist.* 1. *p.* 212.

Wilge-boom. Belg.

Langs de Wegen aan de Water-kanten.

Pharm. *SALICIS cort. fol.*

T R I A N D R I A.

E M P E T R U M.

816. EMPETRUM procumbens. *Sp.* 1450. *n.* 2. *Gelr. nigrum.*

559. *Fris.* 409.

Erica baccifera procumbens nigra. Baub. pin. 486.

Comm. boll. 34.

Erica baccifera matthioli. Baub. hist. 1. *p.* 526.

Beziën draagende Heide. Belg.

Kraay-Heide. Rusticis Velaviæ.

Op de Heide by Ermello, Elspeet, op den Tryfelberg, en elders op de Veluwe; by Bergum, Seyderhuysum, en elders in Friesland; ook in Zee-land.

T E T R A N D R I A.

V I S C U M.

817. VISCUM foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. *Sp.* 1451. *n.* 1.

Viscum baccis albis. Baub. pin. 423. *Comm. boll.*

115.

Viscum. Cam. epit. 555. *Dod. pempt.* 740.

Marextakken. Belg.

Op verscheide soorten van Boomen; te Amsterdam op de Ulmus; in de Haarlemmer-hout op de Betula; by Dordrecht op de Prunus; en voorts op de Quercus, en meer soorten van Boomen. (volgens COMMELYN, dog door den Heer D. HOUTTUYN, my, en veele anderen niet gevonden.)

Pharm. VISCI QUERCINI lign.

H I P P O P H A E.

818. HIPPOPHAE foliis lanceolatis. *Sp.* 1452. *n.* 1. *Rhamno-*

Rhamnus salicis folio angustiore, fructu flavescen-
te. Baub. pin. 755. *Comm. boll.* 98.

R 5

Rham-

Rhamni species. *Cam. epit.* 81.

Oed. dan. t. 265.

Duin - Doorn. Belg.

Scheit - beziën. Vulgo.

In de Duinen buiten 's Gravenhage, Haarlem, by Overveen, Zandvoort, Catwyk, Noordwyk, &c. buiten Alkmaar naar Egmond op den Hoef, en op meer plaatsen.

M Y R I C A.

Gals.

819. MYRICA foliis lanceolatis subserratis, caule suffruticoso. *Sp.* 1453. *n.* 1. *Geir.* 543. *Fris.* 410.

Rhus myrtifolia belgica. *Baub. pin.* 414. *Comm. boll.* 98.

Chamæleagnus. *Dod. pempt.* 780.

Oed. dan. t. 327.

Gagel. Belg.

Post. Zutphanienfibus & Twentinis.

Luis - kruid. Quibusdam,

Overvloedig beneden Nymegen aan de Waalkant, en in vochtige Hei - kampen by Zutphen, Harderwyk, Utrecht, Zwol, Enscheide; in de Veenen by Mydrecht; in de Wouden in Friesland; agter Haren aan den weg naar de Waterhuizen, en aan den weg naar Onnen en Noorlaren by Groningen; en elders.

Mas frequentissime, raro Femina occurrit.

Odor resinofus e longinquo percipitur.

Dolia, quibus carnes salita byeme servantur, hujus odore prius imbuuntur.

Rustici ramulos lectis supponunt ad fugandos pulices & pediculos.

P E N T A N D R I A.

H U M U L U S.

Lupulus. 820. HUMULUS. *Sp.* 1457. *n.* 1. *Geir.* 546. *Fris.* 411.

Lupulus mas. *Baub. pin.* 298. *Comm. boll.* 69.

Lupulus femina. *Baub. pin.* 298. *Cam. ept.* 954.

Hop. Belg.

Veet

Veel langs de Wegen op schaduwachtige plaatsen, by Harderwyk, Leerdam, Heemstede, Utrecht, Wyk by Duurstede, te Glimmen en op de Mielhorst by Groningen; in 't Haagse-Bosch; in de Wouden in Friesland; en elders.

Pharm. LUPULI *herb. coni.*

O C T A N D R I A.

P O P U L U S.

821. POPULUS foliis subrotundis dentato-angulatis *alba*.

subtus tomentosis. Sp. 1463. n. 1. Gelr. 547.

Populus alba, majoribus foliis. Baub. pin. 429.

Comm. boll. 92.

Populus alba. Dod. pempt. 835.

Witte Populier, of Peppel-boom, Abeel-boom. Belg. Bevest. Gelris.

β. Populus alba, minoribus foliis. Baub. pin. 429.

Boerb. lugdb. 2. p. 211.

Veel in de Duinen by Heemstede, ook buiten Tiel en Utrecht op ruwe plaatsen.

822. POPULUS foliis subrotundis dentato-angulatis *tremula*.

utrinque glabris. Sp. 1464. n. 2. Gelr. 548.

Fris. 412.

Populus tremula. Baub. pin. 429. Comm. boll. 92.

Populus libyca. Dod. pempt. 836.

Ratelaar, Espen-boom. Belg.

Veel by Tiel, Harderwyk, Wageningen, Zwol, in 't Haagse-Bosch, en elders.

823. POPULUS foliis deltoidibus acuminatis ferratis *nigra*.

Sp. 1464. n. 3. Gelr. 549.

Populus nigra. Baub. pin. 429. Dod. pempt. 836.

Comm. boll. 92.

Populier-boom, Peppel-boom. Belg.

Op veele plaatsen langs de Wegen, en in de Duinen.

Pharm. POPULI NIGRÆ *gemmæ f. oculi.*

E N N E A N D R I A.

M E R C U R I A L I S.

- annua.* 824. MERCURIALIS caule brachiato, foliis glabris, floribus spicatis. *Sp.* 1465. *n.* 3. *Gelr.* 550. *Fris.* 413.

M A S.

F E M I N A.

- | | |
|--|--|
| <p>Mercurialis spicata sive femina. <i>Baub. pin.</i> 121. <i>Comm. boll.</i> 74. <i>Morif. hist.</i> 2. p. 612. f. 5. t. 34. f. 2. <i>Bingel-kruid.</i> Belg.</p> | <p>Mercurialis testiculata sive mas. <i>Baub. pin.</i> 121. <i>Comm. boll.</i> 74. <i>Morif. hist.</i> 2. p. 612. f. 5. t. 34. f. 1.</p> |
|--|--|

Op vochtige schaduwachtige plaatsen in de Moes - be-
ven, veel by Harderwyk.

Pharm. MERCURIALIS berb.

H Y D R O C H A R I S.

- Morsus ranæ.* 825. HYDROCHARIS. *Sp.* 1466. *n.* 1. *Gelr.* 551. *Fris.* 414.
Nymphæa alba minima. *Baub. pin.* 193. *Comm. boll.* 81.
Ranæ morsus. *Dod. pempt.* 583. f. 2.
Vorsche-beet. Belg.
Overvloedig in stilstaande Slooten en Graften.

M O N A D E L P H I A.

J U N I P E R U S.

- communus.* 826. JUNIPERUS foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus. *Sp.* 1470. *n.* 1. *Gelr.* 552.
Juniperus vulgaris fruticosa. *Baub. pin.* 488. *Comm. boll.* 67.
Juniperus. *Dod. pempt.* 852.

Genever - boom. Belg.

Dammeren - hout, Vrakel - beſſen. Ruſticis.

Op de Veluwe op verſcheide plaatſen, ook tuſſchen
Utrecht en Amersfoort, en omtrent Zwol.

Pharm. JUNIPERI lign. bacc. gummi.

*Juniperus ſaluberrima arbor eſt, ſed ſi homo diu
verſatur aut dormit ſub ejus umbra, per hanc
atmoſphæram mutatur quaſi a nimio vina. (BOERH.
morb. nerv. 232.)*

CLASIS XXIII.
 POLYGAMIA.
 MONOECIA.

HOLCUS.

mollis.

827. *HOLCUS* glumis bifloris nudiusculis: flosculo hermaphrodito mutico; masculo arista geniculata. *Sp.* 1485. n. 6. *Schreb. gram.* 149. t. 20. f. 2.

Gramen caninum longius radicatum majus. *Baub. pin.* 1. *Comm. boll.* 46.

Gramen caninum longius radicatum molle. *Raj. hist.* 1285. *Scheuch. gram.* 235. t. 4. f. 25.

- β. Gramen caninum longius radicatum minus. *Baub. pin.* 1. *Comm. boll.* 46.

In de zandige Bouw-landen buiten Haarlem omtrent Heemstede; aan het Haagse-Bosch by Zorgvliet; en elders.

Variat paniculae colore viridi, olivaceo, flavescente, et amplitudine.

lanatus.

828. *HOLCUS* glumis bifloris villosis: flosculo hermaphrodito mutico; masculo arista recurva. *Sp.* 1485. n. 5. *Gelr.* 40. *Fris.* 415.

Holcus panicula laxa nutante, glumis oblongis, foliis acuminato-setaceis. *Schreb. gram.* 145. t. 20. f. 1.

Gramen pratense paniculatum molle. *Baub. pin.* 2. *prodr.*

prodr. 3. *theatr.* 27. *Comm. boll.* 46. *Morif. bist.* 3. p. 202. f. 8. t. 6. f. 34. *Scheuch. gram.* 234. t. 4. f. 24. A. B.

Gramen paniculatum molle, panicula dilute cærulea. Loef. pruss. 3. t. 25.

Gramen lanatum. Dalech. bist. 425.

Op booge zandige Velden buiten Ilarderwyk, Arnhem, Haarlem, Zwol, &c. in de Wouden in Friesland.

Variat glumarum & antherarum colore albo, dilute purpureo, purpureo et nigro. Variat etiam paniculis striculis et veluti spicatis, paniculisque amplioribus diffusis. Aristæ in viva planta fere omnes rectæ. Petala interdum longissime excresecunt.

829. *HOLCUS* glumis trifloris muticis acuminatis: flo *odoratus*
sculo hermaphrodito diandro. *Sp.* 1435. n. 7.

Herocloe. Gmel. fib. 1. p. 101.

Gramen paniculatum odoratum. Baub. pin. 7. *prodr.* 7.

Gramen mariæ borussorum. Loef. pruss. III. t. 26. *Aan den weg tusschen Rotterdam en Overschie; ook by Gouda en Bodegraven. (D. RAINVILLE.)*

Flosculus intermedius minor constanter fere femineus est, rarissime hermaphroditus diandrus apud nos conspicitur.

V A L A N T I A.

830. *VALANTIA* floribus masculis quadrifidis, pe- *Cruciata.*
dunculis diphyllis. *Sp.* 1491. n. 6. *Gelr.* 73. *app.* p. 244.

Cruciata hirsuta. Baub. pin. 335. f. 9. t. 21. f. 1.

Cruciata. Dod. pempt. 357.

Overvloedig in de Laanen van de Heerlykheid Loenen en Hemmen in de Betuwe; by Zutphen, Rysselt, op 't Blik, en elders in 't Graafschap Zutphen; in de Marsstraat by de Latmer, en by Brummen op de Veluwe; aan den laage weg tusschen Wageningen en de Greb; aan den Dyk tusschen Zoelmonden Beuzichem in 't Graafschap Buuren; by Amerongen in 't Sticht van Utrecht.

P A R I E T A R I A.

831. *PARIETARIA* foliis lanceolato-ovatis, pedun- *officinalis.*
cul-

culis dichotomis, calycibus diphyllis. *Sp.* 1492.
n. 1. *Gelr.* 554.

Parietaria officinarum et dioscoridis. *Baub. pin.*
121. *Comm. boll.* 85. *Morif. bist.* 2. p. 600. f. 5.
t. 30. f. 1.

Helxinc. Cam. epit. 849.

Oed. dan. t. 521.

Glas-kruid. Belg.

*Aan oude muuren te Nymegen, Tiel, Zutphen,
Harderwyk, Haarlem, Leerdam, Utrecht, Zwol;
aan de Tolkamer te Arnhem; te Alkmaar in den
Hout; te Honswyk aan den Dyk; en elders.*

A T R I P L E X.

Portulacoides. 832. *ATRIPLEX* caule fruticoso, foliis obovatis.
Sp. 1493. n. 2. *Fris.* 416.

Halimus f. Portulaca marina. *Baub. pin.* 120. *Comm.*
boll. 56.

Portulaca marina. *Dod. pempt.* 771.

Zee- Porcelyn. Belg.

*Langs het Zee- en Maas- strand achter 's Gravezan-
de; op het Koe gras by Texel; aan de Zee- Dyken
en Duinen der Zeeuwse- Eilanden; tusschen Rop-
tazyl en Dykshoek, en elders in Friesland; aan
den Dollert by Delfzyl.*

laciniata. 833. *ATRIPLEX* caule herbaceo, foliis deltoidibus
dentatis subtus argenteis. *Sp.* 1494. n. 8. *Gelr.*
557. *Fris.* 417.

Atriplex maritima laciniata. *Baub, pin.* 120. *Comm.*
boll. 14. *Morif. bist.* 2. p. 607. f. 5. t. 32. f. 17.

Atriplex marina. *Dod. pempt.* 615.

Zee- Melde. Belg.

*Aan het Zeestrand by Harderwyk; langs de Mui-
der- dyk; langs 't Maasstrand achter 's Grave-
zande; aan de Zee- dyk tusschen de Helder en 't
Nieuwendiep; en in Friesland by de voorige.*

hastata. 834. *ATRIPLEX* caule herbaceo, calycis valvulis fe-
mineis magnis deltoidibus sinuatis. *Sp.* 1494.
n. 9. *Gelr.* 644.

*Atriplex sylvestris annua, folio deltoide triangu-
lari sinuato & mucronato, hastæ cuspidi simili.*

Morif. bist. 2. p. 607. f. 5. t. 32. f. 14.

*Langs de Wegen en op Mesthoopen omtrent Amster-
dam*

dam en Zwol.

Hanc plantam COMMELINUS indicavit nomine
Atriplicis sylvestris alteræ C. B. Vid. Comm.
Cat. pl. Horti Med. Amst. p. 45.

835. ATRIPLEX caule herbaceo patulo, foliis sub-patula-
 deltoideo-lanceolatis, calycibus seminum disco
 dentatis. *Sp.* 1494. n. 10. *Gelr.* 556. *Fris.* 418.
Atriplex angulato oblongo folio. Baub. pin. 119.
Comm. boll. 14.

Atriplex sylvestris polygoni f. helxines foliis.
Lob. ic. 257.

Laage wilde Melde. Belg.

Smeelje. Ultrajectinus.

By de Wegen, in Moeshoven, Zaaï-landen, by
Mest-en Vulnis-boopen.

836. ATRIPLEX caule herbaceo erecto, foliis omni-littoralis.
 bus linearibus integerrimis. *Sp.* 1494. n. 11.
Fris. 419.

Atriplex angustissimo & longissimo folio. Tourn.
inst. 505. *Herm. lugdb.* 79.

Atriplex maritima angustifolia. Comm. boll. 14.

Zeer overvloedig aan de Wierdyk naar 't Nieuwe-
diep, en aan die van Texel; in de Buitendyksche
landen aan het Y; langs 't Maasstrand achter
's Gravezande; aan 't Zeestrand tusschen Harlin-
gen en Dykshoek, &c. in Friesland; en by
Delfzyl.

A C E R.

837. ACER foliis ququelobis inæqualiter ferratis, *Pseudo-Pla-*
 floribus racemosis. *Sp.* 1495. n. 2. *Gelr.* 228. *tanus.*
Acer montanum candidum. Baub. pin. 430. *Comm.*
boll. 3.

Acer majus. Dod. pempt. 840. *Lob. hist.* 614.

Dubam. arb. 1. t. 36. f. 1.

Esch-doorn, Aborn-boom, Luiten-boom, Violen-hout
of boom, Schotsche-Linde-boom. Belg.

In Hierden by Greven-hof, in Hulshorst, en
elders buiten Harderwyk; in de Haarlemmer-
hout; in 't Bosch van 't Huis te Nieuwenburg
buiten Alkmaar; zeer veel aan de Goojer-Wete-
ring achter Zandenburg by Wyk te Daarstede;

en op meer andere plaatsen.
Forſan olim aliunde allata.

campeſtre. 838. *ACER* foliis lobatis obtuſis emarginatis. *Sp.* 1497.
n. 7. *Gelr.* 227.

Acer campeſtre & minus. *Baub.* pin. 431. *Comm.*
boll. 4.

Acer minus. *Dod. pempt.* 840.

Kleine Eſch-doorn, *Boog-hout.* Belg.

Effen-doorn. *Ruſticis.*

Spaanſche-Aak. *Vulgo.*

In Eldrik, *Wehl*, en elders in 't *Graaffſchap Zutphen*; op *Eſſenburg* by *Harderwyk*; in de *Haarlemmer-hout*; in 't *Berger-boſch* buiten *Alkmaar*; ook by *Deventer*, *Zwol*, en elders.

D I O E C I A.

F R A X I N U S.

excelsior. 839. *FRAXINUS* foliolis ferratis, floribus apetalis.
Sp. 1509. *n.* 1. *Gelr.* 558. *Friſ.* 420.

Fraxinus excelsior. *Baub.* pin. 416. *Comm.* *boll.*
 38.

Fraxinus. *Dod. pempt.* 833.

Eſſchen-boom. Belg.

Op veele plaatsen aan de *Wegen*, en in de *Boſſchen*;
 ook op oude *Muiren*.

Pharm. FRAXINI cort. *ſem.*

C L A S S I S XXIV.

CRYPTOGAMIA.

F I L I C E S.

E Q U I S E T U M.

840. *EQUISETUM* caule spicato, frondibus com- *sylvaticum*,
positis. *Sp.* 1516. n. 1.

Equisetum sylvaticum. Tabern. bist. 562.

Equisetum sylvaticum, tenuissimis setis. Baub.

pin. 16. *theatr.* 245. *Boerb. lugdb.* 2. p. 107.

† *Volgens BOERHAAVE.*

841. *EQUISETUM* scapo fructificante nudo; sterili *arvense*,
frondoso. *Sp.* 1516. n. 2. *Gelr.* 560. *Fris.* 421.

Equisetum arvense longioribus setis. Baub. pin.
16.

Equisetum pratense, longissimis setis. Baub. pin.
16. *theatr.* 246. f. 8.

Hermoes, Paarde-Staart. Belg.

Roobol, Unjer. Rusticis.

In laage Wei-landen; ook in de Duinen.

842. *EQUISETUM* caule angulato, frondibus sim- *palustre*.
plicibus. *Sp.* 1516. n. 3. *Gelr.* 561. *Fris.* 422.

Equisetum palustre, brevioribus setis. Baub. pin.

16. *theatr.* 242. *Comm. holl.* 33.

Klein Water-Paarde-Staart. Belg.

Hout-pypen. Groningans.

β. *Equisetum palustre minus polystachyon. Baub.*
pin.

pin. 16. *prodr.* 24. *Raj. angl.* 3. *p.* 131. *t.* 5. *f.* 3.

In vochtige zandige gronden, en aan de Duin-beekjes; veelvuldig in de Slooten van 't Goreght buiten Groningen β. Tusschen Oudehorne en Oude-Berkoop dicht aan het Tol-buis in een uitwatering aan de Rivier de Kuinder.

Fluviale. 843. *EQUISETUM* caule striato, frondibus subsimplicibus. *Sp.* 1517. *n.* 3.

Equisetum palustre, longioribus setis. *Baub. pin.* 15. *theatr.* 242. *Comm. boll.* 35.

Groot Paarde-Staart, Hermoes. Belg. Breekebeen. *Ultrajectinis.*

β. *Equisetum palustre*, tenuissimis & longissimis setis. *Baub. pin.* 16. *prodr.* 24. *Baub. hist.* 3. *p.* 729. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 107. *n.* 4.

In vochtige Wei-landen, en aan de kanten der Slooten.

Pharm. CAUDÆ EQUINÆ herb.

Agemale. 844. *EQUISETUM* caule nudo scabro basi subracemoso. *Sp.* 1517. *n.* 6. *Gelr.* 562.

Equisetum. *Cam. epit.* 770. *f.* A.

Equisetum foliis nudum non ramosum, seu junceum. *Baub. pin.* 16. *theatr.* 248. *f.* 10. *Comm. boll.* 33.

Equisetum foliis nudum ramosum. *Baub. pin.* 16. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 107.

Groot Paarde-Staart. Belg.

Schaafstroo. Vulgo.

In de Bosschen by ter Wolde op de Veluwe, en aande Land-straat in 't Graafschap Zutphen; als ook in stilstaande Slooten en Graften by de Vecht omtrent den Berg; en op meer plaatsen.

Scriniariis ad levigandum inservit, unde Schaafstroo appellatur.

O P H I O G L O S S U M.

vulgatum. 845. *OPHIOGLOSSUM* fronde ovata. *Sp.* 1518. *n.* 1. *Gelr.* 564.

Ophioglossum vulgatum. *Baub. pin.* 548. *Comm. boll.* 82.

Ophioglossum. *Dod. pempt.* 139.

Oed.

Oed. dan. t. 147.
Adders-tong, Speer-kruid, Cbristi Lancet. Belg.
In de Duin-valeyen by 's Hage, en 't Huis te Brede-
rode; en in vochtige landen by Zutphen en Zwol.

O S M U N D A.

846. *OSMUNDA* scapo caulino solitario, fronde pin- *Lunaria*
 nata solitaria. *Sp. 1519. n. 2.*

Lunaria racemosa minor & vulgaris. *Baub. pin.*

354. *Comm. boll. 68.*

Lunaria minor. *Cam. epit. 643.*

Oed. dan. t. 18.

Maan-kruid. Belg.

In de Duin-valeyen; veel achter 't Foodan Kerkhof
by 's Hage.

847. *OSMUNDA* frondibus bipinnatis apice racemi- *regalis.*
 feris. *Sp. 1521. n. 12. Gelr. 563. Fris. 423.*

Felix ramosa, non dentata florida. *Baub. pin. 357.*

Comm. boll. 38.

Felix palustris. *Dod. pempt. 463.*

Oed. dan. t. 217.

Water-Varen, Groote-Varen. Belg.

Aan donkere vochtige kanten der Slooten in Huls-
horst, Hierden, Tonzel, en elders omtrent
Harderwyk; by Naarden, Zwol; by Balk en op
meer plaatsen in de Wouden in Friesland; by de
Mickelhorst buiten Groningen.

Pharm. OSMUNDÆ REGALIS rad.

848. *OSMUNDA* frondibus lanceolatis pinnatifidis: *Spicant.*
 laciniis confluentibus integerrimis parallelis. *Sp.*

1522. *n. 16. Gelr. 566. Fris. 424.*

Lonchitis minor. *Baub. pin. 359.*

Lonchitis aspera. *Dod. pempt. 469.*

Polypodium folio vario. *Tourn. inst. 540.*

Struthiopteris. *Hall. bist. 1687.*

Oed. dan. t. 99.

Te Hulsen by Nymegen; in 't Bosch van Claren-
beek by Arnhem; in Tonzel aan de Nykerker-
weg buiten Harderwyk; omtrent den Tryffelberg
by Meulekate buiten Hattem; by den Zwalu-
wenberg; tusschen de Bilt en Zeist buiten Utrecht;
op veele plaatsen in de Wouden in Friesland; op

de Mickelhorst, en aan den weg naar Onnen; en op veele andere plaatsen in de Provintie Groningen; en elders aan byna uitgedroogde Slooten onder de boomen.

III. HALLERUS (bibl. bot. tom. 2. p. 309.) recensens plantas minus vulgares in Flora Gelro-Zutphanica a me enumeratas, hanc plantam pene incredibilem pronunciat; sed si eximius ille Lotanicus hanc provinciam unquam peragrasset, procul dubio de veritate convictus fuisset; eademque etiam hæc planta non minus vulgaris in Dioecesi Ultrajectina a me, in Frisia ob Hortulano MEESE, et in Provincia Groningana a peritis Botanicis D. RAINVILLE & VAN MARUM observata fuit.

Legi hanc plantam fronde superne bifida prope Harderovicum.

P T E R I S.

aguilina.

849. PTERIS frondibus supradecompositis: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis, infinis pinnatifidis; superioribus minoribus. Sp. 1533. n. 13. Gelr. 565. Fris. 425.

Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis. Baub. pin. 357. Comm. boll. 38.

Filix femina. Fuchs. hist. 596. Cam. epit. 992. Dod. pempt. 462.

Varen - Wyfke. Belg.

Overvloedig in de Boffchen op veele plaatsen; en in de Duinen by Bennebroek, Egmond, en elders.

A S P L E N I U M.

Scelopendrium.

850. ASPLENIUM frondibus simplicibus cordato-lingulatis integerrimis, stipulis hirsutis. Sp. 1537. n. 3.

Phyllitis. Cam. epit. 579. Dod. pempt. 567.

Lingua cervina officinarum. Baub. pin. 353. Comm. boll. 68. Plum. fil. 34. t. 4. f. 4.

Harts - tong. Belg.

In een oude Put in 't Weduwen - huis te Doesburg; en aan sommige oude Muuren in de Stad Utrecht, Zwol, en elders.

Pharm. LINGUE CERVINE herb.

851. As-

851. *ASPLENIUM* frondibus pinnatis: pinnis sub-*Trichomanes*
rotundis crenatis. *Sp.* 1540. *n.* 19. *Gelr.* 645.

Trichomanes sive *Polytrichum officinarum*. *Baub.*
pin. 356. *Comm. boll.* 111. *Plum. fil.* 26. *t.* V.
f. 1.

Trichomanes. *Fuchsf. hist.* 796. *Cam. epit.* 925.

Dod. pempt. 471.

Oed. dan. t. 119.

Wederdood, Steenbreek. Belg.

Aan de Noord-zyde van de Groote Kerk te Harder-
wyk; aan de muur om 't Huis te Zwanenburg;
aan de Kerk en Pastory-muur te Zoelen in de
Betuwe; te Boven-Karspel en te Barsingerhorn
in Noord-Holland; en aan de muur van de oude
Brug van 't Huis Ypensteyn by Alkmaar.

Pharm. POLYTRICHI s. TRICHOMANIS herb.

852. *ASPLENIUM* frondibus alternatim decomposi-*Ruta muraria*
tis: foliolis cuneiformibus crenulatis. *Sp.* 1541. *n.* 22. *Gelr.* 567. *Fris.* 426.

Ruta muraria. *Baub. pin.* 355. *Dod. pempt.* 470.
Comm. boll. 100.

Oed. dan. t. 190.

Steen-Ruite, Muur-Ruite, Venus-Hayr. Belg.

Aan oude Muuren op veele plaatsen.

Pharm. ADICANHI ALBI s. RUTEMURARIAE
herb.

P O L Y P O D I U M.

853. *POLYPODIUM* frondibus pinnatifidis: pinnis *vulgare.*
oblongis subserratis obtusis, radice squamata.
Sp. 1544. *n.* 13. *Gelr.* 568. *Fris.* 427.

Polypodium vulgare. *Baub. pin.* 359. *Comm. boll.*
91. Plum. fil. 27. *t.* A. *f.* 2.

Polypodium majus. *Dod. pempt.* 464.

Boom-Varen, Engelzoet. Belg.

β. *Polypodium minus.* *Baub. pin.* 359. *Dod. pempt.*
464. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 24.

Op veele plaatsen aan Wallen, Wegen, en in de
Boschen, op oude Wilge-boomen, en aan de wor-
tels van de Eike-boomen.

Pharm. POLYPODII rad. herb.

Dum florere incipit, primum se flores produnt in fo-
liolis superioribus.

aristatum. 854. *POLYPODIUM* frondibus subbipinnatis: foliis ovato-oblongis; pinnis obtusiusculis apice acute ferratis. *Sp.* 1551. *n.* 42. *Fris.* 428.

Filix non ramosa major pinnulis latiusculis longioribus in profundos denticulos divisis. *Morif. bist.* 3. *p.* 579. *f.* 14. *t.* 3. *f.* 11.

Omtrent Oude-Berkoop in een Bosch niet verre van de Ry-weg. (MEESE.)

Filix mas. 855. *POLYPODIUM* frondibus bipinnatis: pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. *Sp.* 1551. *n.* 43. *Gelr.* 569. *Fris.* 429.

Filix non ramosa dentata. *Baub. pin.* 358. *Comm. boll.* 38.

Filix mas. *Dod. pempt.* 462.

Varen Manneke, Bosch-Varen. Belg.

In de Bosschen, en op andere donkere vochtige plaatsen.

Pharm. *FILICIS rad. herb.*

F. femina. 856. *POLYPODIUM* frondibus bipinnatis: pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Sp.* 1551. *n.* 44. *Fris.* 430.

Filix mas non ramosa, pinnulis angustis rarioribus profunde dentatis. *Morif. bist.* 3. *p.* 579. *f.* 14. *t.* 3. *f.* 8.

Filicula petræa fæmina 1. *Tabern. ic.* 793.

In de Bosschen van Zandhorst, en elders op schaduchtige plaatsen; op Leeuwenberg in 't Sticht van Utrecht tusschen de steenen der Pedistallen; ook by de voorige, dog zeldzaamer.

P I L U L A R I A.

globulifera. 857. *PILULARIA.* *Sp.* 1563. *n.* 1. *Fris.* 431.

Pilularia palustris juncifolia. *Vaill. par.* 459. *t.* 15. *f.* 6. *Dill. musc.* 538. *t.* 79. *f.* 1. *Fuss. act.* 1739. *p.* 240. *t.* 11.

Graminifolia palustris repens, vasculis granorum piperis æmulis. *Morif. bist.* 3. *p.* 608. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 49.

Oed. dan. t. 223.

In Friesland ten Oosten Kuik-horne en Bergum aan een Water-poel.

M U S C I.

L Y C O P O D I U M.

858. *LYCOPODIUM* foliis sparsis filamentosis, spicis *clavatum*.
teretibus pedunculatis geminis. *Sp.* 1564. *n.* 4.

Gelr. 578. *Fris.* 432.

Lycopodium vulgare pilosum anfrachiosum & repens. *Dill. musc.* 441. *t.* 58. *f.* 1.

Muscus terrestris clavatus. *Baub. pin.* 360. *Comm. boll.* 77.

Oed. dan. t. 126.

Wolfs - Klaauw. Belg.

Op de Heide by Uilenpas, Harderwyk, Veldwyk, Lovenich, aan den Tryfel-berg, in 't Sourse-Bosch, &c. in Gelderland; by Naarden en Velsen in Holland; by Amersfoort en Doorn in 't Sticht van Utrecht; te Bergum, Dragten, &c. in Friesland.

Pharm. LYCOPODII sem. (pollen.)

In Russia, vernali præsertim tempore, sæpe observatur pluvia sulphurea dicta, quæ est pluvia, cui permistus est pollen hujus Lycopodii, in spicis præcedentis autumnii residuus, & vere per ventium dispersus.

859. *LYCOPODIUM* foliis sparsis integerrimis, spicis *inundatum*.
terminalibus foliosis. *Sp.* 1565. *n.* 8. *Gelr.*

654. *Fris.* 433.

Lycopodium palustre repens, clava singulari. *Vaill. par.* 123. *t.* 16. *f.* 11. *Dill. musc.* 452. *t.* 62. *f.* 7.

Op 't Ermeller-Veld buiten Harderwyk op vochtigtige plaatsen; in Friesland by 't voorige.

860. *LYCOPODIUM* foliis sparsis octofariis, caule *Selago*.
dichotomo erecto fastigiato, floribus sparsis.

Sp. 1565. *n.* 9. *Ingr.* 166. *Fris.* 434.

Selago vulgaris abietis rubræ facie. *Dill. musc.* 435. *t.* 56. *f.* 1.

Muscus erectus ramosus saturate viridis. *Baub. pin.* 360.

Oed. dan. t. 104.

In Friesland op verscheide plaatsen in de Wouden op Hei-velden.

alpinum. 861. *LYCOPodium* foliis quadifariam imbricatis acutis, caulibus, erectis bifidis, spicis sessilibus teretibus. *Sp. 1567. n. 15. Gelr. 655.*

Lycopodium fabinae facie. *Dill. musc. t. 58. f. 2. (non synonyma.)*

Muscus clavatus, foliis cupressi. *Raj. hist. 121.*

Oed. dan. t. 79.

Hexen-krans. Zutphaniensibus.

Op Kappenbulte tusschen Zelhem en Halm in 't Graaffschap Zutphen, en op de Heide te Deelen en omtrent Lovenich op de Veluwe.

S P H A G N U M.

palustre. 862. *SPHAGNUM* ramis deflexis. *Sp. 1569. n. 1. Gelr. 577. Fris. 435.*

Sphagnum palustre molle deflexum, squamis cymbiformibus. *Dill. musc. 240. t. 32. f. 1.*

Muscus vulgatissimus. *Baub. pin. 360. Comm. boll. 76.*

Oed. dan. t. 474.

β. *Sphagnum* palustre molle deflexum, squamis capillaceis. *Dill. musc. 243. t. 32. f. 2.*

Op vochtige Hei-gronden in Water-kuilen buiten Harderwyk, Utrecht, Zwol, in de Wouden in Friesland, en elders.

Muscus terrestris & hortensis. I. B. quem COM-MELINUS *huc refert, est Hypnum sericeum.*

P H A S C U M.

acaulon. 863. *PHASCUM* acaule, antheria sessili, foliis ovatis acutis. *Sp. 1570. n. 1. Fris. 436.*

Phascum acaulon bulbiforme minus. *Dill. musc. 251. t. 32. f. 12.*

Muscus trichodes acaulos minor latifolius. *Vaill. par. 128. t. 27. f. 2.*

Oed. dan. t. 249. f. 3.

Aan de Graften om 't Huis Staverden op de Veluwe; op de Bergummer-Heide, en aan de kanten

ten van vochtige gruppels by Hitzum en Schalfum
in Friesland.

F O N T I N A L I S.

864. FONTINALIS foliis complicato-carinatis tri-antipyretica
fariis acutis, antheris lateralibus. Sp. 1571.

n. 1. Fris. 437.

Fontinalis triangularis major complicata, e folio-
rum alis capsulifera. Dill. musc. 254. t. 33. f. 1.

Muscus aquaticus, folio expanso. Baub. prodr.
152. n. 14.

In donkere Bosschen, en in Slooten en natte Gruppels
onder de Boomen, op veele plaatsen in de Wouden
in Friesland.

865. FONTINALIS foliis imbricatis subulato-lance-squamosa-
olatis, antheris lateralibus. Sp. 1571. n. 3. Fris.

438.

Fontinalis squamosa tenuis sericea atro-virens.

Dill. musc. 259. t. 33. f. 3.

Fontinalis minor lucens. Baub. bist. 3. p. 778.

Te Franeker gevonden in een Regenbak.

- 866 FONTINALIS foliis lineari-setaceis. Linn. suec. capillacea.
2. 962. Fris. 439.

Fontinalis capillacea, calycibus stili instar cuspi-
datis. Dill. musc. 260. t. 23. f. 5.

In natte laagten tusschen Franeker en Harlingen op
verscheide plaatsen.

P O L Y T R I C H U M.

867. POLYTRICHUM caule simplici, anthera pa-
rallelopipeda. Sp. 1573. n. 1. Gelr. 570. Fris.

440.

Mas. & Femina.

- a. Polytrichum quadrangulare vulgare, yuccæ foliis
ferratis. Dill. musc. 420. t. 54. f. 1.

Polytrichum aureum majus. Baub. ptn. 356.

Adiantum aureum. Tabern. ic. 797.

Geel of goud Vrouwen - Hayr, Gulden - Hayr,
Gulde Wederdood. Belg.

- β. Polytrichum quadrangulare, juniperi foliis brevi-
oribus & rigidioribus. Dill. musc. 424. t. 54. f. 2.

Po-

- Polytrichum aureum medium. Baub. pin. 356. Camm. holl. 91.*
Muscus coronatus humilis rigidior, capitulis longis acutis sessilibus erectis. Moris. hist. 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 8. Boerb. lugdb. 1. p. 21. n. 31.
Muscus coronatus medius, pileolo villosulo tenuiore. Moris. hist. 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 6. Boerb. lugdb. 1. p. 21. n. 30.
Muscus coronatus humilis tenuifolius, pileolo minore acutiore ruberrimo. Boerb. lugdb. 1. p. 21. n. 33.
Muscus capillaris, floribus in apice coccineis expansis. Boerb. lugdb. 1. p. 21. n. 35. Buxb. cent. 1. p. 41. t. 62. f. 2.
 γ. *Polytrichum quadrangulare minus, juniperi foliis pilosis. Dill. musc. 426. t. 54. f. 3.*
Overvloedig op vochtige Hey-gronden en Moschab-tige plaatsen.
 Pharm. ADIANTHI AUREI herb.
Diversitas sexus, ætatis & soli fecit, ut una hæc eademque species pro tot diversis Muscis habita fuerit.

M N I U M.

- androgynum. 868. *MNIUM* caule ramoso, androgynum. *Sp. 1574. n. 4.*
Mnium perangustis & brevibus foliis. Dill. musc. 230. t. 31. f. 1.
Muscus coronatus humilis minimus, foliolis, pediculis & capitulis minimis erectis. Moris. hist. 3. p. 631. f. 15. t. 7. f. 20.
Oed. dan. t. 299.
In de Duinen en in den Hout te Haarlem. (MEERBURGH.)
- hygrometricum. 869. *MNIUM* acaule, anthera nutante, calyptra reflexa tetragona. *Sp. 1574. n. 5. Fris. 441.*
Bryum bulbiferum aureum, calyptra quadrangulati, capsulis pyriformibus nutantibus. Dill. musc. 407. t. 52. f. 75.
Muscus coronatus minor, foliolis latiusculis ad caulem convolutis, capitulis cernuis & obtusis aureis. Moris. hist. 3. p. 631. f. 15. t. 7. f. 17.
Boerb. lugdb. 1. p. 21. n. 37.

Mus.

Muscus aureus capillaris minor. *Herm. lugdb.* 432.

Boerb. lugdb. 1. p. 22. n. 41.

Polytrichum aureum minus. *Baub. pin.* 357. *Comm. boll.* 91.

Op oude vochtige muuren en steenachtige dorre plaatsen onder 't geboomte; ook in de Duinen by 's Hage omtrent Backershagen.

870. *MNIUM* caule dichotomo: axillis pedunculiferis, anthera erecta, foliis carinatis. *Sp.* 1575. n. 6. *purpureum*

Bryum tenue stellatum, setis purpureis. *Dill. musc.* 386. t. 49. f. 51.

Muscus trichodes parvus, foliis musci vulgaris, capitulis longis acutis. *Morif. list.* 3. p. 628. f. 17. t. 6. f. 4. 16.

Aan oude paalen en boomen by 't Huis Endelgeer. (MEERBURGH.)

871. *MNIUM* antheris erectis, operculis filiformibus *setaceum.* longitudine antherarum. *Sp.* 1575. n. 7.

Bryum stellare nitidum pallidum, capsulis tenuissimis. *Dill. musc.* 381. t. 48. f. 44.

Op de Hooybergen en eenige Wilge-boomen by Noordwyk. (MEERBURGH.)

872. *MNIUM* antheris pendulis, pedunculo curvato, *hornum.* surculo simplici, foliolis margine scabris. *Sp.* 1576. n. 10. *Fris.* 443.

Bryum stellare hornum sylvarum, capsulis magnis nutantibus. *Dill. musc.* 402. t. 51. f. 71.

β. *Muscus polytrichodes humilior*, foliis brevioribus raris, pallide viridantibus & vix pellucidis. *Morif. list.* 3. p. 630. f. 15. t. 6. f. 3. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 16.

In 't Haagsche en andere Bosschen op de wortels der Eiken.

873. *MNIUM* antheris pendulis, foliis ovatis setiferis carinatis, pedunculis longissimis. *Syst. edit.* 13. p. 796. n. 19. *capillare*

Bryum capillare. *Sp.* 1586. n. 30. *fl. belg.* 861.

Bryum foliis latiusculis congestis, capsulis longis nutantibus. *Dill. musc.* 398. t. 59. f. 67.

Polytrichum aureum minimum, capitulo oblongo,

go, subflavi coloris. *Comm. boll.* 91.

Muscus aureus capillaris minimus, capitulo longo subflavo. *Herm. lugdb.* 432. *Boerb. lugdb.* 1. p. 21. n. 38.

Op zandige gronden by Harderwyk, Haarlem, en elders.

crudum. 874. *MNIUM* antheris pendulis, calyptra recurvata, foliis pellucidis. *Sp.* 1576. n. 11. *Fris.* 443.

Bryum pendulum hornum molle, foliis & lanceolatis & gramineis. *Dill. musc.* 401. t. 51. f. 70.

Veel in de Boffchen en aan kanten van gruppels; te Leiden op de Stads-muuren.

serpyllifolium. 875. *MNIUM* pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis. *Sp.* 1577. n. 14. *Fris.* 444.

punctatum. α. *Mnium* pedunculis aggregatis, foliis obovatis intergerrimis obtusis punctatis.

Bryum pendulum, serpilli folio rotundiore pellucido, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 416. t. 53. f. 81.

Muscus polytrichoides palustris, major serpilli latioris folio pellucido. *Morif. bist.* 3. p. 627. f. 15. t. 6. f. 39. 40.

cuspidatum. β. *Mnium* pedunculis aggregatis, foliis alternis acutis ferratis.

Bryum pendulum, foliis variis pellucidis, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 413. t. 53. f. 79.

Muscus palustris, foliis subrotundis. *Vaill. par.* t. 26. f. 18.

proliferum. γ. *Mnium* pedunculis aggregatis, foliis rosaceo-congestis lanceolatis acutis. *Gelr.* 646.

Bryum stellare roseum majus, capsulis ovatis pendulis. *Dill. musc.* 411. t. 52. f. 77.

Muscus stellaris roseus. *Baub. pin.* 361. *prodr.* 151.

undulatum. δ. *Mnium* pedunculis aggregatis, foliis oblongis undulatis.

Bryum dendroides polycephalon, phyllitidis folio undulato pellucido, capsulis ovatis pendulis. *Dill. musc.* 410. t. 52. f. 76.

Muscus ad polytrichodem accedens ramosus, foliis longis lucidis & veluti crispis. *Morif. bist.* 3. p. 630. f. 15. t. 6. f. 1. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 14.

Mus-

Muscus terrestris ramosus, foliolis latioribus & longioribus crispis, capitulis cylindricis nutantibus, major & minor. *Boerb. lugdb. 1. p. 21. n. 36.*

- α. *Te Catwyk aan't eind van 't Malle-gat tusschen het gras. β. Aldaar, en veel in 't Haagsche-Bosch. γ. Te Heemse in Overysfel. δ. Omtrent Hitzum, en op verscheide plaatsen in de Wouden in Friesland.*

876 *MNIUM* foliis distichis bifidis. *Sp. 1579. n. 17. affum.*

Mnium trichomanis facie, foliolis bifidis. Dill. musc. 237. t. 31. f. 6.

Jungermaunia terrestris repens, foliolis ex rotunditate acuminatis bifidis, apertura pene visibili. Mich. gen. 8. t. 5. f. 14.

In den Haarlemmer-hout en 't Haagsche-Bosch. (MEERBURGH.)

877. *MNIUM* foliis distichis, pinnis subtus auricula-*Jungermaunia.*
tis. *Sp. 1579. n. 18.*

Lichenastrum alpinum purpureum, foliis auritis & cochleariformibus. Dill. musc. 479. t. 69. f. 1.

Jungermaunia alpina palustris purpurea cambrica, foliis rotundioribus auritis tenuissime denticulatis. Mich. gen. 6. t. 5. f. 16.

Te Leiden op de Stads-muuren. (MEERBURGH.)

B R Y U M.

878. *BRYUM* antheris sessilibus terminalibus, calyptra *apocarpum,*
minima. *Sp. 1579. n. 1. Fris. 445.*

Sphagnum subhirsutum obscure virens, capsulis rubellis. Dill. musc. 245. t. 32. f. 4.

Muscus apocarpus hirsutus saxis adnascens, capsulis obscure rubris. Vaill. par. 129. t. 21. f. 15.

Oed. dan. t. 480.

Op Muuren en oude Boomen.

879. *BRYUM* antheris sessilibus sparsis, calyptris *striatum,*
striatis sursumve pilosis. *Sp. 1579. n. 2. Fris. 446.*

Polytrichum bryi ruralis facie, capsulis sessilibus, majus. Dill. musc. 430. t. 55. f. 8.

Musc.

Muscus apocarpus arboreus ramosus. Vaill. par.
129. t. 25. f. 5. 6.
Op veele plaatsen aan de Boomen.

pomiforme. 880. *BRYUM* antheris erectis sphaericis. *Sp.* 1580. n. 3.
Bryum capillaceum, capsulis sphaericis. *Dill. musc.*
339. t. 44. f. 6.
Muscus trichodes minimus fericeus capillaceus,
capitulis sphaericis. Moris. hist. 3. p. 628. f. 15.
t. 6. f. 6. Vaill. par. 129. t. 24. f. 9. 12.
In 't Haagfche-Bosch in eenige groepen. (MEER-
BURGH.)

pyriforme. 881 *BRYUM* antheris erectis obovatis, calyptra subu-
lata, furculis acaulibus, foliis ovatis muticis.
Sp. 1580. n. 4. *Fris.* 447.
Bryum serpillifolium pellucidum, capsulis pyri-
formibus. *Dill. musc.* 345. t. 44. f. 6.
Muscus capillaceus minimus capitulis pyriformi-
bus turgidis. Vaill. par. 129. t. 29. f. 3.
Aan fchaduwachtige wallen, in fchraale Weiden, en
in de Duinen by 's Gravenhage.

extinctori-
um. 882. *BRYUM* anthera erecta oblonga minori, caly-
ptris laxis æqualibus. *Sp.* 1581. n. 5.
Bryum calyptra extinctorii forma minus. *Dill.*
musc. 349. t. 45. f. 8.
Muscus coronatus humilis tenuifolius, pileolo
magno acuto infra aperto extinctorium refe-
rente. Moris. hist. 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 12.
Boerb. lugdb. 1. p. 21. n. 32.
In den Enck by Harderwyk.

subulatum. 883. *BRYUM* antheris erectis subulatis; furculis acau-
libus. *Sp.* 1581. n. 6. *Gelr.* 647. *Fris.* 448.
Bryum capsulis longis subulatis. *Dill. musc.* 350.
t. 45. f. 10.
Muscus terrestris capillaris, capsula longa. Comm.
boll. 77.
Muscus subtilissimus omnium, ramosus terrestris,
capitulis falcatis, minimus. Boerb. lugdb. 1. p.
22. n. 42.
Op vochtige Zand-gronden, en onder aan sommige
stammen van Boomen.
Dillenius musc. 328. Muscum Boerhaavii refert ad
suum

juum Hypnum sericeum ramosius & tenuius,
capsulis acuminatis.

384. BRYUM antheris erectiusculis, foliis piliferis re- rurale.
curvis. *Sp.* 1581. *n.* 7. *Gehr.* 571. *Fris.* 449.

Bryum rurale unguiculatum hirsutum elatius & ra-
mosius. *Dill. musc.* 352. *t.* 45. *f.* 12.

Muscus erectus hirsutus, capitulis oblongis acutis,
unguiculis avicularum similibus, vulgarissimus.

Morif. hist. 3. *p.* 628. *f.* 15. *t.* 6. *f.* 1.

Polytrichon apuleji minus quorundam. *Eaub. hist.*
3. *p.* 762. (*quo ad descriptionem.*)

*Op de daken van Boere-woningen en oude Muuren,
en tusschen de steenen der Straaten; ook in de Dui-
nen by Haarlem.*

385. BRYUM antheris erectis, foliis piliferis recti- rurale.
usculis, furculis simplicibus caespitosis. *Sp.* 1581.
n. 8. *Fris.* 450.

Bryum tegulare humile pilosum & incanum. *Dill.*
musc. 355. *t.* 45. *f.* 14.

By de voorgaande.

386. BRYUM antheris erectiusculis, pedunculis ag- scoparium.
gregatis, foliis secundis recurvatis, caule de-
clinato. *Sp.* 1582. *n.* 9. *Fris.* 451.

Bryum reclinatum, foliis falcatis, scoparum effi-
gie. *Dill. musc.* 357. *t.* 46. *f.* 16.

Muscus coronatus medius, foliis tenuissimis palli-
dis longioribus, capitulis erectis acutis. *Morif.*
hist. 3. *p.* 630. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 11. *Boerb. lugdb.*

1. *p.* 21. *n.* 34.

*In de Bosschen op de wortels van verrotte Boomen,
en op Hei-velden.*

387. BRYUM antheris erectiusculis, pedunculis sub- undulatum
solitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis
patentibus serratis. *Sp.* 1582. *n.* 10.

Bryum phyllitidis folio rugoso acuto, capsulis
incurvis. *Dill. musc.* 360. *t.* 46. *f.* 18.

Muscus saxatilis viridissimus, foliolis longioribus
crispis. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 47.

Oed. dan. t. 477.

*In 't Haagsche-Bosch op vochtige plaatsen, en op
wortels van Boomen.*

T

388. BRY-

- glaucum.* 888. *BRYUM* antheris erectiusculis: operculo arcuato, foliis erectis imbricatis, furculis ramosis. *Sp.* 1582. n. 11.
Bryum albidum & *glaucum* fragile majus, foliis erectis, setis brevibus. *Dill. musc.* 362. t. 46. f. 20.
Muscus capillaceus albus montanus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 21. n. 28.
Muscus trichoides montanus albidus fragilis. *Morif. hist.* 3 p. 630. f. 15. t. 6. f. 22. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 8.
Op de Heide by Harderwyk en elders.
- pellucidum.* 889. *BRYUM* antheris erectiusculis, foliis recurvis acutis, caule hirsuto. *Sp.* 1583. n. 12.
Bryum palustre pellucidum, capsulis & foliis brevibus recurvis. *Dill. musc.* 364. t. 46. f. 23.
Muscus polytrichodes elatior, foliis angustis pellucidis & fere membranaceis. *Pluk. phyt.* t. 44. f. 7. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 15.
In de Moerassen.
- flexuosum.* 890. *BRYUM* antheris erectis, foliis setaceis, pedunculis flexuosis. *Sp.* 1583. n. 15. *Fris.* 442.
Bryum pilosum molle, setis intortis. *Dill. musc.* 373. t. 47. f. 33.
Omtrent het Heerenveen, en elders in de Wouden, op Hei-velden aan Dykjes en Wegen.
- heteromallum.* 891. *BRYUM* antheris erectis, foliis setaceis secundis. *Sp.* 1583. n. 16. *Gelr.* 648. *Fris.* 453.
Bryum heteromallum. *Dill. musc.* 375. t. 47. f. 37.
Muscus capillaceus, foliis unam partem spectantibus. *Vaill. par.* 132. t. 27. f. 7.
Muscus terrestris non ramosus, filii araneæ tenuitate, capitulis falcatis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 22. n. 43.
Oed. dan. t. 479.
Veel op de Heide, ook onder de Heggen, en ook wel op de stammen en takken van Boomen.
- truncatum.* 892. *BRYUM* antheris erectis subrotundis: operculo mucronato. *Sp.* 1584. n. 18. *Fris.* 454.
Bryum exiguum, creberrimis capsulis rufis. *Dill. musc.* 347. t. 45. f. 7.

Muscus coronatus minimus, foliolis & capitulis oblongis in pediculis brevissimis. *Morif. hist.* 3. p. 631. f. 15. t. 7. f. 18. *Boerb. lugdb.* 1. p. 52. n. 41.

In schraale Landen en aan kanten van Gruppels &c. op veele plaatsen.

893. *BRYUM* antheris erectis ovatis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-patulis. *Sp.* 1584. n. 19. *Gelr.* 649.

Bryum capillaceum breve, pallide & late virens, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 380. t. 48. f. 43.

Muscus capillaceus omnium minimus, foliolis longioribus & angustioribus. *Vaill. par.* 130. t. 29. f. 5.

In de Koorn-landen in Hierden buiten Harderwyk.

894 *BRYUM* antheris erectis, furculo rectiusculo, *hypnoides*. ramis lateralibus brevibus fertilibus. *Sp.* 1584. n. 21. *Fris.* 455.

Bryum hypnoides polycephalon lanuginosum montanum. *Dill. musc.* 372. t. 47. f. 32.

Muscus terrestri vulgari similis lanuginosus. *Morif. hist.* 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 7. *Raj. syn.* 37. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 17.

Oed. dan. t. 476.

§. *Bryum hypnoides*, hirsutie canescens, vulgare. *Dill. musc.* 368. t. 47. f. 27.

Muscus terrestris tenuioribus foliis, cespitosus, varius. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 18.

Op donkere vochtige schaduwachtige plaatsen op de grond, steenen, onder aan de stammen der Broomen, ook op de Hei-velden, en aan Dykjes.

895 *BRYUM* antheris pendulis, furculis cylindricis *argenteum*. imbricatis lævibus. *Sp.* 1586. n. 27. *Gelr.* 650.

Bryum pendulum julaceum argenteum & sericeum. *Dill. musc.* 392. t. 50. f. 62.

Muscus minimus e viridi argenteus, capitulis oblongis cernuis. *Morif. hist.* 3. p. 627. f. 15. t. 6. f. 17. *Boerb. lugdb.* 1. p. 22. n. 49.

Muscus saxatilis sericoides. *Comm. holl.* 77.

§. *Bryum pendulum, furculis teretibus viridibus.* *Dill. musc.* 394. t. 50. f. 63.

Zy-achtig Steen-Mosch. Belg.

Op vochtige steenen en daken der huizen. β . in ten-
ge boven op de steenen.

pulvinatum 895. BRYUM antheris subrotundis, pedunculis re-
flexis, foliis piliferis. *Sp.* 1586. n. 28. *Gelr.*
573.

Bryum orbiculare pulvinatum hirsutie canescens,
capsulis immersis. *Dill. musc.* 359. t. 50. f. 65.

Muscus capillaceus lanuginosus minimus. *Vaill.*
par. 133. t. 29. f. 2. *Eoerb. lugdb.* 1. p. 22. n. 48.

Muscus aureus capillaris minimus, capitulo oblon-
go-rotundo subviridi. *Herm. lugdb.* 432. *Eoerb.*
lugdb. 1. p. 21. n. 39.

Polytichum aereum minimum capitulatum, ob-
longo-rotundum, colore subviridi. *Comm.*
holl. 91.

Op vochtige zand-gronden en oude muuren, en op
allerhande oude daken aan de Noordzyde.

cæspitici- 897. BRYUM antheris pendulis, foliis lanceolatis
um. acuminato-fetaceis, pedunculis longissimis. *Sp.*
1586. n. 29. *Gelr.* 572. *Fris.* 456.

Bryum pendulum ovatum cæspitici- & pilosum,
feta bicolori. *Dill. musc.* 396. t. 50. f. 66.

Muscus capillaceus minimus, capitulo nutante,
pediculo purpureo. *Vaill. par.* 134. t. 29. f. 7.

Op oude Muuren en allerhande Daken, en vochtige
Hei-gronden.

898. BRYUM parvum furculis & fetis geminatis. *Dill.*
musc. 385. t. 49. f. 50.

Op sommige Muuren te Voorschooten. (MEERBURGH.)

H Y P N U M.

taxifolium. 899. HYPNUM fronde simplicissima pinnata lanceo-
lata basi pedunculifera. *Sp.* 1587. n. 2. *Fris.*
457.

Hypnum taxiforme minus: basi capsulifera. *Dill.*
musc. 263. t. 34. f. 2.

Muscus pennatus, capitulis adianti. *Vaill. par.*
136. t. 24. f. 11.

Oed. dan. t. 473. f. 2.

Op veele plaatsen tusschen het Gras, en op andere
vochtige plaatsen.

900. HYPNUM fronde pinnata simplici: pinnis dupli ^{denticula-}
 catis basi pedunculifera. *Sp.* 1588. n. 3. *Frij.* 258. ^{lum.}
 Hypnum denticulatum pennatum, pinnatis du-
 plicato-recurvis. *Dill. musc.* 266. t. 34. f. 5.
 Muscus filicinus minor, capitulis longis gracili-
 bus acutis. *Loerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 21.
By de voorgaande.
901. HYPNUM fronde simplicissima pinnata lanceola- ^{bryoides.}
 ta apice pedunculifera. *Sp.* 1588. n. 4.
 Hypnum taxiforme exiguum versus summitem
 capsuliferum. *Dill. musc.* 262. t. 34. f. 1.
 Muscus polytrichoides exiguis capitalis in femmis
 furculis f. foliis subrotundis erectis. *Vaill. par.*
 163. t. 24. f. 13. *Morif. hist.* 3. p. 629. f. 15.
 t. 6. f. 11.
Oed. dan. t. 473. f. 1.
In bet Haagſche-Bosch in vochtige groepen.
 (MEERBURGH.)
902. HYPNUM fronde pinnata ramosa erecta medio ^{adiantoides.}
 pedunculifera *Sp.* 1588. n. 6.
 Hypnum taxiforme palustre ramosum majus et
 erectum. *Dill. musc.* 264. t. 34. f. 3.
 Muscus taxiformis ramosus. *Vaill. par.* 136. t.
 28. f. 5.
In bet Haagſche-Bosch op de wortels der Boomen.
 (MEERBURGH.)
903. HYPNUM fronde pinnata ramosa: foliolis im- ^{complan-}
 bricatis acutis complicatis compressis. *Sp.* 1588. ^{lum.}
 n. 7.
 Hypnum pennatum compressum & splendens,
 capsulis ovatis. *Dill. musc.* 268. t. 34. f. 7.
 Muscus trichomanoides filicifolius splendens.
Vaill. par. 139. t. 23. f. 4.
In de Duinen by Hillegom en Noordwyk. (MEER-
 BURGH.)
904. HYPNUM furculis ramosis, frondibus subpinna- ^{crispum.}
 tis. foliolis undulatis planis. *Sp.* 1589. n. 11.
 Hypnum pennatum undulatum crispum, setis &
 capsulis brevibus. *Dill. musc.* 273. t. 36. f.
 12. B.

Muscus squamosus linariæ folio minor, crispus, capitulis recurvis. *Tourn. inst.* 554. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 13.
† *Volgens BOERHAAVE.*

triquetrum 905. HYPNUM ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis. *Sp.* 1589. n. 12. *Fris.* 459. Hypnum vulgare triangulum maximum & pallidum. *Dill. musc.* 293. t. 8. f. 28. Muscus ramosus major spermatophorus. *Vaill. par.* 137. t. 29. f. 9.
Op veele plaatsen in de Wei-landen en ruige Hoven tusschen het Gras.

acabulum 906. HYPNUM ramis vagis subrepentibus, foliolis mucronatis imbricatis. *Sp.* 1590. n. 13. *Fris.* 460. Hypnum dentatum vulgatissimum, operculis obtusis. *Dill. musc.* 295. t. 38. f. 29. Muscus squamosus ramosus crassior, capitulis incurvis. *Tourn. inst.* 553. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 5. Muscus denticulatus minor sericeus nostras, capitulis adianthi. *Morif. hist.* 3. p. 620. f. 15. t. 6. f. 35. *Boerb. lugdb.* 1. p. 22. n. 44.
By de voorige.

filicinum 907 HYPNUM furculis pennatis: ramulis distantibus, foliolis imbricatis incurvis secundis. *Sp.* 1590. n. 14. Hypnum repens filicinum crispum. *Dill. musc.* 282. t. 26. f. 19. Muscus repens ramosus pennatus, subtilissime divisus, foliolis crispis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 21. n. 25.
In vochtige Wei-landen, op veele plaatsen.

proliferum 908. HYPNUM furculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Sp.* 1590. n. 15. *Gelr.* 575. Hypnum filicinum, tamarisci foliis minoribus non splendentibus. *Dill. musc.* 276. t. 35. f. 14. Muscus filicinus major. *Baub. pin.* 360. *Morif. hist.* 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 20. *Tourn. inst.*

356. t. 326. f. C. Vaill. par. 140. t. 25. f. 1.
Boerb. lugdb. 1. p. 20. n. 22.

Veel in de Boffchen, en in de Salker-waart.

Muscus filicibus minor. Baub. prodr. 151. Boerb.
15. Boerb. lugdb. 1. p. 21. n. 23. quifnam fit,
dubia res est.

909. HYPNUM furculis plano-pinnatis continuatis, *parietinum*.
pedunculis aggregatis. Sp. 1590. n. 17. Gelr.
576.

Hypnum filicinum, tamarifci foliis naonibus
splendentibus. Dill. musc. 274. t. 35. f. 13.

Muscus vulgaris pennatus major. Baub. pin. 360.
Vaill. par. t. 28. f. 1.

In de Boffchadie van 't Huis Staverden op de Ve-
luwe.

910. HYPNUM furculis subbipinnatis decumbentibus: *p. elongum*.
ramulis remotis, foliolis ovatis, antheris cer-
nuis. Sp. 1591. n. 18. Fris. 461. Jngr. 171.

Hypnum repens filicinum, triangulans parvis
foliis, prælongum. Dill. musc. 278. t. 35. f. 15.

Muscus repens ramosus pennatus, subtilissimâ
divisurâ. Boerb. lugdb. 1. p. 2. n. 26.

In veel Boffchen, onder oude Heggen, en op oud
hout.

911. HYPNUM furculis pinnatis: ramulis approxi- *Crista ca-*
matis: apicibus recurvis. Sp. 1591. n. 19. *strensis.*

Hypnum filicinum, cristam castrensem repræsen-
tans. Dill. musc. 284. t. 36. f. 20.

Muscus repens ramosus pennatus, subtilissime di-
visus, foliolis crispis reflexis. Boerb. lugdb. 1.
p. 21. n. 27.

† Volgens BOERHAAVE.

912. HYPNUM furculis pinnatis teretiusculis remotis *abietinum*.
inæqualibus. Sp. 1591. n. 20.

Hypnum lutescens, alis subulatis tenacibus. Dill.
musc. 280. t. 35. f. 17.

Muscus squamosus ericæ folio ramosissimus. Boerb.
lugdb. 1. p. 20. n. 11.

Muscus abietis facie. Baub. pin. 360. Baub. hist.
3. p. 765. Comm. boll. 77. Boerb. lugdb. 1 p.
22. n. 52.

Mofch met de gedaante van den Dennen-boom. Belg. Op 't Hooge veld by de Haarlemmer-hout.

Conjunxi hic duos muscos, quos Boerhaavius separavit, quum Muscum abietis facie C. B. ad aliam speciem referre nesciam, atque ea, quæ in loco a Commelino adsignato crescit, hæc certe planta est.

*cupressifor
me.*

913. HYPNUM furculis subbipinnatis, foliis secundis recurvis apice subulatis. *Sp.* 1592. n. 22.

Hypnum crispum cupressiforme, foliis aduncis. *Dill. musc.* 287. t. 37. f. 23.

β. Muscus squamosus ramosus viridissimus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 7.

γ. Muscus capillaris humilis, confertissime nascens, capitulo cylindrico, operculo rostrato. *Boerb. lugdb.* 1. p. 22. n. 45.

In de Boffchen op de wortels der Boomen, en in de Duinen onder de Hippophae Rhamnoides, ontrent de plaats Backershagen.

Varietates α. & γ. Dillenius testatur sese ab ipso Boerhaavio habuisse.

zâuncum.

914. HYPNUM furculis erectiusculo - subramosis, foliis secundis recurvis subulatis, ramis recurvatis. *Sp.* 1592. n. 23.

Hypnum palustre erectum summitatibus aduncis. *Dill. musc.* 292. t. 37. f. 26.

In de Duinen by Noordwyk in eenige Boschjes. (MEERBURGH.)

viticulosum

915. HYPNUM furculis repentibus, ramis vagis teretibus, foliis patulis acuminatis. *Sp.* 1592. n. 25.

Hypnum subhirsutum, viticulis gracilibus erectis, capsulis teretibus. *Dill. musc.* 307. t. 39. f. 43.

Muscus montanus, flagellis longis tenuibus cupressinis, ut plurimum indivisis. *Morif. hist.* 3. p. 624. f. 15. t. 5. f. 7. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 20.

Muscus densis foliolis juniperinis in cespitem aggestis. *Baub. lugdb.* 1. p. 20. n. 9.

In de Duinen by Haarlem.

carrosum

916. HYPNUM ramis vagis, foliis lanceolatis complicato-carinatis quinquefariam recurvatis. *Sp.* 1593. n. 26.

Hyp-

Hypnum repens, triangularibus reflexis foliis, majus. *Dill. musc.* 303. t. 39. f. 38.

Muscus terrestris erectior, foliis reflexis. *Morif. bist.* 3. p. 624. f. 15. t. 5. f. 2. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 12.

β. *Hypnum repens*, triangularibus reflexis foliis, minus. *Dill. musc.* 304. t. 39. f. 39.

Muscus erectus, foliis reflexis. *Vaill. par.* 139. t. 27. f. 5.

Veel op vochtige gronden, en in de Duinen by 's Hage.

917. *HYPNUM* furculis repentibus, ramis confertis ^{palustr.} erectis, foliolis ovatis secundis, antheris erectiusculis. *Sp.* 1593. n. 27.

Hypnum heterophyllum aquaticum polycephalum repens. *Dill. musc.* 293. t. 37. f. 27.

In eenige Hoven op de Steenen. (MEERBURGH.)

918. *HYPNUM* furculis reptantibus, ramis vagis ere- ^{lorum.} ctis, foliis secundis, antheris subrotundis. *Sp.* 1593. n. 28. *Gelr.* 574. app. p. 254.

Hypnum loreum montanum, capsulis subrotundis. *Dill. musc.* 305. t. 39. f. 40.

Musco denticulato similis. *Baub. pin.* 360.

In de Salker-waart.

919. *HYPNUM* furculo erecto, ramis fasciculatis ^{dendroides.} terminalibus simpliciusculis, antheris erectis. *Sp.* 1593. n. 29. *Gelr.* 651.

Hypnum dendroides sericeum, fetis & capsulis longioribus erectis. *Dill. musc.* 313. t. 40. f. 48.

Muscus terrestris repens, veluti spicatus. *Morif. bist.* 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 21. *Boerb. lugdb.* 1. p. 21. n. 24.

In 't Bosch van Uilenpas.

920. *HYPNUM* furculo erecto, ramis fasciculatis ^{alopecurum} terminalibus subdivisis, antheris subnutantibus. *Sp.* 1594. n. 30.

Hypnum dendroides obscurius, fetis & capsulis brevioribus subnutantibus. *Dill. musc.* 315. t. 41. f. 49.

Muscus squamosus alopecuroides, flagellis recurvis. *Vaill. par.* 137. t. 23. f. 5.

*In 't Haagſche Boſch, en te Catwyk in de Dui-
nen. (MEERBURGH.)*

- furum.* 921. HYPNUM furculis pinnato-ſparſis ſubulatis, fo-
liis ovatis obtuſis conniventibus. *Sp.* 1594. n.
32. *Gelr.* 652. *Friſ.* 463.

Hypnum cupreſſiforme vulgare, foliis obtuſis.
Dill. muſc. 309. t. 40. f. 45.

Muſcus ſquamoſis cupreſſiformis. *Tourn. inſt.* 554.

Vaill. par. 138. t. 28. f. 3. *Boerb. lugdb.* 1. p.
20. n. 2.

Veel in natte en ruige Wei-landen en Hoven.

- fluitans.* 922. HYPNUM foliis lanceolatis alternis remoſis.
Linn. ſuec. 1034.

Hypnum erectum aut fluitans, foliis oblongis
perangultis acutis. *Dill. muſc.* 299. t. 38. f. 33.

*Aan verſcheide Beekjes te Waſſenaar. (MEER-
BURGH.)*

- caſpidatum* 923. HYPNUM furculis vagis: apice foliis convolu-
tis acuminato. *Sp.* 1595. n. 35.

Hypnum paluſtre extremitatibus caſpidatis & pun-
gentibus. *Dill. muſc.* 300. t. 39. f. 34.

*In de Duinen by 'sHage tuſſchen het lange gras.
(MEERBURGH.)*

- ſericeum.* 924. HYPNUM furculo repente, ramis confertis ere-
ctis, foliis ſubulatis, antheris erectis. *Sp.* 1595.
n. 36. *Gelr.* 653. *Friſ.* 464.

Hypnum vulgare ſericeum recurvum, capſulis
erectis caſpidatis. *Dill. muſc.* 323. t. 42. f. 59.

Muſcus terreſtris & horteniſis. *Baub. hiſt.* 3. p.
764.

Muſcus arboreus ſplendens ſericeus. *Vaill. par.*
132. t. 27. f. 3.

*Op veele plaatſen onder aan de ſtammen der Boomen,
op Steenen, in vochtige Wei-landen en Hoven.*

- velutinum.* 925. HYPNUM furculo repente, ramis confertis ere-
ctis, foliis ſubulatis, antheris ſubnutantibus.
Sp. 1595. n. 37. *Friſ.* 465.

Hypnum velutinum, capſulis ovatis cernuis. *Dill.
muſc.* 326. t. 42. f. 61.

Muscus terrestris vulgaris minor, adianthi aurei capitulis. Moris. list. 3. p. 625. Boerb. lugdb. 1. p. 20. n. 3.

Oed. dan. t. 475.

β *Muscus terrestris vulgaris, præcedenti minor, adianthi aurei capitulis. Boerb. lugdb. 1. p. 20. n. 4.*

Aan de wortels der Boomen op schaduwachtige plaatsen.

926. *HYPNUM furculis repentibus, ramis filiformibus, foliis oblitteratis. Sp. 1596. n. 38. Fris. 466.*

Hypnum trichodes serpens, setis & capsulis longis erectis. Dill. musc. 329. t. 42. f. 64.

Muscus terrestris omnium minimus, capitulis majusculis oblongis erectis. Moris. list. 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 14. 21. Vaill. par. 138. t. 28. f. 2. 6. 7. 8.

Muscus squamosus ramosus tenuior, capitulis erectis. Tourn. inst. 552. Boerb. lugdb. 1. p. 20. n. 6.

In verscheide Hoven op de Steenen.

927. *HYPNUM furculis ramosissimis: ramis subulatis utrinque attenuatis teretibus. Sp. 1596. n. 40. Fris. 467.*

Hypnum myosyroides tenuius, capsulis nutantibus. Dill. musc. 317. t. 41. f. 51.

Muscus trichodes humilis ramosus, capitulis oblongis tumidiusculis donatum. Moris. list. 3. p. 628. f. 15. t. 6. f. 3.

Onder aan de stammen der Boomen, ook op en tuschen de Steenen.

A L G Æ.

J U N G E R M A N N I A.

928. *JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis: foliolis pinnatis ovatis subciliatis. Sp. 1597. n. 1. Gelr. 050.*

Li-

Lichenastrum asplenii facie, pinnis laxioribus.
Dill. musc. 482. t. 69. f. 5.

Muscus trichomanis facie, foliis utrimque splendentibus rotundis. *Morif. hist.* 3. p. 627. f. 15. t. 6. f. 41.

Langs den Hierder - weg by Harderwyk.

complanata 929. *JUNGERMANNIA* furculis repentibus: foliolis inferne auriculatis duplicato - imbricatis, ramis æqualibus. *Sp.* 1599. n. 14. *Fris.* 468.

Jungermannia foliis circinatis imbricatim dispositis ex viridi flavescentibus. *Mich. gen.* 7. t. 5. f. 21.

Lichenastrum imbricatum majus, squamis compressis & planis. *Dill. musc.* 496. t. 72. f. 26.

Aan de stammen van veelerhande Boomen.

dilatata. 930. *JUNGERMANNIA* furculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato - imbricatis, ramis apice latioribus. *Sp.* 1600. n. 15. *Fris.* 469.

Lichenastrum imbricatum minus, squamis convexo concavis. *Dill. musc.* 447. t. 72. f. 27.

Hepaticoides, furculis & foliolis thuyæ instar compressis, minor. *Vaill. par.* 99. t. 19. f. 10.

By de voerige, dog menigvuldiger.

tamarisci. 931. *JUNGERMANNIA* foliis imbricatis serie duplici: superioribus subrotundis convexis obtusis quadruplo majoribus. *Sp.* 1600. n. 16.

Lichenastrum imbricatum, *tamarisci* *narbonensis* facie. *Dill. musc.* 269. t. 72. f. 31.

Hepaticoides, quæ *Muscus trichomanoides* terrestris minor floridus. *Vaill. par.* 100. t. 23. f. 10.

Muscoides squamosum faxatile nigro - purpureum, furculis angustioribus, foliis circinatis minoribus. *Mich. gen.* 10. t. 6. f. 5.

Op verscheide plaatsen aan de Beuke - Boomen.

ciliaris. 932. *JUNGERMANNIA* furculis repentibus, foliolis duplicato - imbricatis: inferne auriculatis ciliatis. *Sp.* 1601. n. 18.

Lichenastrum filicinum pulchrum villosum. *Dill. musc.* 503. t. 73. f. 35.

In den Haarlemmer - hout. (MEERBURGH.)

933. JUN-

933. JUNGERMANNIA furculis erectiusculis bifari-^{aria.}
am imbricatis, foliolis bipartitis. *Sp.* 1601. n.
19. *Frij.* 470.
Jungermannia repens, foliis cordatis carinatis.
Mich. gen. 8. t. 5. f. 9.
Lichenastrum foliis variis. *Dill. musc.* 505. t. 73.
f. 36.
In de 1 offchen en op de Heide; ook in sommige Ho-
ven on aer 't geboomte.
934. JUNGERMANNIA acaulis, foliolo frondi inna-^{2 phylla.}
to. *Sp.* 1602. n. 24. *Gelr.* 658.
Lichenastrum capitulis rotundis e foliorum medio
enascens. *Dill. musc.* 508. t. 74. f. 71.
Lichen petræus, cauliculo calceato. *Baub. pin.*
362. *Comm. boll.* 66.
Oed. dan. t. 359.
Op vochtige steenachtige plaatsen.
935. JUNGERMANNIA acaulis, fronde lineari ramo-^{furcata.}
sa: extremitatibus furcatis obtusiusculis. *Sp.*
1602. n. 27.
Lichenastrum tenuifolium furcatum, thecis glo-
bosis pilosis. *Dill. musc.* 512. t. 74. f. 45.
Heparica arborea globulifera. *Vaill. par.* 98. t.
23. f. 11.
In 't Haagfche - Bosch in eenige groepen. (MEER-
BURGH.)

T A R G I O N I A.

936. TARGIONIA. *Sp.* 1603. n. 1.
Targionia minima & vulgaris. *Mich. gen.* 3. t. 3.^{hypophylla.}
Lichen petræus minimus, fructu orobi. *Baub.*
pin. 362. *Comm. boll.* 68. *Dill. musc.* 532. t. 78. f. 9.
Op vochtige steenachtige plaatsen. (COMMELIN)
Habitat proprie in Italia, Hispania, & circa Con-
stantinopolin, sed in Belgio nascens mihi nondum
visa. Suspicoſe COMMELINUM Jungermannia
speciem pro ea habuisse, cum iisdem cum Junger-
mannia epiphylla 934. locis crescere dicat.

M A R C H A N T I A.

937. MARCHANTIA, calyce communi decemfido.^{polymorpha}
Sp.

Sp. 1603. *n.* 1. *Gelr.* 579. *Fris.* 471.

- α. *Marchantia major*, capitulo stellato: radiis tere-
tibus. *Mich. gen.* 2. *t.* 1. *f.* 1.

Lichen fontanus major stellatus æque ac *umbellatus* & *cyathophorus*. *Dill. musc.* 523. *t.* 76. *f.* 6.

Lichen petræus latifolius siye *Hepatica fontana*.
Baub. pin. 362. *Comm. boll.* 66.

Lichen petræus. *Lob. ic.* 2. *p.* 246. *Boerb. lugdb.*
1. *p.* 17. *n.* 11.

Steen-Lever-kruid. Belg.

- β. *Marchantia stellata*. *March. act.* 1713. *p.* 307. *t.* 5.
Marchantia capitulo stellato: radiis teretibus.

Mich. gen. 2. *t.* 1. *f.* 2.

Lichen domesticus minor stellatus æque ac *umbellatus* & *cyathophorus*. *Dill. musc.* 527. *t.* 77. *f.* 7.

Lichen petræus stellatus. *Baub. pin.* 362. *Comm. boll.* 66.

Lichen secundus. *Lob. ic.* 2. *p.* 246. *Boerb. lugdb.*
1. *p.* 17. *n.* 12.

- γ. *Marchantia calyce communi octopartito*: laciniis
e plano convexis. *Linn. lapp.* 423. *Gelr.* 580.

Marchantia capitulo non dissecto. *Mich. gen.* 1.
t. 1. *f.* 5.

Lichen petræus umbellatus. *Baub. pin.* 362. *Comm. boll.* 66.

Lichen tertius. *Lob. ic.* 2. *p.* 246. *Boerb. lugdb.*
1. *p.* 17. *n.* 13.

In de Hoven en elders, op schaduwachtige plaatsen.
Pharm. α. HEPATICÆ FONTANÆ. herb.

- cruciata.* 938. *MARCHANTIA calyce communi quadripartito*:
laciniis tubulosis. *Sp.* 1604. *n.* 3.

Lichen feminifer lunulatus, *florifer pileatus*,
tandem *cruciatus*. *Dill. musc.* 521. *t.* 75. *f.* 5.

Lichen seu Hepatica lunulata, *epiphyllocarpos*.
Raj syn. 41. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 16.

† *Volgens BOERHAAVE.*

- tenella.* 939. *MARCHANTIA calyce communi hæmisphæ-
rico apiculato*: margine lamellis radiato *Sp.*
1604. *n.* 4.

Lichen pileatus parvus carinatus, capitulis fim-
briatis. *Dill. musc.* 521. *t.* 75. *f.* 4.

In de Duinen by Wassenaar, in de Elze-beschjes.
(MEERBURGH.)

Rarissima Belgii plantula.

940. *MARCHANTIA* calyce comn uni quinqueloculari *conica*.
 subovato. *Sp.* 1604. *n.* 6.
Lichen vulgaris major pileatus & verrucosus. Dill.
musc. 516. *t.* 75. *f.* 1.
Lichen petraeus, cauliculo pileolum sustinente.
Baub. pin. 362. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 15.
Oed. dan. *t.* 274.
 β. *Lichen verrucosus Dood. Raj. syn.* 41. *Boerb.*
lugdb. 1. *p.* 17. *n.* 17.
 † *Volgens BOERHAAVE.*

R I C C I A.

941. *RICCIA* frondibus dichotomis lineari-filiformi-*fluitans*.
bus. Sp. 1606. *n.* 4. *Fris.* 472.
Lichenastrum aquaticum fluitans tenuifolium fur-
catum. Dill. musc. 213. *t.* 74. *f.* 42.
Hepatica palustris dichotoma, segmentis angu-
stioribus. Vaill. par. 98. *t.* 10. *f.* 3.
Oed. dan. *t.* 275.
In Friesland in den eersten opvaart ten Oosten bet
Verlaat by de Bonte bok, en in de Vaart by de
Schans naar 't Heeren-veen; en elders.
DILLENII icon melius plantam exprimit quam
VAILLANTII.
MEESE nunquam fructificationes in ea detex-it.
Aquis fasciculatim innatat, aut Lemnæ aliisve plan-
tis aquaticis se adfigit; a fine Junii ad finem
Julii præsertim obvia.

A N T H O C E R O S.

942. *ANTHOCEROS* frondibus indivisis sinuatis lævi-*lævis*.
bus. Sp. 1606. *n.* 2.
Anthoceros foliis majoribus minus laciniatis. Dill.
musc. 476. *t.* 68. *f.* 2.
Lichen capillaceus, ex plurimis capillamentis
nigricantibus constans. Merr. pin. 72. *Comm.*
boll. 66.
Op vochtige plaatsfen, en op verrot hout. (COMM.)
Juxta urbem Harlemensem in fossarum aggeribus.
(Linn. b. Cliff. 477.)

L I C H E N.

- scriptus.* 943. **LICHEN** leprofus albicans, lineolis nigris ramosis characteriformibus. *Sp.* 1606. *n.* 1. *Gelr.* 659. *Fris.* 473.
Lichenoides crusta tenuissima, peregrinis velut litteris inscripta. *Dill. musc.* 125. *t.* 18. *f.* 1.
Op de bast van jonge Eike en andere Boomen.
- geographi-*
cus. 944. **LICHEN** leprofus flavescens, lineolis nigris mappam referens. *Sp.* 1607. *n.* 2. *Fris.* 474.
Lichenoides nigro-flavum tabulæ geographicæ instar pictum. *Dill. musc.* 126. *t.* 18. *f.* 5.
Oed. dan. t. 468. *f.* 1.
Zeer fraay op Boomen, wier bast nog ongeborsten en glad is.
- rugosus.* 945. **LICHEN** leprofus albicans, lineolis simplicibus punctisque nigris confertis. *Sp.* 1607. *n.* 3. *Fris.* 475.
Lichenoides punctatum & rugosum nigrum. *Dill. musc.* 125. *t.* 18. *f.* 2.
In de Boffchen aan de stammen van Beuke- en Eike-Boomen.
- sequinari-*
us. 946. **LICHEN** leprofus cinereo-virescens, tuberculis atris. *Sp.* 1607. *n.* 4. *Gelr.* 660.
Lichenoides leprosum, crusta cinereo-virescente, tuberculis nigerrimis. *Dill. musc.* 126. *t.* 18. *f.* 3.
Aan de stammen der Boomen op veele plaatsen.
- fusco-ater.* 947. **LICHEN** leprofus fuscus, tuberculis atris. *Sp.* 1607. *n.* 5. *Fris.* 476.
Buiten Franeker op stammen van doode Effchen-boomen.
- fagineus.* 948. **LICHEN** leprofus albus, tuberculis albis farinaceis. *Sp.* 1608. *n.* 10. *Fris.* 478.
Op veele plaatsen op de bast van Beuke-boomen.
- ericetorum.* 949. **LICHEN** leprofus candidus, tuberculis incarnatis. *Sp.* 1608. *n.* 12. *Gelr.* 598. *Fris.* 479.
Coralloides fungiforme carneum, basi leprosa. *Dill. musc.* 76. *t.* 14. *f.* 1.

Fung-

Fungilli incarnati coloris minuti musco insidentes.

Mentz. pug. t. 6. Comm. boll. 40.

Oed. dan. t. 472.

Op de Heide by Lovenich op de Veluwe; op de Rhenense - berg; in de Haarlemmer-hout, en in verscheide Bosschen in Friesland, en elders.

950. LICHEN crustaceus flavus, scutellis luteis. *Sp. candelarius*

1608. n. 13. *Fris. 480.*

Lichenoides crustosum orbiculis & scutellis flavis.

Dill. musc. 136. t. 18. f. 18.

Aan de stammen van veelerhande oude Boomen, en aan oude Muuren.

951. LICHEN crustaceus albicans, scutellis pallidis. *pallidus.*

Sp. 1608. n. 15.

Lichenoides crustosum orbiculare incanum. *Dill.*

musc. 130. t. 18. f. 17.

Op den bast der Boomen op veele plaatsen.

Ipsos etiam Muscos arboribus adnascens investit.

952. LICHEN crustaceus albicans, scutellis nigris: *subfuscus.*

junioribus urceolatis cavis. *Sp. 1609. n. 16.*

Gelr. 661. Fris. 481.

Lichenoides crustaceum & leprosum, scutellis

subfuscis. *Dill. musc. 134. t. 18. f. 16.*

Gelyk de voorgaande.

953. LICHEN imbricatus, foliolis sinuatis scabris la-*scutellis.*

cunosis, scutellis badiis. *Sp. 1609. n. 19.*

Lichenoides vulgatissimum cinereo glaucum lac-

unosum & cirrhosum. *Dill. musc. 188. t. 24. f. 83.*

Muscos cranio humano innatus. *Baub. hist. 3. p.*

764. Comm. boll. 78.

Op Doods-hoofden van Menschen, die in een vochtigen kelder zyn gelegd.

Pharm. USNEA cranii humani.

Non solum hic Lichen, sed & varia Hypna cranii

innascuntur. Vid. Dill. musc. 190.

954. LICHEN imbricatus, foliolis lobatis nitidis li-*olivaceus.*

vidis. *Sp. 1610. n. 21. Fris. 482.*

Lichen crustæ modo arboribus adnascens, oliva-

ceus. *Vaill. par. t. 20. f. 8.*

Lichenoides olivaceum, scutellis amplioribus

verrucosis. *Dill. musc.* 184. t. 24. f. 78.

Op veele plaatsen, aan de basten der Boomen, aan Muuren, en andere steenen.

parietinus. 955. **LICHEN** imbricatus, foliis crispis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Sp.* 1610. n. 25. *Fris.* 483. Lichen dioscoridis & plinii secundus. *Col. ecphr.* 1. 331. *Boerb. lugdb.* 1. p. 16. n. 1. 2. 3.

Lichenoides vulgare sinuosum, foliis & scutellis luteis. *Dill. musc.* 180. t. 24. f. 76.

Musculus crustæ modo arboribus adnascens. *Baub. pin.* 361. *Comm. boll.* 77.

Zeer gemeen aan oude Fruit- en anderen Boomen, ook aan Muuren, planken, paalen, en anderen lichaamen.

Variat colore cinereo, viridante & flavescente.

physodes. 956. **LICHEN** imbricatus: laciniis obtusis subinflatis. *Sp.* 1610. n. 26. *Gelr.* 662. *Fris.* 484.

Lichenoides ceratophyllum obtusius & minus ramosum. *Dill. musc.* 154. t. 20. f. 49.

Aan de stammen der Berke-boomen.

gelaris. 957. **LICHEN** imbricatus: foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis, scutellis pullis. *Sp.* 1611. n. 27. *Gelr.* 663. *Fris.* 485.

Lichen crustæ modo arboribus adnascens, tenuiter divisus. *Tourn. inst.* 548. *Boerb. lugdb.* 1. p. 16. n. 5.

Lichenoides cinereum, segmentis argutis stellatis, scutellis nigris. *Dill. musc.* 176. t. 24. f. 70.

Aan de basten der Boomen op veele plaatsen.

ciliaris. 958. **LICHEN** foliaceus erectiusculus: laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis. *Sp.* 1611. n. 28.

Lichen latifolius ramosus minor hirsutus. *Tourn. inst.* 550. t. 325. f. C. *Boerb. lugdb.* 1. p. 17. n. 25.

Lichenoides hispidum majus & rigidius, scutellis nigris. *Dill. musc.* 150. t. 20. f. 45.

Musco-fungus arboreus cinereus scutellatus, marginibus pilosis. *Morif. hist.* 3. p. 634. f. 15. t. 7. f. 6. *Boerb. lugdb.* 1. p. 17. n. 21.

β. Lichen cinereus arboreus, marginibus fimbriatis. *Tourn.*

Tourn. inst. 550. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 29.
Aan veele Boomen.

959. LICHEN foliaceus adscendens laciniatus: *mar- islandicus*.
 ginibus elevatis ciliatis. *Sp.* 1611. n. 29.

β. Lichenoides eryngii folia referens, tenuioribus
 & crispioribus foliis. *Dill. musc.* 212. t. 28 f. 112.
Oed. dan. t. 155.

*Op den weg van Leiden naar Voorschooten aan
 een oude Schutting. (MEERBURGH.)*

960. LICHEN foliaceus adscendens laciniatus crispus *nivalis*.
 glaber lacunofus albus margine elevato. *Sp.*
 1612. n. 30.

Lichenoides lacunofum candidum glabrum, en-
 diviæ crispæ facie *Dill. musc.* 162. t. 21. f. 56.

Oed. dan. t. 227.

In de Duinen by Hillegom. (MEERBURGH.)

961. LICHEN foliaceus liciniatus obtusus glaber: *pulmonari-*
 supra lacunofus; subtus tomentosus. *Sp.* 1612. *us.*
 n. 31. *Gelr.* 581. *Fris.* 487.

Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare,
 marginibus peltiferis. *Dill. musc.* 212. t. 29. f.
 113.

Muscus pulmonarius. *Baub. pin.* 361. *Comm. boll.*
 78.

Longe - kruid. Belg.

*Aan de stammen en takken van oude Boomen, en aan
 vochtige wallen en dykjes op veele plaatsen.*

Pharm. MUSCUS PULMONARIUS.

962. LICHEN foliaceus decumbens furfuraceus: la- *furfuraceus*
 ciniis acutis; subtus lacunofus atris. *Sp.* 1612.
 n. 32.

Lichenoides cornutum amarum: desuper cinere-
 um; inferne nigrum. *Dill. musc.* 157. t. 21. f. 52.

Muscus amarus, absinthii folio. *Baub. hist.* 3. p.
 764. *Comm. boll.* 78.

Aan oude planken van schuttingen aan de Duinkant.

963. LICHEN foliaceus erectus compressus ramosus: *farinaceus*.
 verrucis marginalibus farinosis. *Sp.* 1613. n. 35.
Gelr. 664. *Fris.* 488.

Lichenoides segmentis argutioribus ad margines

verrucosis & pulverulentis. *Dill. musc.* 172. t. 23. f. 63.

Aan oude Beuke- en Eike-boomen, als mede aan schuttingen, bekken, en paalen.

calicaris. 964. LICHEN foliaceus erectus linearis ramosus lacunofus convexus mucronatus. *Sp.* 1613. n. 36. *Fris.* 489.

Lichen cinereus latifolius ramosus. *Tourn. inst.* 550. *Vaill. par.* 115. t. 20. f. 6. *Boerb. lugdb.* 1. p. 17. n. 28.

Lichenoides coralliforme rostratum & canaliculatum. *Dill. musc.* 170. t. 23. f. 62.

Muscus arboreus ramosus coralloides. *Baub. pin.* 361. *Comm. boll.* 77.

Aan de Takken van Appel- en anderen Boomen.

fraxineus. 965. LICHEN foliaceus erectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunofus glaber; scutellis subpendunculatis. *Sp.* 1614. n. 37. *Gelr.* 665. *Fris.* 490.

Lichen pulmonarius cinereus mollior, in amplas lacinias divifus. *Tourn. inst.* 549. t. 325. f. A. *Boerb. lugdb.* 1. p. 17. n. 27.

Lichenoides longifolium rugosum rigidum. *Dill. musc.* 165. t. 22. f. 59.

β. Musco-fungus arboreus angustior scutellatus & peltatus. *Morif. hist.* 3. p. 634. f. 15. t. 7. f. 3. *Boerb. lugdb.* 1. p. 17. n. 26.

Aan de stammen van Eike- en Beuke-boomen.

grunstri. 966. LICHEN foliaceus erectiusculus lacunofus: subtus tomentosus albus. *Sp.* 1614. n. 39.

Lichen cinereus cornua damæ referens. *Tourn. inst.* 549. *Boerb. lugdb.* 1. p. 17. n. 24.

Lichen arboreus, varius magnitudine, ramis, foliis, colore, ex variis arboribus lectus hyeme sævissimâ. *Boerb. lugdb.* 1. p. 17. n. 23.

Lichenoides cornutum bronchiale molle subtus incanum. *Dill. musc.* 160. t. 21. f. 55.

Aan de Wilge, Effche en anderen Boomen, dog voornamelyk aan den Slee-Doorn. 421.

caperatus. 967. LICHEN pallide viridis rugosus margine undulatus. *Sp.* 1614. n. 41. *Gelr.* 584. *Fris.* 491.

Lichenoides caperatum rosaceæ expansum. *Dill. musc.* 193. t. 25. f. 97. c. Li-

- α. Lichen crustæ modo asseribus adnascens latior mollior, vix vasculosus cinereus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 16. n. 6.
- β. Lichen crustæ modo asseribus adnascens, latior mollior, vix vasculosus roseus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 16. n. 7.
- γ. Lichen crustæ modo asseribus adnascens, latior mollior, vix vasculosus, eleganter variegatus ex roseo, albo, nigrescente. *Boerb. lugdb.* 1. p. 16. n. 8.

Aan oude boomen, planken, kei - steenen, ook aan de dykjes langs den Hierder - weg by Harderwyk.

968. LICHEN foliaceus depressus lobatus glaber: *glaucus.* margine crispo farinaceo. *Sp.* 1615. n. 42.

Lichenoides endiviæ foliis crispis splendentibus subtus nigricantibus. *Dill. musc.* 192. t. 25. f. 96.

Musco - fungus lichenoides arborum crispus cinereus subtus nigricans. *Morif. hist.* 3. p. 633. f. 15. t. 7. f. 4.

Oed. dan: t. 598.

Op de Duinen te Catwyk. (MEERBURGH.)

969. LICHEN coriaceus repens lobatus obtusus *placatinus.* nus: subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente. *Sp.* 1616. n. 48. *Gelr.* 582. *Fris.* 493.

Lichen maritimus. C. B. *Comm. boll.* 65. *Boerb. lugdb.* 1. p. 16. n. 10.

Lichen pulmonarius saxatilis digitatus. *Vaill. par.* 116. t. 21. f. 16.

Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis, sinuosis. *Dill. musc.* 200. t. 27. f. 102.

Musco - fungus terrestris latifolius cinereus: hepaticæ facie. *Morif. hist.* 3. p. 632. f. t. 7. f. 1.

Honds - Mosch. Belg.

Op dorre zandige plaatsen aan de Bronsbergen buiten Zutphen; in de Duinen, veel te Catwyk; op 't hooge veld in den Haarlemmer - hout; by Kranenborgs - erf in Tonsel buiten Harderwyk; in Friesland, in de Wouden op verscheidene plaatsen, onder de Heide - struiken; als ook aan dykjes en wallen in de schaduw.

Pharm. MUSCUS CANINUS f. LICHEN CINE-REUS TERRESTRIS.

Hujus plures ratione fimbriarum varietates in maritimis oris detexit Magnus BOERHAAVIUS.

pustulatus. 970. **LICHEN** umbilicatus: subtus lacunofus furfure nigro adspersus. *Sp.* 1617. n. 53.

Lichen crustæ modo faxis adnascens verrucosus cinereus & exustus. *Tourn. inst.* 549. *Vaill. par.* 116. t. 20. f. 9. *Boerb. lugdb.* 1. p. 16. n. 9.

Lichenoides pustulatum cinereum & veluti ambulatum. *Dill. musc.* 227. t. 30. f. 131.

Oed. dan. t. 597. f. 2.

Op groote Kei-steenen, die lang in de open lucht hebben gelegen.

socciferus. 971. **LICHEN** scyphifer simplex integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Sp.* 1618. n. 58. *Gelr.* 666. *Fris.* 494.

Lichen pyxidatus prolifer, acetabulorum fimbriis tumentibus coccineis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 36.

Coralloides scyphiforme tuberculis coccineis. *Dill. musc.* 82. t. 14. f. 7.

Veel op dorre Hei-gronden, en in 't Haagfche-Bosch.

Pharm. MUSCUS PYXIDATUS.

cornucopioides. 972. **LICHEN** scyphifer simplex folio brevior, tuberculis coccineis. *Sp.* 1619. n. 59.

Coralloides scyphiforme: marginibus radiatis & foliatis. *Dill. musc.* 85. t. 14. f. 9.

In de Duinen by het Huis ten Deyl. (MEERBURGH.)

pyxidatus. 973. **LICHEN** scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. *Sp.* 1619. n. 60. *Fris.* 495. *Gelr.* 587.

Lichen pyxidatus major. *Tourn. inst.* 549. t. 325. f. D. *Vaill. par.* 115. t. 21. f. 2. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 30.

Coralloides scyphiforme, tuberculis fuscis. *Dill. musc.* 79. t. 14. f. 6.

Musculus pyxoides terrestris. *Baub. pin.* 361. *Comm. Holl.* 78.

β. Lichen pyxidatus prolifer. *Tourn. inst.* 549. *Vaill. par.* 115. t. 21. f. 5. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 37.

γ. Lichen pyxidatus, acetabulorum oris fuscis & tumentibus.

mentibus. *Tourn. inst.* 549. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 37.

973. Lichen pyxidatus, acetabulorum oris nigerrimis & tumentibus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 38.
By de voorgaande.

974. LICHEN scyphifer simplex denticulatus, stipi- ~~fimbriatus~~
te cylindrico. *Sp.* 1619. n. 61. *Fris.* 496.

Lichen pyxidatus minor. *Tourn. inst.* 549. *Vaill.*
par. 115. t. 21. f. 6. *Mich. gen.* 83. t. 41. f.
45. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 31.

Coralloides scyphiforme gracile, marginibus serratis. *Dill. musc.* 84. t. 14. f. 8.
In de Boffchen op dorre gronden.

975. LICHEN scyphifer ramosus denticulatus filifor- ~~gracilis~~
mis. *Sp.* 1619. n. 62. *Fris.* 497.

Coralloides scyphiforme ferratum elatius, caulibus gracilibus glabris. *Dill. musc.* 88. t. 14. f. 13.

Musco-fungus pyxidatus gracilior ramosus, calycibus ferratis. *Morif. hist.* 3. p. 362. f. 15. t. 7. f. 6.

By de voorgaande.

976. LICHEN scyphifer ramosissimus: ramis cylindri- ~~digitatus~~
cis, calycibus integris nodosis. *Sp.* 1620. n. 63.
Fris. 498.

Coralloides ramulosum, tuberculis coccineis. *Dill. musc.* 96. t. 15. f. 19.

Als vooren.

977. LICHEN scyphifer simpliciusculus subventrico- ~~cornutus~~
sus, calycibus integris. *Sp.* 1620. n. 64. *Fris.*
499.

Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris. *Dill. musc.* 90. t. 15. f. 14.

Als vooren.

978. LICHEN pyxidatus non ramosus, acetabulis fimbriatis. *Tourn. inst.* 549. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 34.

Lichen cornubus simplicissimis acutis farinosis. *Hall. hist.* 1902.

Coralloides scyphiforme cornutum. *Dill. musc.* 92. t. 15. f. 16.

β. Lichen pyxidatus, corniculis aduncis. *Tourn. inst.* 549.

Lichen pyxidatus minimus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 33.

Op de Heide, in de Boffchen.

deformis. 979. LICHEN scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus dentatis. *Sp.* 1620. n. 65.

Lichen pyxidatus teres, acetabulis minoribus repandis. *Tourn. inst.* 549. *Mich. gen.* 30. t. 41. f. 1. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 33.

Op de Heide.

rangiferinus. 980. LICHEN fruticulosus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus. *Sp.* 1620. n. 66. *Gelr.* 588. *Fris.* 500.

Coralloides montanum fruticuli specie ubique candicans. *Dill. musc.* 107. t. 16. f. 29.

Coralloides corniculis candidissimis. *Tourn. inst.* 595. *Boerb. lugdb.* 1. p. 19. n. 5.

Musculus corallinus, sive Corallina montana. *Tabern. ic.* 810.

Musculus coralloides, sive cornutus montanus. *Baub. pin.* 391. *Comm. boll.* 78.

Oed. dan. t. 180.

Geboornde Berg - Mosch. Belg.

β. Coralloides candida ramosissima exigua. *Boerb. lugdb.* 1. p. 19. n. 6.

γ. Coralloides candida ramosissima mollis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 19. n. 7.

δ. Coralloides candida ramosissima mollis capillaris. *Boerb. lugdb.* 1. p. 19. n. 8.

ε. Coralloides candida ramosissima mollissima, filis pilo tenuioribus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 19. n. 9.

Op de Duinen te Catwyk, en 't hooge veld aan den Haarlemmer-hout; ook op dorre Hei-gronden.

Rangiferi in Lapponia, qui hoc Lichene per integram hyemem vitam sustentant, eum effodiunt, etiamsi ad altitudinem duarum orgyarum nive tecta sit tellus, uti Ill. LINNÆUS, cum in Belgio degebat, mihi retulit.

ancialis. 981. LICHEN fruticulosus perforatus, ramulis brevissimis acutis. *Sp.* 1621. n. 67 *Fris.* 501.

Coralloides perforatum minus molle & tenue. *Dill.*

Dill. musc. 99. t. 19. f. 22.

β. *Coralloides perforatum majus molle & crassum.*

Dill. musc. 98. t. 16. f. 21. B.

Op booge Hei-velden.

982. LICHEN fruticulosus subdichotomus, ramis simplicibus subulatis. *Sp.* 1621. n. 68. *Fris.* 502.

Coralloides corniculis longioribus & rarioribus.

Dill. musc. 102. t. 16. f. 26.

Coralloides cornua cervi referens, corniculis longioribus. Tourn. inst. 565. *Boerb. lugdb.* 1. p. 16. n. 2.

Musculus corniculatus. Tabern. ic. 809. *Baub. hist.* 3. p. 767.

β. *Coralloides sparsum, caulibus tortuosis & spinosis.*

Dill. musc. 101. t. 16. f. 24.

Coralloides cornua cervi referens, corniculis brevioribus. Tourn. inst. 565. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 1.

Musculus coralloides saxatilis cervi cornua referens.

Baub. pin. 361. *Comm. boll.* 78.

Op den Tryffelberg by Hattem. β. Op vochtige steenachtige plaatsen, en op Hei-velden.

β. *Pro distincta specie habetur a DILLENIO.*

983. LICHEN fruticulosus ramosus articulatus, articulis longis cylindricis, peltis pedunculatis. *Mosc.* *Fris.* 503. t. 1.

Corallina (terrestris) opposita ramosa, articulis cylindricis, fructificationibus lateralibus pedunculatis transversim oblongis. Pallas Zoophyt. 427.

Op de Bergummer-Heide in Friesland.

Cl. I. ELLIS (*act. angl. vol.* LVII. ad ann. 1767. p. 420.) ad *Zoophyta hunc Lichenem refert, statuens non esse plantam, sed & mari, quod Belgium olim obtigit; adventitium esse, atque; quod Cl. PALLAS. ut fructificationes describit, ramos esse imperfectos. Ill. LINNÆUS (syst. nat. edit. 12. tom. 1. p. 1206.) quoque ad Vermes Zoophyta refert nomine Corallinae terrestris.*

984. LICHEN filamentosus pendulus, ramis implexis, *phicatus.* *Scutellis radiatis. Sp.* 1662. n. 72. *Gelr.* 583.

Ufnea vulgaris, loris longis implexis. Dill. musc.

56. t. 11. f. 1.

V 5.

Mus.

Musculus arboreus, usnea officinarum. *Eaub. pin.*
 361. *Comm. boll.* 77.
Boom - Mosch. Belg.
Aan veelerhande soorten van Boomen.
 Pharm. MUSCULUS ARBOREUS.

hirtus. 985. LICHEN filamentosus ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis. *Sp.* 1623. n. 78.
Gelr. 667.
 Usnea vulgarissima tenuior & brevior sine orbiculis. *Dill. musc.* 67. t. 13. f. 12.
 Musculus ramosus. *Tabern. ic.* 807.
Veel aan verscheide Boomen.

articulatus 986. LICHEN filamentosus articulatus, ramulis tenuissimis punctatis. *Sp.* 1623. n. 80.
 Usnea capillacea & nodosa. *Dill. musc.* 60. t. 11. f. 4.
 Musculus arboreus nodosus. *Eaub. pin.* 361.
 Musco-fungus arborum nodosus s. geniculatus.
Morif. hist. 3. p. 634. f. 15. t. 7. f. 11.
In de Duinen te Wassenaar. (MEERBURGH.)

floridus. 987. LICHEN filamentosus ramosus erectus, scutellis radiatis. *Sp.* 1624. n. 81. *Gelr.* 585.
 Usnea vulgarissima tenuior & brevior cum orbiculis. *Dill. musc.* 69. t. 13. f. 13.
 Musculus arboreus cum orbiculis. *Eaub. pin.* 361.
Comm. boll. 77.
 Musculus ramosus floridus. *Tabern. ic.* 808.
Veel aan Beuke-boomen.

T R E M E L L A.

foliosa. 988. TREMELLA plicata undulata. *Sp.* 1625. n. 2.
Gelr. 668. *Gmel. fuc.* 222.
 Tremella terrestris sinuosa pinguis & fugax. *Dill. musc.* 52. t. 10. f. 14.
 Nostoc paracelsi. *act. paris.* 1708. p. 228.
In de Hoven en Wei-landen in de Na-zomer na langdurigen regen.

verrucosa. 989. TREMELLA tuberculosa solida rugosa. *Sp.* 1625. n. 5. *Gelr.* 670. *Gmel. fuc.* 227.
 Tremella fluviatilis gelatinosa & uterculosa. *Dill. musc.*

musc. 54. *t.* 10. *f.* 16.

In de Beeken op de Steenen by Essenburg, Vaassen,
Reukum, en elders op de Veluwe.

990. TREMELLA subglobosa sessilis solitaria glabra, *purpurea*.

Sp. 1626. *n.* 7. *Fris.* 508.

Lichenoides tuberculosum, amœne purpureum.

Dill. musc. 127. *t.* 18. *f.* 6.

Aan kwynende en doode takken van Abricose, Aal-
bezie, en andere soorten van Boomen in 't Voor-
en Na-jaar.

Colore suo pulchre rubro facile dignoscitur.

F U C U S.

991. FUCUS caule filiformi ramoso, foliis lanceolatis *marinis*.

serratis, fructificationibus globosis peduncula-

tis. *Sp.* 1628. *n.* 13. *Gmel. fuc.* 92.

Fucus folliculaceus, serrato folio. *Baub. pin.* 365.

Lenticula marina, serratis foliis. *Dalech. hist.* 1397.

Zee-Kroos. Belg.

Op 't Strand tusschen Scheweningen en Catwyk.

(MEERBURGH.)

992. FUCUS fronde plana dichotoma costata serrato-*serratus*.

dentata, fructificationibus terminalibus tuber-

culosis. *Sp.* 1626. *n.* 1. *Easter. opusc.* 6. *p.* 120.

n. 3. *f.* 3. *Gmel. fuc.* 57.

Fucus f. Alga latifolia major dentata. *Morif. hist.*

3. *p.* 648. *f.* 15. *t.* 9. *f.* 1. *bona*.

Te Catwyk, aan 't Strand. (MEERBURGH.)

993. FUCUS fronde plana dichotoma costata integer. *vesiculosus*.

rima: vesiculis axillaribus geminis: terminali-

bis tuberculatis. *Sp.* 1626. *n.* 2. *Fris.* 509.

Gmel. fuc. 60.

Fucus maritimus vel Quercus maritima vesiculas

habens. *Baub. pin.* 365. *Comm. boll.* 39.

Quercus marina. *Lob. ic.* 2. *p.* 255. *Clus. hist.* 1.

p. 21.

Zee-Eike. Belg.

Overvloedig in de Zuider-Zee omtrent 't Eyland

Wieringen, en aan 't Zee-strand van Friesland.

Potenter resolvit tumores duros. *Vid. Gmel. fuc.*

p. 67.

994. F U -

- divaricatus* 994. *Fucus* fronde plana dichotoma integerrima, axillis divaricatis: vesiculis axillaribus geminis. *Sp.* 1627. n. 8. *Fris.* 511.
Fucus bullatus fruticescens, caule nudo, foliis rectis compressis bifidis. *Morif. bist.* 3. p. 647. f. 15. t. 8. f. 5.
In Friesland tusschen Harlingen en Dykshoek op verscheide plaatsen aan 't Strand.
Cl. GMELINUS (Fuc. p. 62.) pro varietate Fuci vesiculosi habet.
- ceranoides.* 995. *Fucus* fronde plana dichotoma integerrima punctata lanceolata, fructificationibus tuberculatis bifidis terminalibus. *Sp.* 1626. n. 3. *Fris.* 510. *Gmel. fuc.* 115.
Fucus humilis dichotomus *ceranoides*, latioribus foliis ut plurimum verrucosis. *Morif. bist.* 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 13.
By de voorige; ook by Wieringen.
Morisoni icon non satis bona. Vid. Meese Fris. 510.
- canaliculatus.* 996 *Fucus* fronde plana dichotoma integerrima canaliculata lineari, fructificationibus tuberculatis bipartitis obtusis. *Syst. edit.* 13. p. 812. *Gmel. fuc.* 73. t. 1. A. f. 2.
Oed. dan. t. 244.
 β. *Fucus excisus.* *Sp.* 1627. n. 10.
Fucus dichotomus membranaceus ex viridi flavescens *ceranoides* angulos rotundiusculos efformans. *Morif. bist.* 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 11.
Te Catwyk aan 't Strand. (MEERBURGH.)
- nodosus.* 997. *Fucus* fronde compressa dichotoma, foliis distichis integerrimis, vesiculis innatis solitariis dilatatis. *Sp.* 1628. n. 11. *Fris.* 512. *Baster. opusc.* 6. p. 121. t. 11. f. 5. *Gmel. fuc.* 78. t. 1. B. f. 1.
Fucus maritimus *nodosus.* *Baub. pin.* 365. *Comm. boll.* 39.
Fucus marinus *tertius.* *Dod. pempt.* 480.
Oed. dan. t. 146.
Knobbelachtig Wierd, Pater noster Wierd. Belg. Omtrent het Eyland Wieringen, en in Friesland aan 't Stand. 998. *Fu-*

998. *Fucus* fronde compressa ramosa, foliis distichis alternis integerrimis, fructificationibus pedunculatis oblongis mucronatis. *Sp.* 1529. n. 17. *Fris.* 513. *Gmel. fuc.* 81. t. 2. B.
Fucus marinus quartus. Dod. pempt. 480.
Fucus maritimus alter, tuberculis paucissimis. Baub. pin. 368. *Comm. boll.* 39.
Oed. dan. t. 106.
By de voorige, en ook te Harderwyk aan 't Zee-Strand.
Sæpe huic innascitur Sertularia pluma.
999. *Fucus* fronde filiformi ramosissima, vesiculis ovatis terminatis foliolis multipartitis obtusis apice fructificantibus. *Sp.* 1629. n. 20. *Gmel. fuc.* 86. t. 2. A. f. 3.
Fucus radicibus arborum fibrosis similis. Raj. syn. 49. n. 45. *Mees.-fris.* 514.
Fucus folliculaceus, foliis foeniculi brevioribus. Baub. pin. 365.
In Friesland aan de Zee.
Coloris est rufi, substantiæ corneæ.
1000. *Fucus* fronde filiformi subfragili opaca. *Sp. Filum.* 1631. n. 31. *Gmel. fuc.* 131.
Fucus sive Filum maritimum germanicum. Bocc. mus. 1. p. 271. t. 9. f. 9.
Filum maritimum germanicum. Baub. prodr. 155.
Alga nigro capillaceo folio. Baub. pin. 364. *Comm. boll.* 5.
By 't Eyland Wieringen.
1001. *Fucus* fronde palmata plana. *Sp.* 1630. n. 26. *palmatus.*
Fucus membranaceus ceranoides. Baub. prodr. 155.
Fucus foliaceus humilis palmam humanam referens. Moris. hist. 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 1.
Alga membranacea ceranoides. Baub. pin. 364. *Comm. boll.* 5.
Aan de Stranden van de Noord-Zee, omtrent Zandvoort.
Cl. GMELINUS synonyma Baubini ad Suum Fucum dulcem refert (fuc. 189. 202.)
1002. *Fucus* fronde filiformi ramosissima hirta. *Sp. ericoides.* 1631. n. 33. *Fu-*

- Fucus Erica marina.* Gmel. *fuc.* 128.
Fucus foliis ericæ. Raj. *bist.* 73. Reaum. *act. gall.*
 1712. p. 41. t. 3. f. 5.
Tamarisco similis maritima. Eaub. *pin.* 365.
Comm. boll. 109.
Erica marina quibusdam. Baub. *bist.* 3. p. 799.
Muscus marinus plumaceus niger. Boerb. *lugdb.*
 1. p. 10.
*Op Hoorns, Schulpen, en Mosselen aan de Zee-
 stranden.*
In Systemate naturæ omissus.

U L V A.

- pavonia.* 1003. *ULVA* plana reniformis sessilis decussatim stri-
 ata. *Syst. edit.* 13. p. 817.
Fucus pavonius. Sp. 1630. n. 28.
Corallina pavonia. Pall. *zooph.* 419.
Fucus maritimus gallopavonis pennas referens.
Baub. prodr. 155. *Morif. bist.* 3. p. 645. f. 15.
 t. 8. f. 7. *Ellis. cor.* 88. t. 33. f. C.
Alga marina gallopavonis plumas referens. Baub.
pin. 364.
Fungus auricularis. Baub. *pin.* 368.
Te Scheveningen aan 't Strand. (MEERBURGH.)
Cl. ELLIS in epistola ad LINNÆUM (act. angl.
 1767. Vol. LVII. p. 419.) probat contra *Cl.*
PALLAS Corallinam pavoniam ejusdem non ad
Corallinas pertinere, sed Fucis inferendam esse,
uti ab Ill. LINNÆO jam factum est, arcusque
transversos in ea deprehendendos, quos Cl. PAL-
LAS feminiferos dixit, non calcareæ indolis esse.
- intestinalis.* 1004. *ULVA* tubulosa simplex. Sp. 1632. n. 1. *Gelr.*
 595. *Fris.* 515.
Tremella marina tubulosa intestinorum figura.
Dill. musc. 47. t. 9. f. 7.
Fucus cavus. Baub. *pin.* 364.
*In de Zuider- en Noord- zee, veel omtrent Koe-
 hool in Friesland.*
- compressa.* 1005. *ULVA* tubulosa ramosa compressa. Sp. 1632. n.
 2. *Fris.* 516.
Tremella marina tenuissima & compressa. Dill.
musc.

musc. 48. t. 9. f. 8.

By de voorgaande.

1006. *ULVA* palmata prolifera membranacea: ramentis inferne angustatis. *Sp.* 1632. n. 5. *Fris.* 517. *Laëuca.*

Tremella. Lactuca. Gmel. fuce. 215.

Tremella marina vulgaris, lactucæ similis. Dill.

musc. 42. t. 8. f. 1.

Fucus lactucæ folio. Tourn. inst. 568. *Boerb. lugdb.* 1. p. 9.

Muscus marinus lactucæ folio. Baub. pin. 364.

Comm. boll. 78.

Zee - Latouw, Zee - Salade. Belg.

Aan Muiderberg onder 't Zee - water op Kei - steenen; ook aan het Zee - strand van Friesland, en in de kuilen en water - plassen omtrent de Zee.

Latissime se sæpius extendit.

1007. *ULVA* fronde oblonga bullata. *Sp.* 1638. n. 8. *Linza. Fris.* 518.

Tremella marina fasciata. Dill. musc. 46. t. 9. f. 6.

Fucus Linza dictus, lactucæ marinæ similis.

Baub. bist. 3. p. 81.

Muscus lactucæ marinæ similis. Baub. pin. 364.

Aan de Zee - stranden van Friesland.

C O N F E R V A.

1008. *CONFERVA* filamentis simplicissimis æqualibus *regularis.* longissimis. *Sp.* 1633. n. 1. *Gelr.* 596. *Fris.* 519.

Conferva fluviatilis sericea vulgaris & fluitans.

Dill. musc. 12. t. 2. f. 2.

Conferva plinii. Lob. ic. 2. p. 257.

Alga viridis, capillaceo folio. Baub. pin. 364.

Comm. boll. 5.

Flap, Deeken - vlag. Belg.

In stilstaande Wateren en Slooten op veele plaatsen.

1009. *CONFERVA* filamentis æqualibus ramosis, bulbullosa. las aëreas includentibus. *Sp.* 1634. n. 3.

Conferva palustris bombycina. Dill. musc. 18.

t. 3. f. 2.

Alga bombycina. Baub. pin. 363.

Mus-

Musculus aquaticus bombycinus, tenuissimis filamentis. *Loef. pruss.* 173. t. 55.

In stilstaande Wateren, en in de Regen-bakken.

conalicularis.

1010. CONFERVA filamentis æqualibus basin versus ramosioribus. *Sp.* 1634. n. 3. *Gelr* 671. *Fris.* 520.

Conferva rivulorum capillacea, densissime congestis ramulis. *Dill musc.* 21. t. 4. f. 15.

Alga in tubulis aquam fontanam ducentibus. *Bauh. pin.* 364.

In de Beeken by de Papier-molens.

amphibia.

1011. CONFERVA filamentis æqualibus ramosis, exsiccatione coëuntibus in aculeos. *Sp.* 1634. n. 5. *Fris.* 521.

Conferva amphibia fibrillosa & spongiosa. *Dill. musc.* 22. t. 4. f. 17.

Op veele plaatsjen in Vaarten, Graften, Vyvers en Slooten, aan stammen van Boomen, en aan anderen lichaamen onder water; ook somtyds in dochtige Gruppels en Gooten.

littoralis.

1012. CONFERVA filamentis æqualibus ramosissimis elongatis scabriusculis. *Sp.* 1634. n. 6. *Fris.* 522.

Conferva marina capillacea longa ramosissima. *Dill. musc.* 23. t. 4. f. 19.

Tusschen Harlingen en Dykshoek, by Enckhuizen, en elders aan 't Strand.

capillaris.

1013. CONFERVA filis geniculatis simplicibus: articulis alternatim compressis. *Sp.* 1636. n. 14. *Fris.* 523.

Conferva filamentis longis geniculatis simplicibus. *Dill. musc.* 25. t. 5. f. 25.

Conferva fluitans, filamentis geniculatis. *Pluk. alm.* 113. t. 84. f. 9. *Morif. bist.* 3. p. 644. f. 15. t. 4. f. 3.

In plassen met brak-water, en in Slooten omtrent Dykshoek in Friesland.

corallina.

1014. CONFERVA filis geniculatis dichotomis. *Sp.* 1636. n. 15. *Fris.* 524. t. 2.

Conferva marina gelatinosa, corallinae instar gen-

niculata crassior. *Dill. musc.* 33. t. 6. f. 36.
Zeer veel in Friesland aan 't Strand, en dikwils op Mossels.

Variat colore albo, rubente, & ex albo rubente.

Conf. Dill. musc. t. 6. f. 37, & t. 7. f. 40.

1015. *CONFERVA* filis geniculatis: articulis cylindri. *catenata.*
cis. Sp. 1636. n. 16. Fris. 525.

Conserva ramosa, geniculis longioribus cateniformibus. Dill. musc. 27. t. 5. f. 27.

In plassen met brak water by Dyks - hock in Friesland.

1016. *CONFERVA* filamentis geniculatis, ramis fasciculatis. *Sp. 1636. n. 17. Fris. 526.*

Conserva marina geniculata nigra palmata. Dill. musc. 32. t. 6. f. 35.

Oed. dan. t. 395.

Na barden storm, by Koehool in Friesland aan 't strand gevonden door MEESE.

B Y S S U S.

1017. *BYSSUS* capillaris mollissima parallela fragilissima pallida. *Syst. edit. 12. tom. 3. p. 235. edit. 13. p. 819.*

Byssus latissima filtrum s. pannum laneum simulans, filamentis tenuissimis non ramosis. Mich. gen. 211. n. 10.

In de huizen onder de bonte vloeren; veel te Enckhuizen.

1018. *BYSSUS* filamentis plumosis natantibus. *Sp. 1637. Flos aqua. n. 1. Gelr. 672. Fris. 527.*

Byssus latissima, papyri instar supra aquam expansa. Dill. musc. 2.

Water - bloeizel. Belg.

Veel op 't Water in de voor-zomer.

Cl. F. G. WEIS (plant. cryptog. floræ Gotting. p. 19. non vult ad vivas pertinere plantas, sed esse materiam collectam e particulis putredine destructarum plantarum aquaticarum, ob levitatem summam aquæ petentibus superficiem.

1019. *BYSSUS* lanuginosa violacea lignis adnascens *phosporæ.*
X Dill.

Dill. musc. 4. t. 1. f. 6. *Sp.* 1638. n. 2. *Gelr.* 673. *Fris.* 528.

Op oud verrot hout, op vochtige en beschaduwde plaatsen, en in beslootene kelders.

velutina. 1020. *Byssus capillacea viridis: filamentis ramosis.* *Sp.* 1638. n. 3. *Fris.* 529.

Byssus tenerrima viridis velutum referens. *Dill. musc.* 7. t. 1. f. 14.

Byssus terrestris viridis herbacea & mollissima, filamentis ramosis & non ramosis. *Mich. gen.* 211. t. 89. f. 5.

Op den gront in de schaduwe op zeer veele plaatsen.

Jolithus. 1021. *Byssus pulverulenta sanguinea faxis innascens.* *Sp.* 1638. n. 8. *Fris.* 530.

Byssus germanica minima saxatilis aurea violæ odorem spirans. *Mich. gen.* 210. t. 89. f. 3.

Jolithus f. lapis violaceus. *Swenck. foss.* 382.

Op steenen en tusschen de zelven by veranderlyken vochtig weêr, en ook op den gront in donkere vochtige plaatsen, als ook in bloempotten in kassen en broei-bakken.

candelaris. 1022. *Byssus pulverulenta flava lignis adnascens.* *Dill. musc.* 3. t. 1. f. 4. *Sp.* 1639. n. 9. *Gelr.* 674. *Fris.* 531.

Aan oude planken, muuren, en op oude panne-daken.

botryoides. 1023. *Byssus pulverulenta viridis.* *Sp.* 1639. n. 10. *Fris.* 532.

Byssus botryoides saturate viridis. *Raj. angl.* 3. p. 5. 6. *Dill. musc.* 3. t. 1. f. 5.

Zeer gemeen op donkere vochtige gronden, en op de Tuin-potten.

incana. 1024. *Byssus pulverulenta incana, farinæ instar strata.* *Dill. musc.* 3. t. 1. f. 3. *Sp.* 1639. n. 11.

Aan de kanten der slooten, langs zandige wegen.

læteo. 1025. *Byssus pulverulento-crustacea albissima.* *Sp.* 1639. n. 12. *Fris.* 533.

Byssus candidissima, calcis instar muscos vestiens. *Dill. musc.* 2. t. 1. f. 2.

Op de basten van oude Boomen, en op de Mossen.

FUN-

F U N G I.

A G A R I C U S.

1026. *AGARICUS* stipitatus, lamellis ramosis decur-*Chanterel-*
rentibus. *Sp.* 1639. *n.* 1. *Gelr.* 675. *Fris.* 540. *lus.*

α. Fungus minimus flavescens infundibuliformis.
Baub. pin. 373. *Comm. boll.* 42. *Boerb. lugdb.*
i. p. 12. *n.* 13. *Vaill. par.* 60. *t.* 11. *f.* 9. 10.

Elvela pediculata pileata, pileo subtus reticu-
lato. *Guett. stamp.* 1. *p.* 12.

β. Fungus angulosus & velut in lacinias sectus. *Baub.*
pin. 371. *Vaill. par.* *t.* 11. *f.* 14. 15.

Oed. dan. *t.* 264.

Chanterelle of *Geele Champignon*. Vulgo.

γ. Fungus pallidus, *Chanterelle* dictus, se contor-
quens esculentus. *Baub. hist.* 3. *p.* 832.

α. Op 't bobbelige veld buiten Haarlem. *β.* *Veel*
onder de Boomen en in de Bosschen by Putten,
Uilenpas, Keppel, en elders in Gelderland; op
Zandenburg, Hardenbroek, &c. in 't Sticht
van Utrecht; omtrent het Orange-woud in
Friesland. γ. buiten Franeker.

Synonymum *f. Baub.* Fungus intybaceus, & alius
interaneorum vituli similis, cinereus, a *Com-*
melino β. adpositum excludatur.

1027. *AGARICUS* stipitatus, lamellis omnibus ma-*integ-*
gnitudine æqualibus *Sp.* 1640. *n.* 3. *Fris.* 541.

Agaricus major, pediculo longo modice crasso,
lamellis albis creberrimis superne ad margines
apparentibus. *Raj. suppl.* 18. *Buxb. cent.* 4.
p. 12. *t.* 19.

Op Hei-velden, en in sommige Wei-landen, omtrent
Augustinisga &c. in Friesland.

1028. *AGARICUS* stipitatus, lamellis dimidiatis foli-*muscarius.*
tariis, stipite volvato: apice dilatato, basi
ovata. *Sp.* 1640. *n.* 4. *Gelr.* 676.

Agaricus caulescens, pileo sanguineo, verrucis
lamellisque albis, stipite albo basi globoso.

Linn. lapp. 515.

Fungi muscas interficientis III. species aut va-

rietas. *Baub. pin.* 373. n. 19.

Fungorum perniciosorum genus 12. n. 4. *Clus. hist.* 2. p. 280.

In de Laan van den Vanenburg op de Veluwe.

piperitus. 1029. *AGARICUS* stipitatus, pileo planiusculo lactescente, margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis. *Sp.* 1641. n. 8. *Gelr.* 677.

Fungus piperatus albus crassus, lacteo succo turgens. *Baub. hist.* 3. p. 825. *Mich. gen.* 141. *Boerb. lugdb.* 1. p. 11. n. 4.

Fungus albus acris. *Baub. pin.* 371.

β. Fungus pileolo lato orbiculato candicante. C. B. *Comm. boll.* 40.

Fungus umbilicosus lactescens. *Sterb. fung.* 116. *In de Bosschen in Gelderland; β. in de Aardenhouts - Laan buiten Haarlem.*

campestris. 1030. *AGARICUS* stipitatus, pileo convexo squamato albedo, lamellis ruffis. *Sp.* 1641. n. 9. *Gelr.* 678. *Fris.* 542.

Fungus pileolo lato & rotundo. *Baub. pin.* 370. *Comm. boll.* 39.

Fungus campestris albus superne, inferne rubens. *Baub. hist.* 3. p. 824.

Witte Champignon, eetbaare Campernoelje, ook Duivels - brood. Belg.

β. Fungus pileolo lato & rotundo livido. *Baub. pin.* 370. *Boerb. lugdb.* 1. p. 11. n. 2.

γ. *AGARICUS* stipitatus, pileo flavo convexo, lamellis albis. *Sp.* 1642. n. 14. *Fris.* 543.

Fungus orbicularis exalbidus pratensis. *Baub. pin.* 370. *Boerb. lugdb.* 1. p. 11. n. 5.

Fungus divi georgii, coloris exalbidi cum pauca flavitie, esculentus pratensis 1. *Baub. hist.* 3. p. 824.

Fungus croceus magnus. *Sterb. fung.* 63. t. 11. f. 3.

Op verscheide plaatsen in den herfst in de Weiden, en ook op 't hooge Veld by de Haarlemmer - hout.

mammosus. 1031. *AGARICUS* stipitatus, pileo convexo acuminato griseo, lamellis convexis griseis crenatis, stipite nudo. *Sp.* 1642. n. 15. *Fris.* 544.

Fungus minor, capitulo pileum nauticum referen-

rente, pediculo longiore. *Buxb. cent. 4. p. 13. t. 21. f. 1.*

By het Strandmeesters - Huis aan den Zeedyk, omtrent het Bildt in Friesland.

1032. *AGARICUS stipitatus*, pileo hemisphærico *clypeatus*. viscido acuminato, lamellis albis, stipite longo cylindrico albo. *Sp. 1642. n. 16. Frisf. 545.* Fungus clypeatus in medio protuberans. *Vaill. par. 68.*

Veel in Boffchadien, en in de Hoven in 't najaar.

1033. *AGARICUS stipitatus*, pileo campaniformi al- *extinflori-* bido lacero, lamellis niveis, stipite subbulbo- *us.* so subulato nudo. *Sp. 1642. n. 17.*

Fungus perniciosus ex eodem pediculo multiplex. *Tourn. inst. 560. Boerb. lugdb. 1. p. 12. n. 10. fl. Belg. 1051.*

Fungi dumetorum ex uno pede prodeuntes. *Baub. pin. 374. Comm. boll. 41.*

Fungorum perniciosorum genus XXII. Spec. V. *Clus. hist. 2. p. 285.*

Aan oude Boomen; ook by de wegen te Schalkwyk in 't Sticht van Utrecht.

Variat colore, magnitudine & numero, pro diversis, quibus innascitur arboribus. (BOERH.)

1034. *AGARICUS stipitatus*, pileo campanulato lace- *finetarius.* ro, lamellis nigris lateraliter flexuosis, stipite fistuloso. *Sp. 1643. n. 18. Gelr. 679. Frisf. 546.*

Fungus oris laceris & in lacinias divisus. *Baub. pin. 373. Comm. boll. 41.*

Fungus comatus. *Sterb. fung. 228. t. 22. f. 1. K. L.*

Fungorum perniciosorum genus 16. n. 3. *Clus. hist. 2. p. 282.*

Padden-stoelen. Vulgo.

Op Mest-boopen, en op donkere vochtige verrotte gronden.

1035. *AGARICUS stipitatus*, pileo campanulato stria- *campanula-* to pellucido, lamellis adscendentibus, stipite *ius.* nudo. *Sp. 1643. n. 19. Frisf. 547.*

Fungus multiplex obtuse conicus, colore griseo murino. *Vaill. par. 71. t. 12. f. 1. 2.*

In veele Wei-landen op boopjes oude Koe-mest in 't najaar.

- fragilis.* 1036. *AGARICUS* stipitatus, pileo convexo viscido pellucido lamellisq̃ luteis, stipite nudo. *Sp.* 1643. n. 21. *Fris.* 548.
Fungus pileo croceo splendoris particeps. *Vaill.* par. t. 11. f. 16. 17. 18.
In 't najaar op veele plaatsen in de Wei-landen.

- umbelliferus.* 1037. *AGARICUS* stipitatus, pileo plicato membranaceo, lamellis basi latioribus. *Sp.* 1643. n. 22. *Gelr.* 680. *Fris.* 549.
Fungus minimus totus albus, pileo hemisphaerico utrinque striato, lamellis rarioribus. *Mich.* gen. 169. t. 80. f. 11.
In de Bosschen en Hoven tusschen de afgevallene bladen.

- quercinus.* 1038. *AGARICUS* acaulis, lamellis labyrinthiformibus. *Sp.* 1644. n. 26. *Fris.* 550.
Agaricus villosus, lamellis sinuosis & invicem implexis. Buxb. cent. 5. p. 3. t. 4. f. 1.
Aan Eike-paalen te Higtum en Augustinisga in Friesland.

B O L E T U S.

- igniarius.* 1039. *BOLETUS* acaulis pulvinatus laevis, poris tenuissimis. *Sp.* 1645. n. 3. *Fris.* 551.
Agaricus pedis equini facie. Tourn. inst. 562.
Boerb. lugdb. 1. p. 14. n. 1.
Fungus in caudicibus nascens, unguis equini figura. *Baub. pin. 372.*
Fungus durus igniarius. *Park. theatr. 1323. Comm. boll. 42.*
Vonk-bout. Vulgo.
β. *Agaricus igniarius, tuberis forma, ingens. Boerb. lugdb. 1. p. 1. n. 2.*
Aan oude Eike-paalen en Boomen.

- versicolor.* 1040. *BOLETUS* acaulis: fasciis discoloribus poris albis. *Sp.* 1645. n. 4. *Fris.* 552.
Agaricus varii coloris squamosus. Tourn. inst. 562.
Boerb. lugdb. 1. p. 14. n. 1.

Fun-

Fungus cerasorum imbricatim alter alteri innatus,
variegatus. *Baub. pin. 372. Comm. boll. 40.*

Gekrulde Spaander Fungus. Belg.

β. *Agaricus lichenis facie variegatus. Tourn. inst. 562. Boerb. lugdb. 1. p. 14. n. 5.*

Fungus salignus lichenis forma variegatus. *Baub. pin. 372. Comm. boll. 40.*

γ. *Agaricus foliaceus variegatus multiplex. Boerb. lugdb. 1. p. 14. n. 15.*

Aan oude Karfe, Wilge, en andere boomen, als mede aan rottige planken en paalen.

P H A L L U S.

1041. *PHALLUS pileo ovato celluloso, stipite nudo* *esulentus.*
rugoso. Sp. 1648. n. 1. Gelr. 598.

Phallus petiolo nudo, pileo subtus undique annexo. Linn. b. Cliff. 379. Gelr. 599.

Boletus esulentus rugosus. Mich. gen. 203. t. 85. f. 2.

Merulius 1 - 5. Boerb. lugdb. 1. p. 13.

Fungus porosus. Baub. pin. 370.

Oed. dan. t. 53.

Morillies. Vulgo.

In 't laatst van April in de Zalker- en Herkeloerwaard, en in andere Boffchen, onder en aan de kanten van Heggen, voornaamlyk van Ype-boomen: ook wel op den Run, die men in de Hoven strooit.

1042. *PHALLUS volvatus stipitatus, pileo celluloso.* *impudicus.*
Sp. 1648. n. 2. Gelr. 597.

Phallus vulgaris totus albus, volva rotunda, pileo cellulato ac summa parte umbilico pervio ornato. Mich. gen. 201. t. 83.

Phallus hollandicus f. batavicus. Dalech. hist. 1398.

Fungus foetidus penis imaginem referens. Baub. pin. 374. Comm. boll. 41.

Oed. dan. t. 175.

In de Riet-landen by Haarlem door LINNÆUS; in de Duinen en Zandige gronden by Heemstede door COMMELIN; en in de Laanen by Uilenpâs door my gevonden.

CLATHRUS.

- cancellatus.* 1043. CLATHRUS acaulis subrotundus. Sp. 1648. n. 1.
 Clathrus ruber. Mich. gen. 214. t. 93.
 Boletus cancellatus purpureus. Tourn. inst. 561.
 t. 329. f. 6.
 Fungus rotundus cancellatus. Baub. pin. 375.
 Aan den weg tusschen Amsterdam en Haarlem in
 't Riet gevonden 1735 door LINNÆUS.

HELVELLA.

- Mitra.* 1044. HELVELLA pileo deflexo adnato lobato diffor-
 mi. Sp. 1649. n. 1.
 Fungus autumnalis velut apex staminis. Mentz.
 pug. t. 6.
 Fungoides fungiforme crispum laciniatum & va-
 rie complicatum. Mich. gen. 204. t. 86. f. 7.
 Oed. dan. t. 116.
 Aan de boomen in 't Bosch te Meersbergen in 't
 Sticht van Utrecht.

PEZIZA.

- lentifera.* 1045. PEZIZA campanulata lentifera. Sp. 1649. n. 1.
 Gelr. 600. Fris. 554.
 Cyathoides cyathiforme cinereum & veluti seri-
 ceum. Mich. gen. 222. t. 102. f. 1.
 Fungoides infundibuli forma, semine foetum.
 Tourn. inst. 560. Vaill. par. 56. t. 11. f. 6. 7.
 Boerb. lugdb. 1. p. 13.
 Fungus minimus, ligneis tabellis areolarum hor-
 torum adnascens. Baub. pin. 374.
 Oed. dan. t. 105.
 In de Bosschen op takken en andere stukken houts;
 ook in de Hoven aan de kanten van oude broeibak-
 ken; en op de bedden met Run overdekt.
- punctata.* 1046. PEZIZA turbinata truncata, disco punctato. Sp.
 1650. n. 2. Fris. 555.
 Muscus minimus lignosus, disco punctato. Bocc.
 mus. 2. p. 149. t. 107.
 Oed. dan. t. 288.
 In de Wei-landen op hoopjes oude Paarde- en Koe-
 mest, in den Herfst, dog niet veel.

1047. PE-

1047. PEZIZA cyathiformis: extus angulata venis *Acetabulum*.
 ramosis. *Sp.* 1650. n. 4.
Fungi pezizæ plinii. Col. ecphr. 1. p. 385.
Fungoides angulatum, acetabuli forma. Tourn.
inst. 561. *Boerb. lugdb.* 1. p. 13. n. 2.
Fungoides fuscum acetabuli forma, externe ra-
mificatum, seu Fungoides maximum pyxidatum.
Vaill. par. 57. t. 13. f. 1.
 β. *Fungi pezizæ altera species. Col. ecphr.* 1. p. 337.
Fungoides crispum, acetabuli forma. Tourn. inst.
 561. *Boerb. lugdb.* 1. p. 13. n. 3.
 † *Volgens BOERHAAVE.*
Ab Ill. HALLERO bist. 2223. *conjungitur cum*
Peziza cochleata.
1048. PEZIZA plana: margine convexo piloso. *Sp. scutellata.*
 1651. n. 7. *Fris.* 556.
Fungoides, qui fungus minimus scutellatus, co-
loris aurantii. Vaill. par. 57. t. 13. f. 13. 14.
In de Wei-landen, menigvuldig by een, op hoopjes
oude Koe-mest, in nat weder.
1049. PEZIZA concava rugosa auriformis. *Syst. edit. Auricula.*
 13. p. 823.
Tremella Auricula. Sp. 1625. n. 3. *Gelr.* 669.
Belg. 936. *Fris.* 507.
Agaricum auriculæ forma. Mich. gen. 124 t. 66.
 f. 1.
Fungus membranaceus auriculam referens. Baub.
pin. 372. *Comm. holl.* 40.
Judas Ooren. Belg.
Aan de stammen van oude Vlier-en andere Boomen,
in den voortyd.
Pharm. AURICULÆ JUDÆ.

C L A V A R I A.

1050. CLAVARIA ramosa lignea nigra. *Sp.* 1652. n. 4. *digitata.*
Agaricus digitatus niger. Tourn. inst. 562. *Boerb.*
lugdb. 1. p. 14. n. 11.
Hypoxylum, excrementum ligni putridi fun-
gosum digitatum. Mentz. pug. t. 6.
Aan oud verrot hout.
Sæpius est simplicissima. Jacq. vind. 196.

Hypoxylon 1051. *CLAVRIA* ramoso - cornuta compressa. *Sp.* 1652. n. 5. *Fris.* 557.

Fungus cornu dorcadis facie. *Eph. nat. cur. dec.* 1. ann. 4. p. 195.

BREYNIUS *Eph. l. c.* scribit, hunc fungum anno 1661. Amstelodami ex arboris pyri aut pruni trunco originem habuisse. MEESE in pago Harkema opeinde & prope Franequeram in arboribus vetustis putridis reperit. Ego in Belgio bucusque nullibi offendi.

coralloides 1052. *CLAVARIA* ramis confertis ramosissimis inæqualibus. *Sp.* 1652. n. 6. *Fris.* 559.

Corallo-fungus flavus. *Vaill. par.* 41. t. 8. f. 4.
Coralloides flava & albida. *Tourn. inst.* 564. t. 332. f. B.

Barba caprina. *Sterb. fung.* 96. 97. t. 11. f. D. C. B. A.

In de Wei-landen omtrent Hitzum &c. in Friesland in October en November.

MEESE tres vel quatuor bujus uarietates recenset.

LYCOPERDON.

Tuber. 1053. *LYCOPERDON* globosum solidum muricatum, radice destitutum. *Sp.* 1053. n. 1.

α. *Lycoperdon* subterraneum, ovato oblongum, glabrum, basi & radice carens. *Gleditsch. fung.* 156.

Tubera subterranea, testiculorum forma. *Mentz. pug. t. 6. Boerb. lugdb.* 1. p. 15.

Tartuffels. Belg.

By 't Huis 't Velde en de Ehse in 't Graafschap Zutphen.

Bovista. 1054. *LYCOPERDON* subrotundum: lacerato-dehiscens. *Sp.* 1053. n. 3. *Gelr.* 601. *Fris.* 560.

Lycoperdon vulgare. *Tourn. inst.* 563. *Boerb. lugdb.* 1. p. 15. n. 1.

Fungus rotundus orbicularis. *Baub. pin.* 374. *Comm. boll.* 42.

Fungus pulverulentus, dictus Crepitus lupi. *Baub. bist.* 3. p. 848.

Wolfs-feeft, *Bovist.* Belg.

β. Fungus maximus rotundus pulverulentus, dictus ger-

germanis Bofist. Baub. hist. 3. p. 848. Comm. boll. 42.

- γ. *Lycoperdon globosum sessile parvum & glabrum.* Gleditsch. fung. 143.

Lycoperdon rotundum album. Tourn. inst. 563.

- δ. *Lycoperdon sphaericum, cortice tenaci castaneo.* Boerb. lugdb. 1. p. 15. n. 11.

- ε. *Lycoperdon minus & multiplex sphaericum.* Tourn. inst. 563. Boerb. lugdb. 1. p. 15. n. 2.

- ζ. *Lycoperdon minus & multiplex ovatum.* Tourn. inst. 563. Boerb. lugdb. 1. p. 15. n. 3.

- η. *Lycoperdon semiorbiculare.* Tourn. inst. 563. Boerb. lugdb. 1. p. 15. n. 5.

Fungus niger, culicis figuram referens. Baub. pin. 375. Comm. boll. 42.

Fungus semiorbicularis. Dod. pempt. 485.

- θ. *Lycoperdon parvum, mortarii bellici forma.* Boerb. lugdb. 1. p. 15. n. 9.

- ι. *Lycoperdon oblongum, utrinque introrsum emarginatum.* Tourn. inst. 563. Boerb. lugdb. 1. p. 15. n. 7.

Fungus Boletus fascus, basi globosa. Becc. mus. 1. t. 301. f. 4.

- κ. *Lycoperdon, qui fungus globosus levis pallidus ducis poli & rom.* Becc. mus. 1. t. 303. f. 3. Boerb. lugdb. 1. p. 15. n. 8.

- λ. *Lycoperdon ingens conoides pileatum, plerumque gemellum.* Boerb. lugdb. p. 15. n. 10.

- α. & η. *Op zandige gronden in Moes-boven en Wei-landen. β. Aan de dyken van de Beemster en Purmer op klei-grond. γ. In de Alleën by Harderwyk. δ. De overige gelyk ook de voorige Varieteiten vindt men in Friesland op de Kley en in de Wouden in Wei-landen en Bosschen.*

Pharm. BOVISTA. f. CREPITUS LUPI.

Varietas β. quandoque eximie molis occurrit, ita ut quartam dolii xztopeptarum aequet. Cl. BERGIUS (act. suec. vol. XXIII. p. 324.) reperit ineunte Septembri, in colle ex fimo putrido nato, ceterum takaco plantando destinato, Lycoperdon, cujus peripheria major erat duarum ulnarum & trium digitorum, pondus 18 librarum; ad quam magnitudinem quinque aut sex ad summum diebus creverat

1055. *LYCOPERDON volva multifida patente, capi-stellatum.* tulo glabro: ore acuminato plicato. Sp. 1553. n. 15. Ge-

Geaster major, umbilico fimbriato. *Mich. gen.*

120. t. 100. f. 1. 2. 3.

Oed. dan. t. 360.

In de Duinen van Holland, dog zeldzaam. (LINNÆUS.)

peduncula- 1056. *LYCOPERDON* stipite longo, capitulo globo-
tum. fo glabro, ore cylindrico integerrimo. *Sp.*
1654. n. 8.

Lycoperdon parisiense minimum pediculo dona-
tum. Tourn. inst. 563. t. 331. f. E. F. Boerb.
lugdb. 1. p. 15. n. 6.

Overal in de Duinen. (LINNÆUS.)

variolosum. 1057. *LYCOPERDON* parasiticum sessile subrotundum,
cortice exteriori fulvo deciduo; farina atra
compacta. *Syst. edit. 13. p. 824.*

Sphæria Lycoperdoides. Weigel. obs. bot. 47. t. 3.
f. 2.

Lichenoides tuberculosum compressum nigrum,
lignis putridis adnascens. Dill. musc. 127. t. 16.
f. 7.

Aan het Paalwerk aan 't Strand tusschen Harlin-
gen en Roptazyl, en elders.

Epiden- 1058. *LYCOPERDON* cortice farinaque purpurea.
arum. *Sp. 1654. n. 9.*

Lycoperdon sanguineum sphaericum. 1. Buxb.
cent. 5. p. 15. t. 29. f. 2.

Bovista miniata, pisi majoris magnitudine. Dill.
giss. 197.

Aan bouten schuttingen, en oude muuren.

M U C O R.

Embolus. 1059. *MUCOR* seta nigra, villo fusco. *Sp. 1655. n. 3.*
Embolus nigerrimus villo albo adpersus. Hall.
bist. 2137. t. 48. f. 1.

Op verrot hout aan de lucht bloot gestelt.

Mucedo. 1060. *MUCOR* stipitatus, capsula globosa. *Sp. 1655.*
n. 6. Gelr. 681. Frisf. 561.

Mucor vulgaris, capitulo lucido per maturitatem
nigro, pediculo griseo. Mich. gen. 215. t. 95.
f. 1.

Oed.

Oed. dan. t. 467. f. 4.

Schimmel. Belg.

Op oud Brood en andere verrottende lichaamen.

1061. *MUCOR stipitatus*; capitulo subrotundo aggregato. *Sp.* 1756. n. 8. *Fris.* 562.

Aspergillus capitatus, capitulo glauco, seminibus rotundis. *Mich. gen.* 212. t. 91. f. 1.

Meest op Vruchten, die aan 't verrotten zyn.

1062. *MUCOR stipitatus*, spicis digitatis. *Sp.* 1656. n. *crustaceus.*
9. *Gelr.* 682. *Fris.* 563.

Botrytis non ramosa alba, feminibus rotundis.

Mich. gen. 212. t. 91. f. 3.

Op bedorven spys.

1063. *MUCOR albus* capitulis fuscis sessilibus. *Sp.* 1656. *Erysiphe.*
n. 11.

Honing-dauw. Quibusdam.

Op de bladen van de Linde, Hop, doove Netelen,
Esch-doorn, &c.

1064. *MUCOR unctuosus flavus.* *Sp.* 1656. n. 12.

Mucilago flava ramosissima mollis. *Hall. belv.* 5.
Fris. 564.

Spongia fugax mollis flava & amoena in pulvere septicus.
coriario nascens. *March. act.* 1727. p. 472.

Op de Mest in de broeibakken, en op vochtige planken-vloeren.

In primo exortu ramosus, sed sensim ramos deponit
& spongiosam induit formam. (MEESE.)



O M I S S Æ.

- ciliata.* 1065. MELICA flosculi inferioris petalo exteriore ciliato. *Sp.* 97. n. 1.
Gramen avenaceum montanum lanuginosum.
Baub. pin. 10. *prodr.* 20. *theatr.* 156.
In de Wei-landen by Haarlem. (D. OUKERKE.)
Inserenda pag. 23. *supra n.* 80.
- lanceolata.* 1066. PLANTAGO foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. *Sp.* 164. n. 6. *Gelr.* 79. *Fris.* 67.
Plantago angustifolia major. Baub. pin. 189.
Comm. boll. 89. *Morif. hist.* 3. p. 259. f. 8. t. 15. f. 9.
Oed. dan. t. 437.
Honds - Ribbe, smalle of kleine Weegbree. Belg.
β. *Plantago trinervia, folio angustissimo. Baub. pin.* 189. *prodr.* 98. *Boerb. lugdb.* 2. p. 101.
By de voorige soorten.
Variat valde spicarum magnitudine.
Inseratur pag. 42. *supra n.* 144.
- pilosa.* 1067. GENISTA foliis lanceolatis obtusis, caule tuberculato decumbente. *Sp.* 999. n. 9.
Genista ramosa, foliis hyperici. Baub. pin. 395.
Chamæ - Genista prima. Clus. hist. 1. p. 103.
Op 't Veld by de Pypery tusschen den Huize 't Velde en Geessink buiten Zutphen.
Floret mense Majo.
Inserenda. p. 189. *Supra. n.* 593.

PLANTÆ INDIGENÆ

QUÆ

IN LINNÆI SPECIEBUS PLANTARUM & SYSTEMATE NON OCCURRUNT.

1068. GRAMEN paniceum, spicis nigris. *Baub. pin.* 8. *Comm. boll.* 55. *Dill. giff.* 157.

Graminis dentis canini spica divulsa tenuior nigra species. *Baub. hist.* 2. p. 491.

Panik-gras. Belg.

In de Hoven en Moes-hoven en andere bebouwde gronden.

III HALLERUS *flor. jen.* 304. fatetur plantam sibi ignotam esse.

1069. GRAMEN Alopecuros major, spica longiore. *Baub. pin.* 4. *theatr.* 58. *Boerb. lugdb.* 2. p. 158. n. 8.

Alopecuros major maritima repens, spica longiore. *Morif. hist.* 3. p. 191.

† *Volgens* BOERHAAVE.

D. GERARDUS in *Flora Gallo-prov.* 108. *Gramen* hoc ad *Lagurum cylindricum* refert.

1070. GRAMEN loliaceum supinum *Baub. pin.* 7. *theatr.* 130. *Comm. boll.* 54. *Boerb. lugdb.* 2. p. 157. n. 3.

Gramen phalaroides exile supinum humi sparsum danicum lobelii. *Baub. hist.* 2. p. 468.

Gramen loliaceum supinum minus locustis turgidi-

dioribus. *Morif. hist.* 3. p. 182.

By de afzanding aan het Kraaijenest by Heemstede, en in de Haarlemmer-hout.

1071. GRAMEN loliaceum minus vlielandicum. *Comm. boll.* 53. *Boerb. lugdb.* 2. p. 157.
Op Vlieland in het groene Plein.

1072. GRAMEN caninum maritimum, spica foliacea. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 15. *Comm. boll.* 46. *Hill. angl.* 64.

Gramen longius radicum marinum alterum. *Lob.*

Gramen longius radicum marinum, utriculos pro spica gerens. *Baub. hist.* 2. p. 1.

Ander klein Duin-lid-gras van Lobel. Belg.

COMMELINUS radices hujus Graminis saporem & odorem habere aromaticum dicit, sed locum nativum non addit.

1073. CRUCIATA angustifolia, flosculo luteo verticillato. *Boerb. lugdb.* 1. p. 149.

Rubeola repens lutea, foliis spinosis. *Baub. pin.*

334.

Rubia minima lobelii. *Dalech. hist.* 1330.

† Volgens BOERHAAVE.

Rogavi Ill. LINNÆUM in litteris 10 Martii 1762. ad Eum datis, quonam retulerit hanc plantam, & respondit his verbis. „ Scias eam plantam a „ me nullibi visam esse, & adeo raram esse in ip- „ sa Anglia, ubi Lobelius eam reperit, ut dubi- „ tasset Rajus eam dari in rerum natura, nisi „ nominata esset in H. R. P. sed nullus Anglo- „ rum ab eo tempore, quo Lobelius eam detexit, „ hanc vidit; adeoque nec habetur in Raji Sy- „ nopsi, nec in Morisoni historia, nec in Pluke- „ netii Operibus, nec visa Tournefortio, nec aliis. „ Miror ubinam in Belgio habitet tam rara a „ BOERHAVIO lecta † notata indigena planta: „ si vidisti & habeas, quæso millies, des mihi „ vel minutissimum ramulum; forte sub alia idea „ tanquam nota recentioribus innotuerit? Mibi „ certe valde paradoxa est Lobelii figura, quam „ Dalechampius assumsit; nec capio dari folia „ cordata inter omnes verticillatas.

1074. *ANAGALLIS ruthæ foliis dissectis. Bruman.*
Zuoll. 4.
 Omtrent Zwol.

1075. *ALSINE maritima, flore rubente. Baub. pin.*
251. Comm. boll. 7.

Alfne maritima neapolitana. Col. ecpbr.

By Enckhuisen aan de kant van de Zuider-Zee. Is eerst door den Heer JACOB BRAYNE aldaar gevonden: (COMM.)

Achter 's Gravezande op den Haack en 't Nieuwland. (Cel. SCHWENCKE.)

Ego ante triginta circiter annos sæpius maris littus prope urbem meam patriam Enchusam plantas legendi causa calcavi, sed banc plantam non offendi, nisi forsan fuerit Arenariæ rubræ varietas.

1076. *ALSINE major. Baub. pin. 250. Comm. boll. 6.*
Zee-Muur. Belg.

Veel by Zandvoort, en aan den Muiderberg.

*Planta etiamnum mihi dubia; retuli eam in Flora Belgica 376. auctoritate Ill. LINNÆI ad Cera-
 stium aquaticum. Sed in manuscripto postumo
 D. TIMMER Cbirurgi, dum vivebat, apud
 Alkmarienses dexterrimi, simulque egregii Bota-
 nophili, qui eam Texellis et circa Insulam de
 Helder in Dunis copiose legit, notatum invenio,
 plantam esse super terra se dispergentem, foliis
 gaudentem crassiusculis, & cujus pericarpium
 est capsula hujus magnitudinis O. Ipse quoque
 Cl. COMMELINUS monet figuras Dodonæi, Ta-
 bernæmontani & Lobelii malas esse, easque se-
 duxisse C. Baubinum, quum hæc sit planta hu-
 milis, terræ incumbens, quæ pro *Alfne* majori ba-
 beri nequit.*

1077. *SALIX latifolia repens. Baub. pin. 474. Comm.*
boll. 102.

Salix pumila latifolia 2. Clus. bist. 1. p. 85.

Brede Duin-Wilg. Belg.

In de Duin-Valeyen overvloedig.

1078. *MUSCUS denticulatus major. Baub. pin. 360.*
Comm. boll. 77. Boerb. lugdb. 1. p. 22. n. 50.

Muscus terrestris denticulatus. Lob. ic. 2. p. 244.

Klei-

Kleine Aard-Mos. Belg.

Op vochtige Zand-gronden buiten Haarlem.

Quo ad nomina hic Muscus est Lycopodium helveticum. Sp. 1568. n. 18. quod habitat in Alpibus Helvetiæ & Carniolæ, nec extra eas buculus lectum; adeoque COMMELINUS & BOERHAAVIUS aliam Musci speciem, forsan Hypni, hoc nomine intellexerunt.

1079. *MUSCUS denticulatus minor. Baub. pin. 360.*

Comm. boll. 77. Boerb. lugdb. 1. p. 22. n. 51.

Muscus terrestris denticulatus alter. Lob. ic. 2. p. 244.

Ey de voorgaande, en buiten Utrecht.

Quo ad nomina hic Muscus est Lycopodium denticulatum. Sp. 1569. n. 21. quod autem extra Lusitaniam, Hispaniam & Iberiam buculusque non lectum.

1080. *MUSCUS faxatilis squamosus dentatus, capitulis adianthi. Boerb. lugdb. 1. p. 22. n. 46.*

DILLENIIUS suspicatur suum esse Hypnum flagellare faxatile, capsulis gracilibus. Dill. musc. 306. t. 39. f. 42.

1081. *LICHEN-AGARICUS cespitosus acaulis nigricans, sub cute anagyridis non foetidæ erumpens. Mich. gen. 105. t. 54. f. 5. Meese. frif. 477.*

Op de stammen van zwaare Essen-boomen in Friesland.

1082. *LICHEN pulmonarius membranaceus gelatinosus pullus, in segmenta latiora divisus, receptaculis florum exiguis obscure rubris numerosissimis. Mich. gen. 87. Hall. belv. 80. Mees. frif. 492.*

Lichen gelatinosus membranaceus exasperatus convolutus atroviridis, scutellis rubris. Hall. bist. 2037.

Lichenoides gelatinosum membranaceum tenue nigricans. Dill. musc. 138. t. 19. f. 20.

Op de bast van Ypen-boomen te Hytsum in Friesland.

Pertinet ad Lichenes membranaceos.

1083. FUN-

1083 FUNGUS aureus, crustæ instar cortici quercino
raso innascens. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 26.

1084. AGARICUS, qui Fungulus hyemalis, pileolo
albo, lamellis flavis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12.
n. 15.

1085. AGARICUS, qui fungus parvus, pediculo ob-
longo firmo lento, pileolo in medio fastigia-
to, striis exterius apparentibus. *Raj. syn.* 13.
Boerb. lugdb. 1. p. 12. n. 21.
In de Weiden in September.

1086 AGARICUS, qui Fungorum esculentorum ge-
nus VI. *Clus. hist.* 2. p. 266. *Boerb. lugdb.* 1.
p. 12. n. 23.

1087. FUNGUS perniciosus 44 ex uno pede producens.
Comm. boll. 42. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 24.
Aan de voet van oude Appel-boomen in October.

1088. FUNGUS parvus, pediculo oblongo, pileolo
hemisphærico, ex albido subluteus. *Raj. syn.*
13. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 18.
In de Weiden op Koe-en Paarde-Mest.

1089. AGARICUS pileo papillari amplissimo, in mar-
gine fornicato lacero & filamentoso, petiolo
annulato procero, inferius tumido, pilei ace-
tabulo inferro. *Gleditsch. fung.* 114.

Agaricus pediculo annulato, pileo & pediculo
variegatis. *Guettard. stamp.* 23. *Dalib. par.* 378.

Fungus pileolo lato longissimo, pediculo varie-
gato. *Baub. pin.* 371. *Comm. boll.* 40. *Boerb.*
lugdb. 1. p. 11. n. 6.

Fungus coronatus aut marmoreus. *Sterb. fung.*
77. t. 7. A.

Fungi longissimo pediculo candicantes, sed ma-
culati, esculenti. *Baub. hist.* 3. p. 826.

Op zandige gronden in de Haarlemmer-hout.

1090. AMANITA tener conicus lacer cervinus, la-
mellis nigris. *Hall. hist.* 2435.

Fungus clypeiformis major. *Baub. pin.* 373. *Comm.*
boll. 41. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 11.

Fungi multi ex uno pede, clypeiformes lutei & rubri. *Baub. bist.* 3. p. 835.

Aan nat verrot hout.

1091. FUNGUS albus pileolo inverso. *Tourn. inst.* 559.
Boerb. lugdb. 1. p. 12. n. 12.

Fungus albus pileolo inverso similis. *Baub. bist.* 3. p. 847. *Comm. boll.* 42.

Op 't hobbelige veld buiten Haarlem in October.

1092. FUNGUS arboreus clypeum referens ingens foetidissimus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 20.

1093. FUNGI buxei fasciculosi. *Sterb. fung. t.* 25. E.
Boerb. lugdb. 1. p. 12. n. 19.

1094. FUNGUS pallidus marmoreus. *Sterb. fung. t.* 3.
F. F. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 17.

1095. FUNGUS, qui semi-fungus pallidus. *Sterb. fung.* t. 8. E. E. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 16.

1096. FUNGUS semicircularis durus meretti. *Comm. boll.* 42.

Aan oude Peer- en andere Boomen.

1097. FUNGUS lapis bufonis dictus. *Sterb. fung. t.* 23.
F. F. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 22.

1098. AGARICO-FUNGUS superne villosus longus & angustus. *Hall. belv.* 57. *Mees. frif.* 550.

Op verscheide plaatsen in de Boomgaarden uit stammen van boomen, die aan 't vergaan zyn.

1099. AGARICUS ingens aureus, odore vinoso, sapore-acido. *Boerb. lugdb.* 1. p. 14. n. 8.

1100. AGARICUS, qui fungus flammeus, variæ figuræ. *Sterb. fung. t.* 13. A. B. C. D. & t. 14.
E. F. G. *Boerb. lugdb.* 1. p. 14. n. 10.

1101. AGARICUS flammeus semiorbicularis hypocra-
teriformis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 14. n. 7.

1102. POLYPORUS sessilis carnosus flavus digitatus
ma-

maximus. *Hall. bist.* 2277.

Fungus casearius ex campenhout. *Sterb. fung.* 170. t. 12. A. *Comm. boll.* 40.

Aan oude Ypen-boomen, buiten Hoorn, te Amsterdam, en elders.

1103. AGARICUS niger parvus, cornua damæ referens. *Boerb. lugdb.* 1. p. 14. n. 14.

1104. AGARICUS falsus. *Sterb. fung. t.* 27. D. *Boerb. lugdb.* 1. p. 14. n. 9.

1105. AGARICUS fraxineus niger durus orbiculatus. *Tourn. inst.* 562. *Boerb. lugdb.* 1. p. 14. n. 12. *Hall. jen.* 373.

Fungus fraxineus niger durus orbiculatus. *Raj. syn.* 18. *bist.* 109. *Aan de Esfen-boomen.*

1106. FUNGOIDASTER minimus discoides albus, semine ovato donatus, foliis vel lignis semiputridis innascens. *Mich. gen.* 201. t. 82. f. 3. *Meef. frif.* 553.

Op de bast van een boomachtige Aloë-plant gevonden.

1107. FUNGUS pezicæ minoris sanguin. breynii. *Comm. boll.* 41.

Buiten Naarden in vochtige zandige gronden.

1108. PEZIZA cava albida, intus coccinea. *Hall. bist.* 2222.

Elvela orbicularis sessilis excavata, intus coccinea, tota glabra. *Gleditsch. fung.* 49.

Fungus putridis arborum ramis inhærens, plurimis simul cohærentibus. *Baub. pin.* 372. *Comm. boll.* 41.

Fungi perniciosi generis XXIV. *spec.* 2. *Clus. bist.* 2. p. 28.

Parva concha marina, colore coccineo. *Sterb. fung.* 242. t. 26. D.

Aan verrotte afgekapte boomen, en op natte gronden.

1109. PEZIZA membranacea tubæ similis, marginibus erectis laceris. *Hall. bist.* 2217.

Elvela petiolata tubulosa, margine inæquali lacero & multifido. *Gleditsch. fung.* 40.

Agaricus tubæ fallopiæ instar laciniatus. *Tourn. inst.* 562. *Buxb. cent.* 5. p. 3. t. 3. f. 2. *Boerb. lugdb.* 1. p. 14. n. 13.

Aan oude verrotte stammen van Boomen in de Boffchen.

XIIIO. AGARICUM nigrum reticulatum compressum, emortuis arboribus inter corticem & lignum, interdum in ipso ligno innascens, ac late se diffundens. *Mich. gen.* 125. t. 66. f. 3. *Mees. frif.* 558.

Menigvuldig in verrot hout tusschen de bast en 't hout.

XIIII. LYCOGALA griseum majus. *Mich. gen.* 216. t. 95. f. 1. *Mees. frif.* 565.

Somtyds aan oude Eike- en andere paalen, onder bruggen, en aan schoeyingen.

PLANTÆ CULINARES, OFFICINALES, ALIÆQUE CULTÆ, IN FLORA BEL- GICA RECENSITÆ, IN HAC OMISSÆ.

*Numeri præpositi indicant numeros Floræ Belgicæ.

- | | |
|-----------------------------|--|
| 25. Rosmarinus officinalis. | 466. Satureja hortensis. |
| 26. Salvia officinalis. | 482. Betonica officinalis. |
| 32. Valeriana Phu. | 492. Thymus vulgaris. |
| 49. Phalaris canariensis. | 494. Melissa officinalis. |
| 87. Avena sativa. | 520. Lepidium sativum. |
| 98. Secale cereale. | 552. Brassica Napus. |
| 99. Hordeum vulgare. | 554. ——— oleracea. |
| 101. Triticum æstivum. | 557. Sinapis alba. |
| 102. ——— hybernum. | 558. ——— nigra. |
| 118. Rubia tinctorum. | 559. Raphanus sativus. |
| 127. Cornus mas. | 581. Phaseolus vulgaris. |
| 184. Nicotiana Tabacum. | 582. Pisum sativum. |
| 186. Solanum tuberosum. | 589. Vicia Faba. |
| 195. Vitis vinifera. | 592. Trifolium Melilotus cæ- rulea. |
| 211. Beta vulgaris. | 613. Scorzonera hispanica. |
| 241. Sium Sifarum. | 617. Lactuca sativa. |
| 247. Coriandrum sativum. | 633. Cichorium Endivia. |
| 255. Anethum graveolens. | 647. Cynara Scolymus. |
| 256. ——— Foeniculum. | 657. Artemisia Dracunculus. |
| 259. Pimpinella Anisum. | 674. Inula Helenium. |
| 260. Apium Petroselinum. | 697. Calendula officinalis. |
| 277. Allium Porrum. | 750. Morus nigra. |
| 278. ——— sativum. | 751. ——— alba. |
| 282. ——— Ceba. | 760. Juglans regia. |
| 284. ——— Schoenoprasum. | 761. Fagus Castanea. |
| 285. ——— ascalonicum. | 765. Pinus Abies. |
| 339. Polygonum Fagopyrum. | 766. Momordica Elaterium. |
| 342. Ruta graveolens. | 767. Cucumis sativus. |
| 380. Asarum europæum. | 786. Spinacia oleracea. |
| 381. Portulaca oleracea. | 787. Cannabis sativa. |
| 399. Prunus Cerasus. | 795. Juniperus Sabina. |
| 405. Mespilus germanica. | 798. Taxus baccata. |
| 408. Pyrus Cydonia. | 802. Atriplex hortensis. |
| 414. Rosa centifolia. | 807. Acer Pseudo - Platanus. |
| 415. ——— gallica. | |
| 462. Teucrium Chamæpitys. | |

ZOOPHYTA INDIGENA.

- A. SPONGIA panicea. *Pall. zooph. 235.*
Spongia medullam panis referens. Ellis. cor. 80. n. 2. t. 16. f. d. D. Mees. frif. 538.
Aan't Zee-strand van Friesland.
- B. SPONGIA capillaris tubulosa simplex miro modo implicata crispa ferruginea. *Mees. frif. 539.*
By de voorige.
- C. SPONGIA lacustris. *Linn. Syst. edit. XII. p. 1299. n. 15.*
Te Catwyk in 't malle gat. (MEERBURGH.)
- D. SPONGIA fluviatilis. *Linn. Syst. 1299. n. 16. Pall. zooph. 231.*
Badiaga minor. Buxb. act. petrop. 2. p. 344. Cent. 5. p. 12. t. 23. f. 2.
Veel aan de oude paalen van de Nieuwstads-brug te Zutphen, en in den Ouden-Yssel by Doesborg. (Nos.) Aan de paalen in een Vyver van een Tuin buiten Rotterdam (Rev. D. NOZEMAN.)
Spongia hæc, quam mihi misit amicissimus D. NOZEMAN, non erat ramosa: videtur fluxu perpetuo fluenti, in quo crescit, ramos sive cornua acquirere, quæ in aqua stagnante non generantur. Semina, quæ Spongiæ fluviatili tribuunt RUPPIUS & BUXBAUMIUS, etiam in nostra recenti reperta sunt a D^{no} NOZEMAN, qui in litteris ad me 4. Octob. 1771. datis, contra Lib. Bar. MUNCKHAUSEN (Linn. amæn. acad. vol. VII. p. 398.) scribit, illa semina nequaquam animalcula produxisse; atque etiam Auctor Commentariorum de reb. in scient. nat. & med gestis, statuit Spongiam fluviatilem ad vegetabilem adhuc naturam accedere. Conf. Epist. erud. ad Hall. Vol. 1. p. 52. ubi male Badaja legitur. De ejus usu apud Russos vide Flor. Ingr. p. 178.
- E. FLUSTRA foliacea. *Linn. Syst. 1300. n. 1.*
Eschara foliacea. Pall. zooph. 16.
Porus cervinus imperati. Baub. pin. 367. Comm. boll. 92.
Alga marina platyceros porosa. Baub. bist. 3. p. 809.
Op Vlieland aan de Zeekant.

F. FLUS-

- F. FLUSTRA pilosa. *Linn. Syst.* 1301. n. 3.
 Eschara pilosa. *Pall. zooph.* 15.
Zee-Mos. Belg.
Veel in de Noord-Zee omtrent Scheveningen.
- G. ESCHARA crustulenta. *Pall. zooph.* 8.
 Eschara lapidescens. *Baster. opusc.* 1. l. 2. p. 83. t. 7.
f. 4. 5.
Menigvuldig in 't Eyland Schouwen in Slooten van brak- of
zout-water.
- H. TUBULARIA indivisa. *Linn. Syst.* 1301. n. 1.
 Tubularia calamaris. *Pall. zooph.* 38.
Te Scheveningen aan 't strand.
- I. TUBULARIA ramosa. *Linn. Syst.* 1302. n. 2.
 Tubularia trichoides. *Pall. zooph.* 41.
By Noordwyk op 't strand.
- K. TUBULARIA fistulosa. *Linn. Syst.* 1302. n. 3.
 Cellularia Salicornia. *Pall. zooph.* 21.
 Corallina fistulosa fragilis prima. *Baub. hist.* 3. p. 811.
Comm. boll. 29.
By Zandvoort op 't strand, alwaar door de Zee word opge-
worpen.
- L. TUBULARIA muscoides. *Linn. Syst.* 1302. n. 5. *Pall.*
zooph. 39.
Aan 't Zee-strand van 't Eyland Walcheren.
(L. BOMME Verband. van 't Zeeuwsch Genootschap. 2de
deel. p. 281.)
- M. SERTULARIA pumila. *Linn. Syst.* 1306. n. 2. *Pall.*
zooph. 79.
Aan de Noord-Zee omtrent Zandvoort op de Fucus ericoides.
- N. SERTULARIA operculata. *Linn. Syst.* 1307. n. 3.
 Sertularia usneoides. *Pall. zooph.* 80.
Zee-Hair. Belg.
Te Catwyk en Scheveningen.
- O. SERTULARIA abietina. *Linn. Syst.* 1307. n. 5. *Pall.*
zooph. 81.
 Abies marina belgica. *Clus. hist.* 1. p. 35. *Comm. bol.* 3.
 Abieti similis maritima. *Baub. pin.* 365.

Zee-Denne-boom. Belg.
Aan 't Zee-Strand van 't Eyland Wieringen, de Helder, Texel, op Hoorns en Mossel-schulpen.

P. SERTULARIA cupressina. Linn. Syst. 1308. n. 6. Pall.
 zooph. 89. Mees. frif. 535.

Cupressus marina belgica Clusii & I. Bauh. Comm. boll. 30.
Zee-Cypres. Belg.

β. Sertularia argentea. Linn. Syst. edit. X. p. 809. n. 7.
Op Hoorntjes en Schulpen omtrent 't Eyland Wieringen; ook aan de Friesche kusten. β. *Te Catwyk aan 't Strand.*

Q. SERTULARIA Thuja. Linn. Syst. 1308. n. 9. Pall.
 zooph. 88.
In Zeeland. (PALLAS.)

R. SERTULARIA Myriophyllum. Linn. Syst. 1309. n. 10.
 Pall. zooph. 96.
Te Zandvoort aan een stuk Kryt.

S. SERTULARIA falcata. Linn. Syst. 1309. n. 11. Pall.
 zooph. 90. Mees. frif. 536.
Aan de Friesche kusten.

T. SERTULARIA Pluma. Linn. Syst. 1309. n. 12. Pall.
 zooph. 93.
Te Harderwyk aan 't Strand op de Fucus siliquosus.

V. SERTULARIA antennina. Linn. Syst. 1310. n. 14. Pall.
 zooph. 91.
Zee-baard. Belg.
Te Catwyk aan Schulpen en stukken Kryt.

W. SERTULARIA dichotoma. Linn. Syst. 1312. n. 22. Mees.
 frif. 537.
Sertularia longissima. Pall. zooph. 69.
Zee-draad. Belg.
Aan de Zee-stranden van Friesland.

X. SERTULARIA spinosa. Linn. Syst. 1312. n. 23.
Sertularia sericea. Pall. zooph. 65.
Te Catwyk aan 't Strand.

Y. SERTULARIA Lichenastrum. Linn. Syst. 1313. n. 27.
 Pall. zooph. 85.

Te

Te Catwyk aan de Fucus nodosus.

Z. SERTULARIA eburnea. Linn. Syst. 1316. n. 39.

Cellularia eburnea. Pall. zooph. 33.

Aan de Nood-Zee omtrent Zandvoort op een stuk Krypt.
Omnia hæc Zoophyta ad littora Oceani Hollandiam alluentis
obvia mecum communicavit industrius Hortulanus MEER-
BURGH, qui eadem primo vere et sero autumnno, præcipue
post tempestatem duorum triumve dierum, non sine magni
frigoris tolerantia, ex magnis acervis Fucorum in littora
rejectis extricavit.



A. a. OSTEOCOLLA officinarum. Comm. boll. 84.

Been-breuk. Belg.

In de Duinen van Heemstede; en veel te Rakagne.

Non est planta lapidosa, ut Cl. COMMELINUS scribit,
sed Topbus calcareus cylindricus perforatus. Linn. amæn.
3. p. 151.

B. b. PILA marina velut ex ampullis constans ad spumæ si-
militudinem. Baub. pin. 368. Comm. boll. 87.

Zee-Ballen. Belg.

Word aan de Zee-stranden van Holland opgeworpen.

Non est Vegetabile, sed concrementum perpetuo fluxu maris
ex tuberibus radicum Zosteræ (744. 745.) in fibrosas &
stuppofas pilas maceratione resolutas, aliisque rebus cum
spuma maris ita compactum. Vid. Raj. hist. 83. Schrock.
Epb. N. C. Dec. 11. ann. 1. obs. XIV. Pharm. Wirtemb.
17. Pall. Zooph. 342.



α. USTILAGO Secales. Baub. pin. 24. Comm. boll. 117.

Ustilago. Dod. pempt. 542.

Brand-koorn. Belg.

β. Ustilago Hordei. Baub. pin. 24. Comm. boll. 117.

γ. Ustilago Avenacea omniumque Avenæ specierum. Baub.
pin.

pin. 24. Comm. boll. 117.

- δ. Ustilago Triticī, omniumque hujus specierum.
- ε. Ustilago Poæ aquaticæ. 81.
- ζ. Ustilago Festucae fluitantis. 100.
- η. Ustilago Lolii perennis. 120.
- θ. Ustilago Airæ cespitosæ. 75.
- ι. Ustilago Holci lanati. 828.
- κ. Ustilago Caricis arenariæ. 760.

Aan de Koorn-en Gras-gewassen.

Ustilago morbus est Plantarum, cujus tres occurrunt Species. 1° Spica sive Panicula convertitur in pulverem nigrum subtilissimum, cui malo obnoxia sunt Triticum, Hordeum, Avena, Holcus, Carex. 2° Granum seu semen in longum excrescit, instar calcaris galli, hinc Cornutum sive Clavus dictum, uti in Secali, Festuca, Lolio, Aira. 3° Fructificatio est sana, sed ceterum tota planta tegitur pulvere nigro, instar fuliginis subtilissimæ, uti in Poa aquatica. Interdum quoque tota planta Ustilagine inficitur, ita ut ne unicam proferat fructificationem, sicuti in Triticio junceo prope Scheveningam sæpius videre est.

Aquâ tepidâ hic pulvis aliquot dies maceratus, oculo armato conspicienda præbet corpuscula vermiformia, byalina, anguillarum instar natantia, simili fere modo, ut in liquoribus aquosis mixtis Pipere, inque aliis infusis videmus; quæ an vera sint animalcula animata, disputant recentiores Observatores. Vide Cl. HOUTTUYN Natuurk. Historie. l. Deels 18de stuk. blad. 201. sqq.

ADDENDA & EMENDANDA.

- p. 3. sub l. 21. *infere. Stevens - kruid. Belg.*
 p. 7. l. 34. *adde. in 't Leeftensche broeck.*
 p. 8. l. 3. *adde. Neeten - kruid.*
 p. 11. l. 3. *in margine lege. Pseudacorus.*
ib. l. 20. *in margine lege. foetidissima.*
ib. l. ult. *in margine lege. nigricans.*
 p. 13. l. 24. *lege. Chamæ Schoenus.*
 p. 15. l. 31. *in margine lege. polystachion.*
ib. l. 37. *lege. 562.*
 p. 16. l. 1. *adde. Catoen - bloem.*
 p. 23. sub l. 6. *infere. Bund - gras. Rusticis.*
 p. 30. l. 22. *in margine lege. loeflingiana*
 p. 31. sub l. 16. *infere. Gebaarde Eve. Belg.*
 p. 33. l. 32. *lege. duplici versu dense dispositis constante.*
Scheuch. gram. t. 2.
 p. 35. l. 6. *adde. Obstant etiam icones Auctorum. Cl. GERARD*
(fl. Gallopr. 91.) & GOUAN (fl. Monspel.
470.) pro specie Airæ habent.
 p. 37. l. 11. *in margine adde. fontana.*
ib. sub l. 36. *infere. Wilde Cornoellie. Belg.*
 p. 45. l. 27. *lege. Te Nede, Roderloo, en elders in 't Graaf-*
schap Zutphen, ook op verscheide enz.
 p. 49. l. 13. *adde. Vergeet my niet.*
 p. 55. l. 4. *lege. Hierden.*
 p. 56. l. 6. *lege. SCHWENCKE.*
 p. 62. l. 9. *lege. Nonnullis*
 p. 63. l. 18. *Doorn - beziën. lege. Duin - beziën.*
 p. 78. l. 26. *lege. pabulum.*
ib. l. 37. *lege. Cuilenburg.*
 p. 80. l. 26. *lege. holl. 25.*
 p. 89. l. 12. *adde. ook in den Aardenhout by Haarlem. (D.*
OUKERKE.)
 p. 107. l. 13. *adde. Hond - beziën, Beer - beziën. Perperam*
hæc planta habetur pro Uva Ursi officinarum.
 p. 121. l. 16. *lege. Woud - kruid.*
 p. 124. sub l. 9. *infere. Fenettekens, wilde Christus - Oogen.*
Belg.
 p. 131. l. 5. *adde. In de Weiden tusschen de Bronsbergen en*
den Yssel by Zutphen.
 p. 136. l. 11. *lege. by Zutphen en Harderwyk;*

- p. 145. l. 17. lege. epit. 392.
 ib. l. 19. adde. Keukenschelle,
 p. 146. l. 20. lege. Bronkhorst en Gorssel.
 p. 155. l. 2. lege. Aardenhout.
 p. 156. l. 28. lege. Glid-kruid, Fooden-kruid. Belg.
 p. 164. l. 26. lege. Bruinelle.
 p. 166. l. 22. lege. Hengel.
 p. 174. l. 22. lege. bet Y; ook buiten
 p. 190. l. 29. adde by Rualten en Boxbergen in Overysfel.
 p. 207. sub l. 31. infere. Zwynen Sala. Belg.
 p. 217. l. 9. lege. inungunt.
 p. 221. l. 23. lege. Innekley.
 p. 225. l. 13. adde. Indig.
 p. 234. l. 17. adde. Zots-kullekens of Zots-kapjes-wyfje.
 ib. sub l. 39. infere. Zots-kullekens-manneke.
 p. 239. l. 36. lege. Sarrafyns-kruid.
 p. 244. l. penult. adde. Water-knodsens.
 p. 246. l. 37. lege. Sp. 1381 n. 6.
 p. 258. sub l. 19. infere. Gallæ Dwerg-appels Gelris.
 ib. l. 28. lege. CORYLVS
 p. 263. l. 27. adde. in 't Leeftensche-broek by Zutphen.
 p. 269. l. penult. lege. vino.
 p. 277. l. 2. adde. Natertongen,
 p. 278. l. 38. adde. inde Put by de Provoost militair te Zutphen.
 p. 281. l. 6. lege. anfractuofum.
 ib. l. 22. lege. ventum
 p. 295. l. 4. & 5. dele. Boerb. 151.
 p. 298. l. 12. lege. remotis.
 p. 301. l. 34. lege. Suspitor.
 p. 303. l. 24. lege. detexit.
 p. 311. l. 5. lege. Veel op dorre Hei-gronden.
 p. 313. l. 39. in marg ne lege. plicatus.
 p. 316. l. 14. adde. Martinet Katech. der Natuur. III. deel.
 pl. 5.
 p. 330. l. 1. lege. CLAVARIA.
 p. 331. l. 40. lege. tabaco
 p. 333. l. 22. in margine. septicus. pone post l. 19. in margine.

I N D E X

G E N E R U M

&

S Y N O N Y M O R U M.

A.

Abrotanum 668.
Absinthium. 669. 670. 672.
Acanthium. 661. 662.
Acer. 837. 838.
Acetosa. 327. 328.
Acetosella. 328. 391.
Achillæa. 707.
Achillea. 706. 707.
Acinos. 508.
Acorum. 306.
Acorus. 306.
Acorus. 32.
Adiantum. 852. 867.
Adonis. 462.
Ægopodium. 276.
Æsculus. 333.
Æthusa. 264.
Agarico-Fungus. 1098.
Agaricum. 1049. 1110.
Agaricus. 1026 - 1038. 1103-1105.
Agaricus. 1050. 1084 - 1086. 1089. 1099 - 1101. 1103 - 1109.
Agrimonia. 404.
Agrostemma. 393.
Agrostis. 67 - 72.
Aira. 73 - 79.
Aira. 91.
Ajuga. 478.
Alchemilla. 151.
Alchimilla. 151.

Alga. 745. 992. 1000. 1003. 1008 - 1010.
Algoides. 746.
Alisma. 331. 332.
Alliaria. 560.
Allium. 293 - 295.
Alnus. 211. 786.
Aloe. 454.
Aloides. 454.
Alopecurus. 45. 1069.
Alopecurus. 62 - 65.
Alfina. 281.
Alfina. 3. 4. 16 - 19. 146. 149. 166. 167. 200. 217. 286. 319. 371. 377. 380 - 385. 396 - 401. 529. 1075. 1076.
Althæa. 583.
Alysson. 534.
Amanita. 1090.
Amaranthus. 791.
Ambrosia. 544.
Amellus. 679.
Anacampseros. 386.
Anagallis. 188. 189.
Anagallis. 11 - 13. 146. 186. 200. 1074.
Anchusa. 171.
Andromeda. 360.
Androsæmum. 626.
Anemone. 455 - 457.
Angelica. 257.
Angelica. 276.
Anonis. 596.
Anserina. 435.

An-

- Anthemis.* 702-705.
Anthericum. 300.
Anthoceros. 942.
Anthoxanthum. 28.
Antbriscus. 246. 267.
Anthyllis. 597.
Antbyllis. 234. 381.
Antirrhinum. 521-525.
Aparine. 141.
Aphaca. 598.
Aphanes. 152.
Apium. 275.
Apium. 251. 253.
Aquifolium. 154.
Aquilegia. 453.
Aquileja. 453.
Arabis. 563.
Arctium. 650.
Arenaria. 381-385.
Arenaria. 401.
Argemone. 445.
Argentina. 435.
Aristolochia. 741.
Armeria. 283. 369.
Armerius flos. 370.
Armoracia. 545.
Arnica. 695.
Artefi. 629.
Artemisia. 668-672.
Arum. 742.
Arundo. 116-119.
Ascyron. 623. 626.
Asparagus. 301.
Aspergillus. 1061.
Asperugo. 176.
Asperula. 136.
Asphodelus. 300.
Asplenium. 850-852.
Aster. 689.
Athanasia. 667.
Atriplex. 832-836.
Atriplex. 221-224. 227. 228.
Avellana. 798.
Avena. 109-114.
Avicularia. 199.
Auricula Juda. 1049.
Auricula muris. 385. 396. 399.

B.

Ballota. 502. 503.
Ballote. 502. 503.
Balsamina. 724.
Barba caprae. 427.
—— caprina. 1052.
—— jovis. 417.
Barbarea. 559.
Bardana. 650.
Beccabunga. 11.
Bedeguar. 430.
Beben. 284.
Bellis. 696.
Bellis. 130. 697. 698.
Berberis. 318.
Beta. 231.
Betonica. 527.
Betula. 785. 786.
Bidens. 664. 665.
Bidens. 708.
Bifolium. 734-736.
Bistorta. 352.
Blattaria. 185. 204.
Blattariae affinis. 185.
Blitum. 229. 291.
Boletus. 1039. 1040.
Boletus. 1041. 1043.
Bonus Henricus. 220.
Borago. 175.
Borrago. 175.
Botrytis. 1062.
Bovista. 1054. 1058.
Brassica. 566-569.
Brassica. 564. 565.
Briza. 92.
Bromus. 101-108.
Brunella. 511. 512.
Bryonia. 801.
Bryum. 878-898.
Bryum. 869-875.
Buccaferrea. 165.
Buglossa. 177.

Buglossum. 171. 175-177.
Bugula. 478.
Bulbocastanum. 249.
Bulbus. 296. 298.
Bunias. 574.
Bunias. 567.
Bunium. 249.
Bupbthalmum. 704. 705.
Bupleurum. 245.
Bursa pastoris. 534. 540. 546.
Bursæ pastoris similis. 563.
Butomon. 755.
Butomus. 358.
Buxus. 787.
Byssus. 1017-1025.

C.

Cakile. 574.
Calamagrostis. 54. 118.
Calamintha. 488. 509.
Calamus. 306.
Calcatrippa. 452.
Calcifraga. 254.
Calcitrapa. 713.
Calla. 743.
Callitriche. 3. 4.
Caltha. 477.
Camelina. 533. 561.
Campanula. 193-199.
Cannabina. 497. 664. 665.
Cannabis. 497.
Caprifolium. 201.
Cardamine. 547-551.
Cardamine. 535.
Cardiaca. 505.
Carduus. 652-659.
Carduus. 651. 660-662. 713.
Carex. 756-783.
Carlina. 663.
Carlina. 659.
Carota. 248.
Carui. 272.
Carum. 272.
Caryophyllata. 441. 442.

Caryophyllus. 79. 283. 369. 370.
 378. 379. 394. 399.
Cassida. 510.
Cassutha. 153.
Castanea. 333.
Cataria. 483.
Caucalis. 246. 247.
Cauda equina. 843.
 ——— *murina*. 290.
Centaurea. 709-713.
Centaureum. 341. 711.
Centinodia. 238. 256.
Centunculus. 146.
Ceonanthos. 651.
Cepæa. 387.
Cerastium. 396-399.
Cerasus. 418. 419.
Ceratophyllum. 792.
Cerrefolium. 267.
Cervicaria. 197.
Chærefolium. 266.
Chærophyllo similis. 152.
Chærophyllo. 268. 269.
Chærophyllo. 266.
Chamædrys. 14. 15. 480.
Chamæ-Genista. 1067.
Chamæleagnus. 819.
Chamæleon. 659.
Chamæmelum. 700. 702. 703.
Chamænerion. 335-340.
Chamæorchis. 736.
Chamæ-Schoenus. 42.
Chamaesyce. 407.
Chanterellus. 1026.
Chara. 747. 748.
Cheiranthus. 562.
Cheiri. 562.
Chelidonia. 465.
Chelidonium. 444.
Chelidonium. 465.
Chenopodium. 220-230.
Chlora. 341.
Chrysanthemum. 697. 698.
Chrysanthemum. 705-708.
Cichorium. 649.

- Cichorium.* 644.
Cicuta. 263.
Cicuta. 250. 260.
Cicutaria. 262-264.
Cineraria. 691.
Circæa. 6.
Cirsum. 653. 658.
Cistus. 451.
Clathrus. 1043.
Clavaria. 1050-1052.
Clematis. 458.
Clematis. 218.
Clematitidis. 741.
Clinopodium. 508.
Cnicus. 660.
Cnicus. 663.
Cochlearia. 541-545.
Collum gruis. 580.
Comarum. 443.
Concha. 1108.
Conferva. 1008-1016.
Conium. 250.
Consolida. 174. 452. 478.
Convallaria. 302-304.
Convolvulum. 357.
Convolvulus. 190-192.
Convolvulus. 357.
Conyza. 677.
Conyza. 678. 679. 687. 691-694.
Conyzella. 678.
Corallina. 980. 1003.
Corallo-Fungus. 1052.
Coralloides. 949. 971-978. 980. 1052.
Coreopsis. 708.
Cornu Cervi. 145. 544.
Cornus. 148.
Ceronopus. 144. 145. 544.
Corrigiola. 280.
Corylus. 799.
Cotula. 703.
Cotyledon. 243.
Cracca. 603. 608.
Crassula. 386.
Cratægus. 422.
Crepis. 644.
Crepitus lupi. 1054.
Crista galli. 513.
Critimum. 254.
Cruciata. 240. 830. 1073.
Cucubalus. 371-373.
Cuminum. 272.
Cuscuta. 153.
Cyanus. 710.
Cyatboides. 1045.
Cymbalaria. 521.
Cynapium. 264.
Cynoglossum. 172.
Cynosbates. 430.
Cynosorchis. 726. 729.
Cynosurus. 94.
Cyperoides. 756. 766. 770-772. 776. 777. 781.
Cyperus. 38. 39.
Cyperus. 34. 49. 767.

D.

- Dactylis.* 93.
Damasonium. 738-740.
Daphne. 351.
Datura. 205.
Daucus. 248.
Delphinium. 452.
Dens leonis. 636. 644.
Dianthus. 369. 370.
Diapensia. 244.
Digitalis. 528.
Dipsacus. 131. 132.
Doronicum. 695.
Dortmanna. 720.
Draba. 534.
Draco. 706.
Dracunculus. 706. 743.
Drosera. 288. 289.
Drosion. 289.
Dulcamara. 207.

E.

Ebulus. 278.
Echium. 178.
Ecbium. 168.
Elatine. 522.
Elicbrysum. 673.
Elleborine. 740.
Elvela. 1026. 1108. 1109.
Elymus. 123.
Elymus. 128.
Embolus. 1059.
Empetrum. 816.
Empetrum. 254.
Epilobium. 335-340.
Epipactis. 734. 735. 738-740.
Equisetum. 840-844.
Equisetum. 2. 747. 748. 792.
Erica. 346-350.
Erica. 360. 816. 1002.
Ericoila. 237.
Erigeron. 678-679.
Erigerum. 683. 684.
Eriopherum. 51. 52.
ErUCA. 553. 555. 559. 569
 574.
Erucastrium. 569.
Ervum. 507. 608.
Eryngium. 241. 242.
Eryfino similis. 565.
Erysimum. 558-561.
Erysimum. 557.
Erysiphe. 1063.
Esula. 408. 409. 414. 416.
Euonymus. 211.
Eupatorium. 666.
Eupatorium. 404. 665.
Euphorbia. 407-416.
Euphrasia. 514. 515.

F.

Faba crassa. 386.
Fagus. 798.
Farfara. 680.

Festuca. 95. 100.
Festuca. 81. 103. 105. 107.
 113.
Ficaria. 465.
Filago. 714-718.
Filicula. 856.
Filipendula. 426.
Filix. 847. 849. 854-856.
Filum. 1000.
Fistularia. 520.
Flammula. 463.
Flos ambervialis. 590.
 — *Cuculi.* 550.
 — *regius.* 452.
Foeniculum. 254.
Fontilapatbum. 159.
Fontinalis. 864-866.
Fontinalis. 158. 159.
Fragaria. 431.
Frangula. 210.
Fraxinus. 839.
Fucus. 991-1002.
Fucus. 744. 1003. 1004. 1006.
Fuga demonum. 624.
Fumaria. 586-589.
Fungilli. 949.
Fungoidaster. 1106.
Fungoides. 1044. 1045. 1047.
 1048.
Fungulus. 1084.
Fungus. 1003. 1026. 1028-
 1045. 1047. 1049. 1051.
 1054. 1083. 1085-1097.
 1102. 1105. 1107. 1108.

G.

Galanthus. 291.
Gale. 819.
Galeopsis. 496-498.
Galeopsis. 491. 492.
Galium. 137-141.
Gallium. 136-139.
Geaster. 1055.
Genista. 592-594.

- Genista*. 591. 595. 1067.
Genistella. 593. 594.
Gentiana. 236-240.
Gentiana. 341.
Gentianella. 237. 239.
Geranium. 575-582.
Geum. 441. 442.
Gitbago. 393.
Gladiolus. 33. 358. 720.
Glaux. 217.
Glaux. 319.
Glecoma. 490.
Globularia. 130.
Gnaphalium. 673-676.
Gnaphalium. 714-718.
Gramen alopecurinum. 65.
 ——— *alopecuroides*. 115.
 ——— *alopecurus*. 1069.
 ——— *alpinum*. 775.
 ——— *angustifolium*. 126.
 ——— *aquaticum*. 54. 64. 100.
 ——— *arvense*. 89.
 ——— *arundinaceum*. 54. 80.
 118.
 ——— *avenaceum*. 74. 77.
 97. 98. 102. 114. 1065.
 ——— *caninum*. 68. 73. 123.
 127. 128. 827. 1072.
 ——— *Caryophyllatum*. 769.
 ——— *cristatum*. 95.
 ——— *Cyperoides*. 38. 39. 49.
 50. 756-758. 760. 761.
 763. 767. 773. 776. 778-
 783.
 ——— *dactylon*. 58.
 ——— *dentis canini*. 1068.
 ——— *eriophorum*. 52.
 ——— *floridum*. 379.
 ——— *hirsutum*. 315-317.
 ——— *hosdeaceum*. 124.
 ——— *juncum*. 41. 43. 46.
 311-313. 329. 759. 784.
 ——— *lanatum*. 828.
 ——— *latifolium*. 127.
 ——— *lohiaceum*. 72. 99. 120-
 122. 128. 1070. 1071.
Gramen longius. 1072.
 ——— *maria*. 829.
 ——— *miliaceum*. 70. 71.
 ——— *montanum*. 69. 117.
 ——— *murorum*. 86.
 ——— *myurum*. 62.
 ——— *nemorosum*. 76. 314.
 315. 762. 764.
 ——— *nigro-luteum*. 781.
 ——— *nodosum*. 60. 109.
 ——— *palustre*. 55. 81. 768.
 ——— *panicum*. 56. 57. 65.
 1068.
 ——— *paniculatum*. 86. 88.
 828. 829.
 ——— *parnassi*. 282.
 ——— *phalaroides*. 1070.
 ——— *polyanthemum*. 283.
 ——— *pratense*. 52. 82-85.
 94. 112. 828.
 ——— *secalinum*. 121.
 ——— *segetum*. 67. 75.
 ——— *sorgbi*. 57.
 ——— *spartum*. 53. 78. 119.
 ——— *spicatum*. 28. 93. 124.
 330. 781. 783.
 ——— *sylvaticum*. 66. 106.
 ——— *tomentosum*. 51.
 ——— *tremulum*. 92.
 ——— *triticeum*. 123. 197.
 ——— *typhinum*. 61.
 ——— *typhoides*. 59. 60. 62.
 63.
Graminifolia. 857.
Gratiola. 21.
Gratiola. 403.
Grossularia. 212-214.
Gylophila. 367.
 H.
Halimus. 832.
Hedera. 215.
Hedera. 490.
Hederula. 749.

Helianthemum. 451.
Helix. 215.
Helleborine. 738-740.
Helvella. 1044.
Helxine. 831.
Hepatioa. 935. 937. 938. 941.
Hepaticoides. 930. 931.
Hepatorium. 664. 666.
Heptaphyllum. 443.
Heracleum. 255.
Herba britannica. 325.
 ——— *divi stephani.* 6.
 ——— *gerardi.* 276.
 ——— *judaica.* 484.
 ——— *stella.* 145.
Herminium. 736.
Herniaria. 219.
Herocloe. 829.
Hieracium. 639-643.
Hieracium. 630. 632. 637. 638.
 641-647.
Hippocastanum. 333.
Hippolapatium. 325.
Hippophae. 818.
Hippofelinum. 271.
Hippuris. 2.
Hippuris. 748.
Holcus. 827-829.
Holosteo affinis. 290.
Holosteum. 314. 378.
Homolocencbrus. 55.
Horminum. 26. 27.
Hottonia. 182.
Humulus. 820.
Hyacinthus. 305.
Hydroceratophyllum. 792.
Hydrocharis. 825.
Hydrocotyle. 243.
Hydrophace. 749-752.
Hydropiper. 354.
Hyoscyamus. 226.
Hyoscyamus. 334.
Hyoseris. 645.
Hypericum. 623-627.
Hypnum. 899-927.

Hypochæris. 646. 647.
Hypopitys. 359.
Hypoxylum. 1050.
Hyssopifolia. 403.
Hyssopus. 482.

I.

Facea. 709. 712.
Jacobæa. 686. 687.
Jasione. 719.
Iberis. 546.
Ibiscus. 583.
Ilex. 154.
Illecebra. 390.
Illecebrum. 216.
Impatiens. 724.
Impia. 715.
Intybus. 649.
Inula. 692-694.
Folitis. 1021.
Irio. 557.
Iris. 32. 33.
Isnardia. 149.
Judaica herba. 484.
Juncellus. 40. 43.
Juncus. 307-317.
Juncus. 35. 40. 42. 44. 45.
 47. 48. 51. 261. 358.
Jungermannia. 928-935.
Jungermannia. 876. 877.
Juniperus. 826.

K.

Kali. 1. 230. 232-234.
Knawel. 365. 366.

L.

Lactuca. 634.
Ladanum. 496.
Lagopodium. 597.
Lagopus. 613.
Lagurus. 115.

- Lamium.* 491-495.
Lamium. 498. 499. 501.
Lampfana. 648.
Lapathum. 160. 220. 320-325.
Lapis bufonis. 1097.
 ——— *violaceus.* 1021.
Lappa. 650. 790.
Lapfana. 648.
Lathræa. 518.
Lathyrus. 598-602.
Laureala. 351.
Lemna. 749-752.
Lens. 750.
Lentibularia. 23.
Lenticula. 14. 749-752. 991.
Lenticularia. 749. 750. 752.
Leontodon. 636-638.
Leonurus. 505.
Lepidium. 535-537.
Leucathemum. 700.
Leucojum. 291. 562. 720.
Leuconymphæa. 449.
Levisticum. 256.
Lichen. 943-987.
Lichen. 934. 936-940. 942.
 1082.
Lichenastrum. 877. 928-935.
 941.
Lichen- Agaricus. 1081.
Lichenoides. 943-946. 950-
 970. 990. 1057. 1082.
Ligusticum. 256.
Lilium convallium. 302-304.
Limodoron. 530.
Limonium. 284.
Limosella. 529.
Linaria. 524.
Lingua. 464.
 ——— *cervina.* 850.
Limifolia. 280.
Linum. 285-287.
Linza. 1007.
Lithospermum. 169. 170.
Littorella. 784.
Lobelia. 720.
Lolium. 120-122.
Lonchitis. 848.
Lonicera. 201.
Loto-affinis. 597.
Lotus. 617. 618.
Lunaria. 846.
Lupulus. 820.
Luteola. 405.
Lycbnantbus. 371.
Lychnis. 394. 395.
Lycbns. 567. 368. 372-376.
 393.
Lycogala. 1111.
Lycoperdon. 1053-1058.
Lycopodium. 858-861.
Lycopsis. 177.
Lycopsis. 178.
Lycopus. 25.
Lymnanthemum. 180.
Lyfimachia. 183-187.
Lyfimachia. 189. 334-339. 402.
 510.
Lyfimachium. 183.
Lythrum. 402. 403.

M.

- Malva.* 584. 585.
Malus. 525.
Marchantia. 937-940.
Marrubium. 504.
Marrubium. 25. 502. 505.
Matricaria. 699-701.
Medica. 620. 622.
Medicago. 620-622.
Melampyrum. 516. 517.
Melica. 80. 1065.
Melilotus. 610. 619.
Melissa. 509.
Mentha. 485-489.
Mentha. 483.
Menthastrum. 486.
Menyanthes. 180. 181.
Mercurialis. 824.
Merulius. 1041.

Mespilus. 422.
Mezæreum. 351.
Milium. 66.
Milium folis. 169.
Millefolium. 23. 182. 260. 476.
 707. 792-794.
Millegrana. 219. 287.
Mnium. 868-877.
Mollugo. 140.
Monorchis. 757.
Monotropa. 359.
Montia. 129
Morfus diaboli. 133.
 — *gallinæ.* 281. 495.
 — *ranæ.* 825.
Mucilago. 1064.
Mucor. 1059.
Musco-fungus. 965. 968. 969.
 975. 986.
Muscoides. 931.
Muscus abietis facie. 912.
 — *amarus.* 962.
 — *apocarpus.* 878. 879.
 — *aquaticus.* 864. 1009.
 — *arboreus.* 924. 964. 984.
 986. 987.
 — *aureus.* 869. 873. 896.
 — *caninus.* 969.
 — *capillaceus.* 881. 888.
 891. 893. 896. 897.
 — *capillaris.* 867. 914.
 — *clavatus.* 858. 861.
 — *coralloides.* 980. 982.
 — *corniculatus.* 982.
 — *coronatus.* 867. 868.
 869. 882. 886. 892.
 — *cranii humani.* 953.
 — *crustæ modo.* 955.
 — *densis foliolis.* 915.
 — *denticulatus.* 906. 1078
 1079.
 — *denticulato similis.* 918.
 — *erectus.* 860. 884. 916.
 — *filicinus.* 900. 908.

Muscus lactucæ similis. 1006.
 — *marinus.* 1002. 1906.
 — *minimus.* 895. 1046.
 — *montanus.* 915.
 — *palustris.* 875.
 — *pennatus.* 899.
 — *polytrichodes.* 872. 875.
 889. 901.
 — *pulmararius.* 961.
 — *pyxidatus.* 971.
 — *pyxoides.* 973.
 — *ramosus.* 905. 985. 987.
 — *repens.* 907. 910. 911.
 916.
 — *saxatilis.* 887. 895.
 1080.
 — *squamosus.* 904. 906.
 912. 913. 920. 921. 926.
 — *stellaris.* 875.
 — *subtilissimus.* 883.
 — *taxiformis.* 902.
 — *terrestris.* 858. 862.
 875. 883. 891. 894. 916.
 919. 924. 925. 1078. 1079.
 — *trichoides.* 863. 870.
 880. 888. 927. 931.
 — *trichomanoid* 903. 928.
 931.
 — *vulgaris.* 909.
 — *vulgatissimus.* 862.
Myagrion. 533.
Myagrurn. 532. 533.
Myagrurn. 561.
Myosotis. 168.
Myosotis. 398.
Myosurus. 290.
Myrica. 819.
Myriophyllum. 793. 794.
Myriophyllum. 182.
Myrrhis. 267-269.
Myrtillus. 342.

N.

Napus. 567.
Narcissus. 292.
Nardus 53.
Narthecium. 300.
Nasturtium. 535. 537. 547-
 550. 552. 556.

Nepeta. 423.
Nigellastrum. 393.
Noli me tangere. 724.
Noctoc. 988.
Nucula. 249.
Nummularia. 187. 189.
Nymphæa. 448. 449.
Nymphæa. 180. 825.

O.

Oculus Christi. 692.
Ocymoides. 374. 395.
Odontites. 515.
Oenanthe. 261.
Oenothera. 334.
Olus album. 31.
 — *atrum*. 271.
Onobrychis. 194.
Ononis. 596.
Onopordum. 661. 662.
Ophioglossum. 845.
Ophris. 734. 735.
Ophrys. 734. 737.
Opulus. 277.
Orchis. 725. 732.
Orchis. 733. 736. 737.
Origanum. 506.
Ornithogalum. 296-299.
Ornithopus. 609.
Orobanche. 530. 531.
Orobanche. 359. 518.
Orontium. 525.
Orvala. 26.
Osmunda. 846-848.
Osyris. 524.

Otbonna. 691.
Oxalis. 391. 392.
Oxalis. 327. 328.
Oxyacantha. 318. 420.
Oxycoccus. 345.
Oxylapathum. 323.
Oxys. 392.

P.

Padus. 418.
Palmata. 728. 730. 731.
Panicum. 56-58.
Panicum. 65.
Papaver. 445-447.
Papaver. 372.
Parietaria. 831.
Parnassia. 282.
Paronychia. 216. 363. 534.
Parthenium. 699.
Pastinaca. 270.
Pastinaca. 248.
Pecten veneris. 265.
Pedicularis. 519. 520.
Pedicularis. 513.
Pentapbyllum. 436-438. 443.
Peplis. 319.
Peplis. 408.
Perchepier. 152.
Perfoliata. 245.
Perforata. 624.
Periclymenum. 201.
Persicaria. 353-355.
Pes anserinus. 221.
 — *columbinus*. 582.
Petasites. 681. 682.
Peucedanum. 253.
Peziza. 1045-1049.
Peziza. 1108. 1109.
Phalaris. 54. 55.
Phallus. 1041. 1042.
Phascum. 863.
Phellandrium. 262.
Phleum. 59-61.
Phœnix. 121.
Phyllitis. 850.

Phy-

Phyteuma. 525.
Picris. 630.
Picris. 638.
Pilosella. 563. 639. 640. 674.
Pilularia. 857.
Pimpinella. 273. 274.
Pimpinella. 147. 796.
Pinastella. 792.
Pinguicula. 22.
Pinus. 800.
Pityusa. 410.
Plantaginella. 529.
Plantago. 142-145. 1066.
Plantago. 331. 332. 529. 784.
Platanaria. 755.
Pneumonanthe. 236.
Poa. 81-91.
Podagraria. 276.
Polifolia. 360.
Polyacantha. 654.
Polygala. 590.
Polygonatum. 303.
Polygonifolia. 280.
Polygonum. 352-357.
Polygonum. 2. 216. 219. 280.
 287. 365. 366. 384. 401.
Polypodium. 853-856.
Polypodium. 848.
Polyporus. 1102.
Polytrichum. 867.
Polytrichum. 851. 869. 873.
 879. 884. 896.
Populus. 821-823.
Portulaca. 129. 832.
Potamogeton. 155-164.
Potamogeton. 353. 746.
Potentilla. 435-439.
Poterium. 796.
Prenanthes. 635.
Primula. 179.
Prunella. 511-512.
Prunus. 418-421.
Pseudo-Asphodelus. 300.
 Cyperus. 778.

Pseudo Ligusticum. 418.
 Lythymachium. 337. 402.
Pseudo-Orchis. 734.
Ptarmica. 706.
Pteris. 849.
Pulegium. 489. 509.
Pulicaria. 694.
Pulmonaria. 173.
Pulmonaria. 641.
Pulsatilla. 455.
Pyrola. 361. 362.
Pyrus. 424. 425.

Q.

Quercus. 797.
Quercus. 993.
Quinquefolium. 436-439. 443.

R.

Radiola. 287.
Radix cava. 586.
Ranæ morsus. 825.
Ranunculus. 463-476.
Ranunculus. 243. 457.
Rapa. 564.
Rapbanistrum. 573.
Raphanus. 573.
Raphanus. 545. 554.
Rapistrum. 532. 570.
Rapunculum. 194.
Rapunculus. 194. 195. 198. 719.
Regina prati. 427.
Refeda. 405. 406.
Rhamnus. 209. 210.
Rhamnus. 818.
Rhinanthus. 513.
Rbus. 819.
Ribes. 212-214.
Riccia. 941.
Robur. 797.
Rorida. 288. 289.
Rosa. 428-430.
Ros solis. 288. 289.
Rubeola. 1072.

Rubia. 140. 1073.
Rubus. 431-433.
Rumex. 320-328.
Ruppia. 165.
Ruta muraria. 852.

S.

Sagina. 166. 167.
Sagitta. 795.
Sagittaria. 795.
Salicaria. 402. 403.
Salicornia. 1.
Salix. 803-815.
Salix. 1077.
Salsola. 232-234.
Salvia. 26. 27.
Salvia. 479.
Sambucus. 278. 279.
Sambucus. 277.
Samolus. 200.
Sanguisorba. 147.
Sanguisorba. 796.
Sanicula. 244.
Sanicula. 22.
Saponaria. 368.
Satyrium. 733.
Satyrium. 727. 728. 730.
Saxifraga. 363. 364.
Saxifraga. 273. 274.
Scabiosa. 133-135.
Scabiosa. 130. 711. 719.
Scandix. 265-267.
Scariola. 634.
Schoenolagurus. 51.
Schoenus. 34-37.
Scirpus. 40-50.
Scleranthus. 365. 366.
Scolopendrium. 850.
Scordium. 480.
Scorodonia. 479.
Scorpiurus. 168.
Sciophularia. 526. 527.
Scutellaria. 510.
Sedum. 386-390.

Sedum. 363. 364. 417. 454.
Selago. 860.
Selinum. 251. 252.
Sempervivum. 417.
Sepervivum. 390.
Senecio. 683-688.
Serapias. 738-740.
Serpyllun. 507.
Serratula. 651.
Sesamoides. 373.
Seseli. 252.
Sideritis. 484.
Sideritis. 496. 501.
Sigillum salomonis. 303.
Silene. 374-376.
Silybum. 657.
Sinapi. 555. 571. 572.
Sinapis. 570-572.
Sison. 260.
Sisymbria. 552.
Sisymbrium. 552-557.
Sisymbrium. 547. 549.
Sium. 258. 259.
Sium. 260. 263. 547.
Smilax. 190. 191.
Smyrnum. 271.
Soda. 233.
Solanifolia. 6.
Solanum. 207. 208.
Solanum. 205.
Soldanella. 192.
Solidago. 690.
Solidago. 688.
Solis Rös. 289.
Soncho affinis. 648.
Sonchus. 631-633.
Sonchus. 635.
Sophia. 556.
Sorbus. 423.
Sparganium. 755.
Spartium. 591.
Spatula. 33.
Speculum. 199.
Spergula. 400. 401.
Spergula. 286. 384. 529.

Spha.

Sphacelus. 479.
Sphæria. 1057.
Sphagnum. 862.
Sphagnum. 878.
Spondylium. 255.
Spina acida. 318.
 ——— *acuta*. 422.
 ——— *alba*. 661.
 ——— *cervina*. 209.
 ——— *tomentosa*. 661. 662.
Spiræa. 426. 427.
Spongia. 1064.
Squamaria. 518.
Stachys. 499-501.
Statice. 283. 284.
Stellaria. 377-380.
Stellaria. 3.
Stramonium. 205.
Stratiotes. 454.
Struthiopteris. 848.
Succisa. 133.
Symphytum. 174.
Symphytum. 173.

T.

Tamarisco similis. 1002.
Tanacetum. 667.
Taraxacum. 636.
Targionia. 936.
Tatula. 205.
Telephium. 386.
Terræ glandes. 598.
Tetragonia. 211.
Tetrabit. 497.
Teucrium. 479-481.
Teucrium. 15.
Thaliætrum. 459-461.
Thapsus. 202.
Thlaspi. 538-540.
Thlaspi. 543.
Thymus. 507. 508.
Thyselinum. 251.
Tilia. 450.
Titbymalus. 409-416.

Tordylium. 246. 247.
Tormentilla. 440.
Tragopogon. 628. 629.
Tragofelinum. 273. 274.
Trapa. 150.
Tremella. 988-990.
Tremella. 1005. 1007. 1049.
Tribulus. 150. 157.
Trichomanes. 851.
Trifolium. 610-616.
Trifolium. 181. 391. 392. 618-621.
Triglochin. 329. 330.
Trigonella. 619.
Tripolium. 689.
Triticum. 125-128.
Triticum. 123. 516.
Tubera. 1053.
Tunica. 367.
Turritis. 564. 565.
Tussilago. 680-682.
Typha. 753. 754.

U.

Ulex. 595.
Ulmaria. 427.
Ulmus. 235.
Ulva. 1003-1007.
Unifolium. 304.
Urtica. 788. 789.
Urtica. 493. 494. 497-499.
Usnea. 953. 984-989.
Utricularia. 23.
Uva crispa. 214.

V.

Vaccinia. 342. 344. 345.
Vaccinium. 342-345.
Valantia. 832.
Valeriana. 29-31.
Valerianæ rubræ similis. 284.
Vallisneria. 802.
Verbasculum. 179.

- Verbascum.* 202. 204.
Verbena. 24.
Vermicularis. 234.
Veronica. 7. 20.
Veronica. 522.
Viburnum. 277.
Vicia. 603. 606.
Vicia. 598. 607. 608.
Vinca. 218.
Viola. 721. 723.
Viola. 182.
Violaria. 721.
Virga aurea. 688. 690.
 — *pastoris.* 131. 132.
 — *sanguinea.* 148.
- Viscago.* 376.
Viscum. 817.
Vitalba. 458.
Vitis idæa. 342. 345.
Vulneraria. 597.
Vulvaria. 228.
- X.
- Xanthium.* 790.
- Z.
- Zannichellia.* 746.
Zostera. 744. 745.

maritimus. *321. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis
 dentatis graniferis, foliis linearibus. *Sp.* 478.
n. 9.
Lapathum aquaticum, luteolæ folio. *Tourn. inst.*
 564.
Lapathum aquaticum, angustissimo lacuminato
 folio. *Bocc. mus.* 2. p. 142. t. 164.
Te Catwyk by het Malle gat. (MEERBURGH.)
Inferatur pag. 99. *Supra.* n. 322.

R E G I S T E R

D E R

N E D E R D U I T S C H E N A A M E N.

A.

Aak. (spaansche) 838.
Aal-bezien. 212. 213.
Aard-Aker. 599.
——Bezien. 431.
——Klaver. 615.
——Mos. 1078.
——Nooten. 249.
——Rook. 587.
——Veil. 490.
Aarons-baard. 742.
Abeel-boom. 821.
Adders-tong. 845.
Adder-wortel. 352.
Adonis-bloem. 462.
Agrimony. 404.
Ahorn-boom. 837.
Ajuin (Veld-) 296.
Akkely. 453.
Akker-Brem. 592.
——Haanevoet. 472.
——Klitzen. 246.
Alfrank. 207.
Algoede. 220.
Alsem. 669. 670.
Amelands-gras. 95.
Andoorn. 502-504.
Angelica. (wilde) 257.
Appel-boom. 425.
Aquiley. 453.

Asfodillen. 300.
Aspergie. 301.
Aster. (zee-) 689.
Averone. (wilde) 668.
Averuit. (wilde) 668.

B.

Bak-kruid. 179.
Bal-Roozen. 277.
Ballerjes-kruid. 725.
Bastard-Garst. 124.
——Muur. 188.
Bathengel. 481.
Beeke-boom. 11.
Beek-punge. 11.
——schuim. 527.
Beemdt-Diftel. 660.
——Gras. 84.
——Klaver. 612.
Been (wit) 372.
Beere-bezien. 344.
——klaauw. 255.
Beete. 231.
Bentveld-kruid. 512.
Berberissen. 318.
Berg-Knop. 390.
——Mos. 980.
——Nies-kruid. 738.
——Sanikel. 22.
Berke-boom. 785.

Bernasie. 175.
 Bertram. 706.
 Betonie. 527.
 Bevernaart. 273-274.
 Bevernel. 273. 274.
 Bevest. 821.
 Beuke-boom. 798.
 Beursjes-kruid. 540.
 Bezem-kruid. 537.
 Biezen. 44. 261. 309. 310.
 Bilsen-kruid. 206.
 Bingel-kruid. 824.
 Bitter-zoet. 207.
 Blauwe-bessen. 342.
 ——— Lelytjes. 236.
 Blik. 435.
 Bloed-kruid. 320.
 Boekweit. (wilde) 357.
 Boelkens-kruid. 664. 666.
 Boeren-Kers. 538. 539.
 ——— Rottingen. 656.
 ——— Worm-kruid. 667.
 Boks-baard. 628.
 ——— boonen. 181.
 Bol. 393.
 Bolderik. 393.
 Boog-hout. 838.
 Boom-Mos. 984.
 ——— Palm. 787.
 ——— Varen. 853.
 ——— Veil. 215.
 Boonen. (Donder-) 386.
 ——— (Wolfs-) 386.
 Boontjes-Holwortel. 586.
 Bosch-bessen. 342.
 ——— boom. 787.
 ——— gras. 315.
 ——— Haanevoet. 456.
 ——— Muur. 377.
 ——— Varen. 855.
 Boter-bloem. 470. 477.
 Bovist. 1054.
 Bouquet-Lathyrus. 602.
 Braam-bezien. 433.
 ——— boizen. 431.

Brand-Netelen. 788. 789.
 Breekebeen. 1043.
 Brem 591-593.
 ——— Kappers. 591.
 ——— Raap. 530.
 Breuk-kruid. 240. 386.
 Bruinelle. 511.
 Bruin-Heilig. 487.
 Bruinetjes. 462.
 Brummelen. 430. 431.
 Bulpferikken. 753.
 Busboom. 787.
 Butter wortel. 22.
 Byvoet. 671.

C.

Calketrip. 452.
 Calmus. 306.
 Camille. 700-703.
 Campernoelie. 1030.
 Caperfoely. 201.
 Caruwy. 282.
 Carwy. 282.
 Castanie-boom. (wilde) 333-
 ——— (paarde-) 333.
 Catoen-bloem. 52.
 Celdery. 275.
 Champignon. 1026. 1030.
 Chantarelle. 1026.
 Christl Lancet. 845.
 Christus-oogen. (wilde) 896.
 Cicorey. 644. 649.
 Comyn. 272.
 Coraal-kruid. 301.
 Cornoellie. (wilde) 148.
 Crock. 608.

D.

Dammeren-hout. 826.
 Das-Look. 295.
 Deeken-vlag. 1008.
 Deurwas. 245.
 Distel. (Beemdt) 660.

Dis.

Distel. (Daauw-) 633.
 ——— (Drie-) 633.
 ——— (Ganzen-) 633.
 ——— (Haazen-) 633.
 ——— (Haver-) 651.
 ——— (Kruis-) 241. 242.
 ——— (Marien-) 657.
 ——— (Melk-) 657.
 ——— (Meyr-) 241.
 ——— (onze Vrouwe-) 657.
 ——— (Sogge-) 633.
 ——— (Sterre-) 713.
 ——— (Tuimel-) 242.
 ——— (Veld-) 660.
 ——— (Vrouwe-) 657.
 ——— (Wallen-) 242.
 ——— (Weg-) 661.
 Dodden. (Lisch-) 753.
 Doetebolten. 753.
 Dokke-bladen. 681. 682.
 Dol - Appel. 205.
 — Bessen. 207. 208.
 — Kruid. 206. 208.
 Dolle - Kervel. 250. 263. 264.
 Dolyk. 122.
 Donder baard. 417.
 — boonen. 386.
 — kruid. 677. 679. 693.
 Donzen. 753.
 Doorn - Appel. 205.
 — Bessen. 214.
 — (Effen-) 838.
 — (Heukel-) 593.
 — (Katten-) 593.
 — (Kruis-) 214.
 — (Muize-) 154.
 — (Slee-) 421.
 — (Wege-) 209.
 — (Wipe-) 430.
 Doorwas. 245.
 Doove - Netelen. 493. 495.
 497.
 Dotter-bloem. 477.
 — gras. 52.
 — (Vlas) 533.

Dragon. (wilde) 706.
 Draken-bloed. 320.
 Dravik. 101.
 Drieblad. 181.
 Drie-Distel. 663.
 Drop - Wortel. 426.
 Druiven-kruid. 226.
 Duikers. 755.
 Duin-bezien. 219.
 — Doorn. 818.
 — Roos. 429.
 — Wilg. 803. 1077.
 Duive Kervel. 587.
 — poot. 582.
 Duivels-beet. 133.
 — brood. 1030.
 — koppen. 753.
 — meik. 408. 416.
 — naaigaarn. 196.
 Duizend-blad. 23. 793.
 — graan. 219. 287.
 — guldens-kruid. 238.
 — knoop. 2. 356.
 — koorn. 219.
 — schoon. 370.
 Dwerg-appels. 797.

E.

Een-blad. 304.
 Eenden-groen. 750.
 — kroos. 750.
 Eerenprys. 9. 10.
 Effen-doorn. 838.
 Egel-gras. 463.
 — koolen. 463. 464.
 Eglantier - Roos. 428.
 Eiken-boom. 797.
 Eike. (zee-) 993.
 Elfrank. 207.
 Elgjes-hout. 207.
 Elze-boom. 786.
 Engel-zoet. 853.
 Eppe. 252. 258. 264. 271.
 275.

Erf. 281.
 Esch - doorn. 837. 838.
 Espen - boom. 822.
 Effchen - boom. 839.
 Evene. 113.
 Ever - wortel. 659.
 Eyloof. 215.

F.

Felje. 174.
 Fenne - bloemen. 696.
 Fie - kruid. 556.
 Filt - kruid. 153.
 Flap. 1008.
 Flierfin - kruid. 276.
 Fontein - kruid 155. 303. 353.
 Framboizen. 431.

G.

Gagel. 819.
 Gal. (water -) 400.
 Galigaan. 31. 49. 50. 76.
 Gamander. 481.
 Gamanderlyn. 15.
 Ganzerik. 435.
 Ganze - bloemen. 697. 698.
 ——— Distel. 633.
 ——— Voet. 221.
 Garst. (bastard -) 124.
 Gaspel - doorn. 594.
 Geiten - baard. 427.
 ——— blad. 201.
 Geldersche - Roos. 277.
 Genever - boom. 826.
 Gentiaan. 236.
 Gerards - kruid. 276.
 Geruwe. 707.
 Gezegend - kruid. 441.
 Gierst. (zonne -) 169.
 Ginoffelen. 399.
 Glas - kruid. 831.
 Glid - kruid. 484. 510.
 Gods - genade. 21.

Goeden - Hendrik. 220.
 Gouwe. (kleine -) 465.
 ——— (stinkende -) 444.
 Grappe. (Zee) 1.
 Gras. Amelands -) 93.
 ——— (beemdt -)
 ——— (bloeiend - Zee) 283.
 ——— (bund -) 78.
 ——— (dotter -) 52.
 ——— (Egel -) 463.
 ——— (Galigaan -) 763.
 ——— (hairig -) 315. 317.
 ——— (hirs -) 66.
 ——— (Honds -) 127.
 ——— (Koe -) 587.
 ——— (Kreupel -) 356.
 ——— (Leed -) 127.
 ——— (Lidt -) 127. 1072.
 ——— (Nier -) 329.
 ——— (Oogentrooft -) 399.
 ——— (Padde -) 314.
 ——— (Panik -) 1068.
 ——— van Parnas. 282.
 ——— (Pecn -) 127.
 ——— (Pluim - riet -) 118.
 ——— (Puin -) 127.
 ——— (Riet -) 38. 54. 755.
 782.
 ——— (ruig - bosch -) 315.
 ——— (Sorg - zaad -) 57.
 ——— (trillend -) 92.
 ——— (Varkens -) 356.
 ——— (Vlot -) 100.
 ——— (Water -) 768. 782.
 ——— (Weg -) 356.
 ——— (Wolle -) 52.
 ——— (Zaad -) 66.
 ——— (Zee -) 283.
 Graveel - zaad. 567.
 Gravinne - kruid. 145.
 Grind - kruid. 683.
 Grond - heel. 686.
 Grysecom. 587.
 Guichelheil. 188.
 Gulden - hair. 867.

Gulden-roede. 690.
 ——— wederdood. 867.

H.

Haag-appels. 422.
 Haage-doorn. 422.
 Haane-bolten. 753. 754.
 ——— kammen, 513.
 ——— kloortjes. 465.
 ——— poot of voet. 456. 466.
 470. 472.

Haaze-Distel. 633.
 ——— Geruwe. 707.
 ——— Latouw. 633.
 ——— Nooten-boom. 799.
 ——— pootjes. 613.

Haddig. 378.
 Hals-kruid. 197.
 Hamels. (veen-) 52.
 Handekens-kruid. 730.
 Harderstasjes. 540.
 Harts-ge-span. 505.
 ——— Hoorn. 145. 544.
 ——— Hooy. 623. 626.
 ——— Tong. 352. 850.

Hafelaar. 799.

Haver. 111.
 ——— Distel. 651.
 Haviks-kruid. 642. 643.
 Heel-blaadjes. 693.
 ——— wortel. 174.

Heems-wortel. 583.

Heide. 346. 348.

——— (Kraay-) 816.

——— (Steeke-) 593.

Heidens-wond-kruid. 688.

Heil-blad. 461.

Helm. 119.

——— draad. 760.

——— kruid. 526.

Hengel. 517.

Herik. 570.

Hermoes. 841. 843.

Herseleer. 235.

Heuckel-doorn. 593.

Heul. 445-447.

Hexe-krans. 861.

——— melk. 448.

Hinne-bezien. 431.

Hirs-gras. 66.

Hoef-blad. 680.

Hoe-langer hoe-liever. 207.

Hoender-beet. 281. 495.

Hol-wortel. 741.

——— (boontjes-) 586.

Honds-bezien. 344.

——— bloem. 636.

——— boom. 210.

——— draf. 490.

——— gras. 127.

——— Kars. 418.

——— kullekens. 729.

——— Look. 294.

——— Mos. 969.

——— Netelen. 493.

——— Peterfely. 264.

——— ribbe. 1066.

——— Roos. 430. 446.

——— Tonge. 172.

Hondtjes-hout. 210.

Honing-daauw. 1063.

Hop. 820.

Horde. 513.

Hout-pypen. 842.

Huis-look. 389. 417.

Hulst. 154.

Hyacinth. 305.

Hyfop. 482.

I.

Jaagt den duivel. 624.

Jenettekens. 395.

Jeuk-kruid. 466.

Jeupjes. 210.

Indig. 696.

Ingroen. 478.

Innekley. 688.
 Jooden - kruid. 484.
 Josephs - bloemen. 628.
 Judas - ooren. 1049.
 Juffers - schoenen. 618.
 Juffrouw - merk. 275.

K.

Kaale - jonker. 656.
 Kaarden. 131.
 Kaarten. 454.
 Kaasjes - kruid. 584. 585.
 Kalfs - snuit. 525.
 — voet. 742.
 Kali. 230. 232.
 Kalmus. 306.
 Kanker - bloem. 446. 636.
 Kanne - wassers. 131.
 Kardinaals - hoed. 207.
 ————— murs. 211.
 Kars - (honds-) 418.
 — (vogel-) 418.
 Karfe - boom. 419.
 Katten - doorn. 593.
 — hout. 806.
 ————— klauwen. 141.
 ————— kruid. 483.
 ————— staarten. 402.
 ————— voet. 674.
 Keel - kruid. 5.
 Keik. 573.
 Kers. (boere-) 538. 539.
 — (varkens-) 544.
 — (water-) 550. 552.
 — (wilde-) 561.
 — (winter-) 559.
 — (zwynen-) 544.
 Kervel. 266.
 — (duive-) 587.
 — (dulle-) 250. 263. 264.
 — (naalde-) 265.
 — (wilde-) 268. 269.
 Keukenschelle. 458.
 Kievits - bloem. 550.

Kievits vet. 22.
 Kladder - wortel. 650.
 Klap - Roozen. 446.
 Klassen. 650. 790.
 Klaver. 610-612. 615. 616.
 618. 621.
 ————— Zuuring. 391.
 Klaveren (water-) 181.
 Kleef - kruid. 141.
 Klet. 141.
 Klim - op. 215.
 Klirzen. 650. 790.
 — (Akker-) 246.
 Klokskens. 236.
 ————— Winde. 190.
 Knappers. 525.
 Knodsen (water-) 753.
 Knollen. 568.
 Knoop - kruid. 712.
 Koedille. 703.
 Koe - gras. 587.
 — doge. 705.
 Koekoeks - bloem. 394. 550.
 731.
 ————— brood. 391. 392.
 Koefen. 323.
 Koesjes - bladen. 323.
 Kolle - bloemen. 446.
 Koninginne - kruid. 666.
 Konings - Kaarsen. 202.
 Kool (wilde-) 566.
 — (zee-) 192.
 Koorn - bloemen. 710.
 — Heul. 446.
 — (kruip-) 127.
 — (Panik-) 57.
 — Roozen. 393. 446.
 — Sala. 31.
 Kraal - kruid. 1.
 Kraane - bek. 265.
 — hals. 575.
 Kraaye - bloem. 394.
 — heide. 816.
 Krabbe - klauw. 454.
 — kloojes. 671.

Krab-

Krabbe - kwaad. 1.
 Krakel - beziën. 342.
 Kraansjes. 696.
 Kriften. 214.
 Krodde. 570.
 Krokkeling. 144.
 Kroontjes - kruid. 248. 408. 412.
 Kroos. 750. 991.
 Kroofen. 345.
 Kroote. 231.
 Kruidje roerd my niet. 724.
 Kruiken (water -) 448.
 Kruip door den tuin. 490.
 — koorn. 127.
 Kruis - beziën. 214.
 — bloem. 590.
 — distel. 241. 242.
 — doorn. 214.
 — en Munt. 488.
 — kruid. 683.
 — wortel. 683. 684.
 Kulletjes (honds -) 729.
 — kruid. 727.
 — (vosse -) 725.

L.

Lammertjes - ooren. 220.
 Lathyrus (bouquet -) 602.
 — (tros -) 602.
 Latouw (Haaze) 633.
 — (wilde -) 634.
 — (Zee -) 1006.
 Lavas. 256.
 Leeken. 323.
 Leeuwen - bek. 497. 525.
 — klauw. 151.
 — voet. 151.
 Lely convaly. 302.
 Lelie van den dalen. 302.
 Lelytjes (blauwe -) 263.
 Lepelblad. 332. 541. 542.
 — kruid. 541.
 Leverkruid. 404. 937.
 Liend. 190.

Lieven - Heers - teentjes. 188.
 Ligulter. 5.
 Limoen - kruid. 284.
 Linde - boom. 450.
 — (schotsche) 837.
 Linzen. 600.
 — (water -) 750.
 Lisch of Liefch. 358. 755.
 — dodden. 753.
 Longe - kruid. 173. 641. 961.
 Look. 293. 295.
 — zonder Look. 560.
 — (water -) 480.
 Lubbestok. 256.
 Luciaan - kruid. 695.
 Luiten - hout. 837.
 Luize - boom. 211.
 — kruid. 819.
 Lynen. 458.
 Lyfter - beziën - boom. 423.

M.

Maagdelieven. 696. 697.
 Maagden - palm. 218.
 Maan - kruid. 846.
 Majolein (wilde -) 506.
 Maldegeer. 240.
 Mallote. 610.
 Malrove. 25. 502. 504.
 Maluwe. 584. 585.
 Mammetjes - kruid. 201.
 Mans - kracht. 256.
 Marentakken. 817.
 Margarieten. 696.
 Marien - Distel. 657.
 Mater. 699.
 Matte - Vlas. 52.
 May - bloemen. 302.
 — Zoertjes. 696.
 Mayer. 791.
 Meer - Edik. 545.
 — Radys. 545.
 — Wortel. 440.
 Meir - bladeren. 449.

Meir- Distel. 241.
 Melde. 833. 835.
 Melk- bloem. 493.
 ——— Distel. 657.
 ——— kruid. 217.
 ——— wortel. 456.
 Melote. 610.
 Memmekens- kruid. 201.
 Mink- yzers. 150.
 Moeder- kruid. 699.
 Moeders- rasjes. 540.
 Moeren. 52.
 Mol- Salade. 636.
 Mond- hout. 3.
 Morgen- sterren. 298. 628.
 Morilles. 1041.
 Mos (aard-) 1078.
 — (berg-) 980.
 — (boom-) 984.
 — (Honds-) 969.
 — (steen-) 895.
 Mostaart. 571. 572.
 ——— (wilde-) 555.
 Motten- kruid. 204. 226.
 Motte met biggen. 303.
 Muizen- doorn. 154.
 ——— koorn. 120.
 ——— oor. 168. 639.
 ——— staart. 290.
 Munt. 485. 487.
 Muur. 281. 383.
 ——— (bastard-) 188.
 ——— bloemen. 562.
 ——— Peper. 390.
 ——— (ruig-) 397.
 ——— Ruite. 852.
 ——— (water-) 281.
 ——— (zee-) 1076.

N.

Naakte Mannetjes 291.
 ——— Naarsjes. 291.
 Naalde- Kervel. 265.
 Nagel- bloemen. 393.

Nagel kruid. 441. 442. 639.
 Nagt- schade. 208.
 Nater- wortel. 353.
 Navel- kruid. 243.
 Neete- kruid. 23.
 Neglantier. 428.
 Nestelen (zee-) 744.
 Netelen (brand-) 788. 789.
 ——— (doove-) 493. 494.
 497.
 ——— (honds-) 493.
 ——— (zuiker-) 493.
 Nies- kruid. 738.
 Nipt. 483.
 Nooten (aard-) 249.
 ——— (Haaze-) 799.
 ——— (water-) 150.

O.

Olm- boom. 235.
 Onderhave. 490.
 Onze vrouwe- Distel. 657.
 ——— Mantel. 151.
 ——— Melk- kruid.
 173.
 Oogen- klaar. 444.
 ——— troost. 514. 515.
 ——— gras. 399.
 Orant. 523. 525.
 Orego (wilde-) 506.
 Ofse- tonge. 171. 177.
 Oyevaars- bek. 575. 578.
 ——— neb. 265.

P.

Paapen- hoed. 211.
 ——— hout. 211.
 ——— kruid. 636.
 ——— muts. 211.
 ——— stoelen. 636.
 Paarde- bloem. 516. 517. 636.
 ——— Castanie- boom. 333.
 ——— klauw. 680.

Paar-

Paarde - staart. 747. 840-844.
 Paarl - kruid. 169. 170.
 Padde - bloem. 703.
 ——— gras. 314.
 ——— sloelen. 1034.
 Palm (boom -) 787.
 ——— (Maagden -) 218.
 Panik - gras. 1068.
 ——— koorn. 57.
 Parnas (Gras van) 282.
 Partyke. 400.
 Pastinaken. 270.
 Pater noster - Wierd. 997.
 Patigh. 323. 325.
 Peen. 248.
 Peerdick. 323.
 Peere - boom. 424.
 Penning - kruid. 187.
 Penſeen. 722.
 Peper - boompje. 351.
 ——— kruid. 536.
 ——— (muur -) 390.
 ——— (water -) 354.
 ——— wortel. 545.
 Peppel - boom. 821-823.
 Perſik - kruid. 355.
 Peſtilentie - wortel. 681. 682.
 Peterselie (wilde) 251. 264.
 ——— (zee -) 254.
 Pimpernel. 796.
 Pinxter - bloem. 32. 394. 550.
 ——— nakels. 270.
 Pis in 't bed. 636.
 Plompen. 180. 448. 449.
 Pluim - riet - gras. 118.
 Podde - bladen. 681. 682.
 Poel - Ruit. 461.
 Poley. 489. 509.
 Pompe - bloemen. 448. 477.
 Populier - boom. 821-823.
 Porcelyn. (wilde -) 387.
 ——— (zee) 381. 382.
 Poſt. 819.
 Poſtel. bezien. 342.
 Prang - wortel. 596.

Pruim - boom. 420.
 ——— (ſlee -) 421.
 Punge (beek -) 11.
 ——— (water -) 11.
 Purgeer - Vlas. 286.
 Pyl - hout. 210.
 Pyn - boom. 800.
 Pyp - kruid. 268. 520.

Q.

Qualſter. 207.
 ——— boom. 423.
 Queek. 127.
 Quendel. 507.
 Quetſe - beyen - boom. 423.

R.

Raapen. 567. 568.
 Raboorden. 753.
 Radys (meer -) 545.
 ——— water -) 554.
 Raket (ſteen -) 558.
 ——— (water -) 553.
 ——— (wilde -) 569.
 ——— (zee -) 574.
 Raponcen. 193. 194.
 Ratelaar. 822.
 Ratelen. 513. 520.
 Reinette. 427.
 Reur - kruid. 676. 715. 716.
 Rhabarber (valſch -) 461.
 Rhyn - bezien. 209.
 Ridder - ſpooren. 452.
 Ridders. 323. 325.
 Ries - waart. 813.
 Riet. 116.
 ——— gras. 38. 54. 755.
 ——— (pluim -) 118.
 Rinkel. Wikken. 606.
 Rits. 355.
 Robberts - kruid. 578.
 Roer - kruid. 676. 715. 716.
 Rogge - bloemen. 710.
 Roobol. 841.

Rooze-boom. 428-430.
 ——— (bal-) 277.
 ——— (duin-) 429.
 ——— (Eglentier-) 428.
 ——— Geldersche-) 277.
 ——— (Honds-) 430.
 ——— (klap-) 446.
 ——— (koorn-) 393. 446.
 ——— kransjes. 674.
 ——— (water-) 449.
 ——— (wilde-) 428.

Roowillig. 353.
 Rottingen (boere-) 656.
 Ruben. 568.

Ruïte (muur-) 852.
 ——— (poel-) 461.
 ——— (steen-) 852.
 ——— (water-) 461.

Ruiters-kruid. 454.
 ——— (water-) 454.

Ruffchen. 309.

Ryn-vaar. 667.

S.

Saffraan (veld-) 663.
 Salade (mol-) 636.
 ——— (veld-) 31.
 ——— (wilde-) 634.
 ——— (zee-) 1006.
 ——— (zwyne-) 645.
 Salie (wilde-) 479.
 ——— (veld-) 26.

Salomons-Zegel. 303.

Salfafi. 628.

Sanikel. 22. 244.

Sarrasyns-kruid. 741.

Schaaf-stroo. 844.

Scabieufe. 135. 719.

Schaaps-teenjes. 683.

——— Zuuring. 328.

——— Scabieufe. 719.

Scheele-oogen. 399.

Scheeren. 454.

Scheerling. 250. 263.

Scheit-bezien. 818.

Schel-kruid. 444.

Scheur-wortel. 174.

Schimmel. 1060.

Schorfte. 153.

Schor-kruid. 389.

Schurft-kruid. 134.

Scorpioen-kruid. 168.

Schorfche-Linde-boom. 837.

Selderie (wilde-) 275.

Senegroen. 478.

Serpents-tongen. 795.

St. Anthonis-kruid. 527.

——— Raapje. 467.

St. Jacobs-kruid. 686.

St. Jans-kruid. 386. 624. 625.

St. Lamberts-nooten. 799.

St. Teunis-bloem. 334.

Slaap-bol. 447.

Slakken-kruid. 622.

Slange-kruid. 743.

——— wortel. 352.

Slee-doorn. 421.

——— pruim. 421.

Sleutel-bloem. 179.

Slyen. 421.

Smeelje. 835.

Smeer-kruid. 530.

——— wortel. 174. 386.

Sneeuw-ballen. 277.

Sogge-Distel. 633.

Sophie-kruid. 556.

Sorbe-boom. 423.

Sorg-zaad-gras. 57.

Spaander-fungus. 1040.

Spaansche Aak. 838.

Sparre-boom. 800.

Speen-kruid. 465. 526. 527.

Speer-kruid. 845.

Spinne-koorns. 422.

Sporckenhout. 210.

Sporckelle. 292.

Spring-kruid. 724.

Spurge. 408. 414. 416.

Spurrie. 384. 400.

Stal-

Stal - kruid. 596.
 Standel - kruid. 725.
 Startoffen. 650.
 Steekel - beziën. 214.
 ——— Heide. 593.
 Steen - breek. 169. 273. 274.
 ——— 365. 426. 851.
 ——— doorfnydend - kruid.
 152.
 ——— Klaveren. 616.
 ——— Lever - kruid. 937.
 ——— Mos. 895.
 ——— Raket. 558.
 ——— Ruite. 852.
 ——— Vioolieren. 562.
 ——— zaad. 169. 170.
 Sterre - Distel. 713.
 ——— kruid. 689.
 Stevens - kruid. 6.
 Stuck - beffen. 214.
 Stikel - kreusen. 454.
 Stinck - bloem. 673.
 Stincke - boom. 210.
 Stinckende - Camille. 703.
 ——— Gouw. 444.
 ——— Kruis - kruid. 684.
 ——— Melde. 228.
 ——— Paarde - staart. 747.
 Stronk - beziën. 343.
 Styfmoertjes. 721.
 Suikerey. 649.
 Suiker - Netel. 493.
 Syringe (wilde -) 418.

T.

Tandpyn - wortel. 21.
 Tartuffels. 1053.
 Tasjes - kruid. 540. 546.
 Thym (wilde -) 507.
 Ton - beyen. 433.
 Toortsen. 202.
 Tormentielle. 440.
 Trillend - gras. 92.
 Tripmadam. 388.

Tros - Lathyrus. 602.
 Tuimel - Distel. 242.
 Tarren - kruid. 565.
 Tyde'oozen. 292.
 Twee - blad. 734.

U.

Uit en tuis. 533.

V.

Valeriane. 29. 30.
 Val - kruid. 695.
 Varen. 847. 849. 853. 855.
 Varkens - gras. 356.
 ——— Kers. 544.
 ——— Klaver. 612.
 ——— Venkel. 253.
 Vasten avond Zotjes. 291.
 Veen - beffen. 345.
 ——— hamels. 52.
 Veld - Ajuin. 296.
 ——— Distel. 660.
 ——— Haanevoet. 470.
 ——— Klaver. 611. 621.
 ——— Munte. 488.
 ——— Orant. 523.
 ——— Saffraan. 663.
 ——— Salade. 31.
 ——— Salie. 26.
 ——— Zuuring. 327.
 Veil (Aard -) 490.
 ——— (boom -) 215.
 ——— (water -) 749.
 Venkel (varkens -) 253.
 ——— (zee -) 254.
 Venus - Hair. 852.
 Vergeet my niet. 168.
 Vet. 31.
 ——— (Kievits -) 22.
 Vettekoes. 31.
 Vettik. 31.
 Vincoorde. 218.
 Vingerhoed - kruid. 528.

Violen. 721-723.
 ——— hout of boom. 837.
 ——— (water-) 182. 550.
 Violieren (steen-) 562.
 ——— (water-) 182.
 Vissel - kruid. 538.
 Vitzen. 603. 606.
 Vlas - dotter. 533.
 ——— kruid. 524.
 ——— (Matte-) 52.
 ——— (purgeer-) 286.
 ——— (wild-) 285. 524.
 ——— (wolfe-) 52.
 Vlier - boom. 279.
 ——— (water-) 277.
 ——— (wilde-) 278.
 Vlot - gras. 100.
 Vogel - Kars. 418.
 ——— kruid. 281.
 ——— Melk. 296.
 ——— Nest. 248.
 ——— Voet. 609.
 Vogeltjes. 586.
 Vokelaar. 698.
 Volg my na. 727.
 Vonk - hout. 1039.
 Vorsche - beet. 825.
 Vosse - beffen. 341.
 ——— kulletjes. 725.
 Vrakel - beffen. 826.
 Vroegeling. 534.
 Vrouwen - Distel. 657.
 ——— Hair. 867.
 ——— Mantel. 151.
 ——— Spiegel. 199.
 Vuil - boom. 210.
 Vuur - kruid. 556.
 Vyf - vinger - kruid. 439.

W.

Waal - wortel. 174.
 Wald - beffen. 342.
 Wallen - Distel. 242.
 Walstroo. 136. 137. 139.

Wambuis - knopen. 697.
 Wand - luis - kruid. 33.
 Water Andoorn. 25.
 ——— Asphodillen. 300.
 ——— Betonie. 527.
 ——— Biezen. 261.
 ——— Bloeizel. 1018.
 ——— Boelkens - kruid. 664.
 ——— Duizend-blad. 23. 793.
 ——— Drie - blad. 181.
 ——— Eppe. 258.
 ——— Gal. 400.
 ——— Galigaan. 761.
 ——— Gras. 768.
 ——— Haanevoet. 466.
 ——— Handekens - kruid. 730.
 ——— Kers. 550. 552.
 ——— Kervel. 262.
 ——— Klaveren. 181.
 ——— Knodfen. 753.
 ——— Kruiken. 449.
 ——— Linzen. 750.
 ——— Lifch. 358.
 ——— Look. 480.
 ——— Malrove. 25.
 ——— Muizen - oor. 168.
 ——— Munt. 487.
 ——— Muur. 281.
 ——— Navel - kruid. 243.
 ——— Nooten. 150.
 ——— Paarde - staart. 842.
 ——— Paarl - kruid. 170.
 ——— Patigh. 325.
 ——— Peper. 254.
 ——— Plompen. 449.
 ——— Punge. 11. 200.
 ——— Radys. 554.
 ——— Raket. 553.
 ——— Ridders. 325.
 ——— Riet - gras. 782.
 ——— Roozen. 449.
 ——— Ruit. 461.
 ——— Ruiters. 454.
 ——— Scheerling. 263.
 ——— Slange - kruid. 743.

Scor-

- Water Scorpioen -kruid. 168.
 — Speen -kruid. 527.
 — Varen. 847.
 — Veil. 749.
 — Violen. 182. 550.
 — Vlier. 277.
 — Vyfvinger -kruid. 443.
 — Wederik. 184.
 — Weegbree. 331. 332.
 — Wilg. 812.
 Wederdood. 851. 867.
 Wederik. 183. 184. 334.
 Weegbree. 142. 143. 1066.
 — (Water-) 331. 332
 Weerhout. 207.
 Weeuwtsjes. 201.
 Weg - Distel. 661.
 — doorn. 209.
 — gras. 356.
 Wervelen -hout. 805.
 Wier of Wiert. 744. 997.
 Wikken. 600. 603. 604. 606.
 Wilde Angelica. 257.
 — Appelboom. 425.
 — Averuit. 668.
 — Bertram. 706.
 — Boekweit. 357.
 — Camille. 702.
 — Christus -oogen. 295.
 — Cicorey. 644.
 — Cornoellie. 148.
 — Dragon. 706.
 — Eppe. 252. 271.
 — Handekens -kruid. 730.
 — Hyacinthen. 305.
 — Karffen - Boom. 419.
 — Kers. 561.
 — Kervel. 268.
 — Knollen. 568.
 — Kool. 566.
 — Latouw. 634.
 — Look. 291.
 — Majolyn. 506.
 — Mostaart. 555.
 — Munt. 485.
 Wilde Orego. 506.
 — Offe - tonge. 177.
 — Pastinaken. 270.
 — Peen. 248.
 — Peere boom. 424.
 — Penfeen. 723.
 — Peterfelie. 251. 264.
 — Pinxternakels. 270.
 — Poley. 509.
 — Porcelyn. 387.
 — Pruijn. 420.
 — Pynboom. 800.
 — Raapen. 568.
 — Raket. 569.
 — Ridderfpooren. 452.
 — Rooze - boom. 428.
 — Salade. 634.
 — Salie. 479.
 — Selderie. 275.
 — Steen - zaad. 170.
 — Syringe. 418.
 — Thym. 507.
 — Veld - Saffraan. 663.
 — Violen. 722.
 — Vlas. 285. 524.
 — Vlier. 278.
 — Wikken. 606.
 — Wilge. 355.
 — Wyngaard. 801.
 Wildemans -kruid. 455.
 Wilg. 803. 804. 807 - 809. 812.
 — 815. 1077.
 — wilde. 355.
 Wind - bloem. 456.
 Winde of Windom. 190 - 192.
 — (zwarte-) 357.
 Winter - groen. 361.
 — Kers. 559.
 Wipe - doorn. 430.
 Wirf. 809.
 Woert - haak. 596.
 Wolfs - boonen. 386.
 — Klaauw. 858.
 — Melk. 411 412 414 416
 — veest. 1054.
 Wol-

Wolle-gras. 52.
 ——— kruid. 202.
 ——— Vlas. 52.
 Wolvenlaa. 173.
 Wolverley. 695.
 Wonder-boom. 205.
 Wond-kruid. 597.
 Worm-kruid. 667.
 Woud-kruid. 386. 695.
 Wouw. 405.
 Wrange. 153.
 ——— kruid. 173.
 Wyngaard (wilde) 801.

Y.

Ypen-boom. 235.
 Yzer-Biezen. 310.
 ——— hard. 24.
 ——— kruid. 24.
 Yzoop. 482.

Z.

Zaad-gras. 66.
 Zand-kruid. 401.
 Zee-Alfem. 669.
 ——— After. 689.
 ——— Eike. 993.
 ——— grappe. 1.
 ——— gras. 283. 329.
 ——— (bloeiend-) 283.
 ——— Kraal. 1.
 ——— Kool. 192.
 ——— Kroos. 991.
 ——— Latouw. 1006.

Zee-Melde. 833.
 ——— Muur. 1076.
 ——— Nestelen. 744.
 ——— Peterfelie. 254.
 ——— Porcelyn. 381. 832.
 ——— Raket. 574.
 ——— Salade. 1006.
 ——— Spurrie. 384.
 ——— Sterre-kruid. 689.
 ——— Venkel. 254.
 ——— Wiert. 744.
 ——— Winde. 192.
 ——— Wolfs-Melk. 411.
 Zeep-kruid. 368.
 Zegeltjes. 303.
 Zegge. 782.
 Zenegroen. 478.
 Zeven-blad. 236. 440.
 ——— jaars-bloem. 673. 674.
 Zilver-kruid. 435.
 ——— schoon. 435.
 Zinauw. 151.
 Zonne-daauw. 288. 289.
 ——— Gierst. 169.
 ——— wendend-Wolfsmelk.
 412.
 Zots-kapjes. 727.
 ——— kullekens. 727. 728.
 Zurkel. 327. 328.
 Zuuring. 326-328.
 ——— (Klaver-) 391.
 Zwaane-bloem. 358.
 Zweseriken. 753.
 Zwynen-Kers. 544.
 ——— Salade. 645.

By de **UITGEVERS** dezes zyn
gedrukt, en, behalven verscheiden anderen,
van welken nog eenige voorraad is,
te bekomen.

*Röfel, (J. A.) Natuurlyke Historie der Insecten, waarin
de Dag- en Nacht Vlinders in hunne Classen verdeeld, zo
als ook de Kevers, Torren, Water - Insecten, Springk-
haanen, Krekels, Hommelen, Wespen, Muggen, Vloon,
Vliegen enz. Nauwkeurig beschreeven en naar het
leven Gekoleurd en Afgebeeld zyn. In groot 4^o. op best
Hollandsch Mediaan Schryfpapier, zynde tans gevorderd
tot het 4de Deel, bestaande in 283 Plaatén, waaronder
eenige Dubbelde, benevens drie Titel Plaatén, waarop
eerlang het overige ten besluite van het 4de Deel staat
te volgen.*

Van het **VERVOLG**, door den Heer *Kleemann*, be-
staande tans in 44 keurige Plaatén, met derzelver juiste
beschryving, gaande zo over **IN - als - UITLANDSCHE**
KAPellen, welke tot het bovenstaande Werk vol-
strekt behoort, zal men den Liefhebberen zo dra doenlyk
eenige Plaatén met de daartoe behoorende Letterdruk
afleveren, *om dus doende den Bezitteren van dit fraaie
Werk, dat tot dus ver nog geen weerga heeft, waarin
de Insecten van't Ey tot den Vlinder, op het nauwkeurigst
onderzocht, naar het leven afgebeeld, en, volgens der-
zelver byzondere kenmerken, in eene geregelde Classen-
ordening gebragt, beschreeven zyn, volledig te bezorgen.*

Tyd-wyzer der Rupsen, vervattende, van maand tot maand,
den tyd der verschyning van de, door *Röfel* en *Kleemann*,
beschreeven en afgebeelde Rupsen, benevens haar voed-
zel. Ten nutte en dienst der Liefhebbers opgesteld, door
den Heer *J. Mader*, en in 't licht gegeven door *Klee-
mann*, vermeerderd met een Lyst der Planten volgens
het samentel van *Linnaeus*. groot 8. f 1:10:-

Het zelfde Werk best pap. f 2:-:-

Klee-

Kleemann, (N. E.) Dagverhaal der Reize, gedaan in de jaaren 1768, 1769 en 1770, van Weenen door Belgrado, Kilianova, Butschiak-Tartarye, naar de Krim, en van daar over Kaffa naar Konstantinopel en Smirna, en door den Archipel over Triest, naar Weenen te rug. Benevens eene Beschryving der Merkwaardigheden van Krimfch Tartarye, de aangrenzende Landen, en derzelver Inwooneren. Naar den tweeden en Vermeerderden Hoogduitschen druk in 't Nederduitsch Vertaalt, met Elf naar het Leven afgebeelde platen versierd. groot 8. f 3:6:-

Luyken, (J.) Overvloeiend Herte, of nagelatene verzen, bestaande in stichtelyke beschouwingen en Geestelyke Overdenkingen, verrykt met Goddelyke Spreuken, over veelerleie foorten van onderwerpen, by verschillende gelegenheden opgesteld, versierd met 86 platen 8 f 2:10:-
Het zelfde Werk groot pap. f 4:-:-

Westerhoven, (J van) Den Schepper verheerlykt in de Schepzelen, of Verhandeling van alle geschapene Dingen, voorgesteld in zeven Zaamenspraaken, onder Zomerfche Wandelingen, dienende wyders tot Lof van Haarlems vermaakelyke Landsdouwen, met naar 't Leeven afgebeelde konstplaten, vierde druk. groot 8. f 2:10:-

De Vriend der Kinderen, naar den tweeden Hoogduitschen Druk vertaald, 4 deelen 8. f 2:16:-

Door 't herdrukken eeniger bladen zyn weder alle de Deelen apart te bekomen, except het 2de Deel. *Men leeze de onpartydige en oordeelkundige Recensie in de Alg. Vaderl. Letteroeffeningen, eerste deel N. 8. pag. 329. enz. als mede in de Boekzaal der Geleerden van October 1779.*

* * *

Welgelykend Pourtrait des Heeren Professor *D. de Gorter*, gesneden door den beroemden *Houbraken*, is mede apart à 12 stuivers te bekomen, om in 's Mans andere Werken geplaatst te kunnen worden. — Eenige, dog zeer weinige, eerste Proefdrukken zyn mede op rojaal 4^e gedrukt te bekomen.



New York Botanical Garden Library

QK 298 .G4 c.3

Geuns, Steven Jan v/Plantarum Belgii con gen



3 5185 00164 5272

